

道藏精華第十三集之七
文山選蕭天石主編

會西成社印行

道藏精華

千金翼方

集

北宋版備急千金要方與元版千金翼方序

蕭天石

—要方增輯：孫真人海上仙方

—翼方增附溫隱居海上仙方

備急千金要方與千金翼方，乃隋唐間孫思邈真人之千古不朽名著，其在醫藥學上之價值，迄今猶能炳耀寰宇，光芒萬丈，不以西醫之昌明而稍減色也。言醫方之學，純爲經驗積累與歸納法應用所得之學問，故亦可稱爲「經驗科學」之方書學。昔扁鵲、蒼公，早已有禁方之受授，見於史籍。東漢張仲景所著傷寒論及金匱要略方，其所述錄之醫方，千古宗之，然爲數僅二六二條而已。兩晉六朝而後，方書遞增，卷帙浩繁，有多至數千卷者，真可謂洋洋大觀矣。然除多病其蕪雜外，對於病理證驗、藥物治療之系統論列，與乎兼及於明道、窮理、治心、養性、養精、養氣、養神、

以養生盡年而至於命之功，則遠不如斯書之博大高明遠甚。故能集神農、黃帝、秦、漢、隋、唐以來，數千年祖先之醫療經驗與神效藥方之大成者，實應首推斯二書爲最完善之第一方書。

詳考二書內容，對現代醫藥學上，仍有其豐富無比之科學價值，其在藥物學之性質上、與治療學之方法上，及養生學之道術與內功上，確深值當代中西醫藥學家與科學家之研究發掘。如能進而用現代科學方法，以中藥爲體，以西藥爲用，廣爲藥性與藥理試驗，生理、病理、心理、脈理、物理等治療學之綜合探求，配合各種臨床治療經驗，而統計其實效；則不但可爲本書之應用開一新境界，抑且可爲中國醫藥學之前途開一新天地！進而使中醫藥學與方書學世界化，其前途實未可限量也！

夷攷思邈一生，匪僅爲曠世之神醫，且亦爲道門之隱聖。史稱京兆華原人，幼卽天資穎慧，卓絕常人，七歲就學，過目不忘，弱冠博覽群書，擅談經子百家之學，尤善老莊，兼好釋典；上窮大易，妙契天人，中究性

命，洞徹陰陽。故雖志存匡濟，而能自隱於道；雖不事王侯，以爲世用；然能不自棄其才，窮研方術，傳之其人，而以爲千秋萬世用！自古以來，大凡聖哲之士，類皆能有「得其時則駕，不得其時則蓬累而行」之風懷；思邈世以真人稱之，乃修道而大有得者，故能與天地偕化，視駕與不駕、名與不名等也。余之自隱於毛椎之間，未傳醫而傳道，與思邈之隱，其類乎？其不類乎？能知而一之者，其天乎？

思邈幼罹尪療痼疾，徧求天下名醫，家產蕩盡。因而窮參古今醫笈，綜究百家方書，棄繁蕪而擷其精要，會玄妙而通其神化，故能大得而施用無所不宜也。後以廣行陰功，惠及蛇蟲，民胞物與，神人咸欽；卒遇異人，授以「散龍宮方」，有如史稱扁鵲之得禁方於長桑君，淳于意之得禁方於陽慶者然！于焉術益精而方益神。思邈以之濟人度世，歷試諸方，無不著手回春，具起死回生之神效。復能潛修丹道，恬淡養性，精氣入神，與天地而同化；故早歲雖爲厲疾所累，後卒得終其生無病，且壽邁期頤，換神

換髓，而返老還童，無疾而終，終而自化；非有道者其孰能之？
精於醫藥者之所能至也。

據道鑑載：思邈於「周宣帝時，以王室多事，隱於太白山學道，養神，求度世之術，洞曉天文推步，精究醫藥，擅觀神氣，審於聲色，於證象，心存仁慈，務行陰德，澤人及物，無有或遺，與天同功，與地同德。」并謂其「所著千金要方三十卷，散龍宮方亦在其內。又擅以聲色診人之疾，著脈經一卷。」然乎否乎？難可得而徵也。太乙子稱其「一生醫人無算，活人無算，於醫道、醫德、醫品、與醫學、醫術、醫方，六者同臻不朽，真並世無兩之神醫也。」詳考之，誠非虛譽。

後隋文帝輔政，耳其盛譽，謙禮徵爲國子博士不就。迄唐太宗時，召詣京師，稱其：「爲有道者，誠可尊重，羨門之徒，豈虛言哉？將授以爵位，固辭不受。高宗初卽位，拜諫議大夫，復固辭，時年九十有九」云云。余之所以述此者，在示中醫與西醫之另一分歧點；西醫僅以醫爲業以濟

世，中醫則不然，其上焉者則係以醫爲道，以道合天，而期能入於聖者也。故丹家論醫品，謂「有庸醫、凡醫、名醫、賢醫、聖醫、神醫之別。」明乎此，則讀思邈斯書者，當知效法其爲人，而有以自勉於聞道、證道、行道，非徒以能治病救病爲能事也。

千金要方與千金翼方二書，直至今日，仍爲在方劑學與醫藥學之研究上，具有最高科學價值之寶典，尤爲中醫師所不可不備之要籍，如其「當歸芍藥散」「白虎人蔘湯」……等名方，以及治療甲狀腺腫、腳氣與夜盲症等諸方，無一莫非千金不易之神效驗方！其他亦大抵類是也。以其上集唐以前方劑學之大成，下開唐以後方劑學之基礎，故在現代中西醫藥學上，依仍光芒四射。

查要方一書，總三十卷，所治病類凡二百三十二門，合方論五千三百首，舉凡養生、養性、養壽與飲食、服餌、補益之道，備急、解毒、辨證、脈治、針灸之方，男女、老幼、嬰孺之患，五臟、六腑、五官、三焦之

痼，以至風類、脚氣、霍亂、瀉痢、傷寒、消渴、癰疾、瘡毒、癰瘤等，凡百疾病，莫不詳其病理，審其證治。

翼方一書，較要方晚出三十年，凡三十卷，所治病類凡一百八十五門，論藥性二十餘門，方、論、證、針法、灸法等共三千四百餘首。以藥錄本章始，以鍼灸禁經終。中分婦人、傷寒、小兒、養性、辟穀、退居、補益、中風、雜病、萬病、飛鍊、瘡癰、色脈、等諸編。以之輔翼要方，於焉更臻完善矣。故日人視此書爲希世瑰寶，乃「天壤間絕無僅有之秘笈」！誠爲我中醫師及道家千載難得之奇書。

本二書內中搜集道佛二家服食、養生、養性、修真之精要，對於古仙家煉養工夫，與夫却病强身，延年益壽之佚傳秘法，亦復網羅無遺，其要者有養性之道，養性服餌之方及禁忌之方，有居處法，有按摩法（婆羅門按摩法、老子按摩法等），有調氣法，採氣法，氣功治病法，有服食法，有房中補益法，御女方，房術方，有還陰丹以補腦法，有煉精延年法，不

漏精法，返老還童方，有飲食養生法，飲食療病法，有老年人養生法等。復有辟穀法，辟穀服餌法，有飛鍊祕法，并有禁經二卷，爲仙經千古不傳之禁法與咒法，兩書六十卷中，共有針灸五卷，針法灸法凡數百條之多，故本書不但爲爲醫家所必讀，且亦爲道家養生家及佛家與各界人士，所不可不備之無上要籍。

再次，要、翼二書，本社曾於民國四十八年八月影行初版問世。當時採用版本，係據日本所藏之北宋治平三年刊本，翼方則係日方所藏之元大德本，本社同用十六開大字本影印。據報載日本視此上杉文庫中所存北宋治平三年刻本之「備急千金要方」一書，珍同國寶，其售價高達美金一千二百元。（係據中央社發自日本東京專電）。攷日本江戶時代嘉永二年之多紀元堅重印本，還在此次日人所刊行之前，多紀元堅且稱其爲「天壤間絕無僅有之秘笈。」此日刊本較正統道藏本與四庫全書本，及康熙間名御醫張璐撰之「千金方衍義」所據之我國坊間本爲佳。故斯書價值之高，由

此亦可想見一斑矣。

茲以二書之初版本，早已絕版，因應讀者多方要求，故特重據十六開本原書影印。復於「要方」卷首，增刊唐書孫思邈傳一篇，卷末增輯國立中央圖書館珍藏善本書中之「孫真人海上仙方」精鈔本一卷，以詩秘傳證治病類凡百二十一仙方，首尾各冠、結之以詩，誠千古來天壤間不傳之仙家秘笈。又翼方卷末輯附道家隱真「溫隱居海上仙方」一卷，治病凡七十七類，每類均著錄其治法與藥方，且均係往古禁洩之仙傳秘方。斯書亦爲中央圖書館珍藏之古真血脈，世間迄無傳本。余主編道藏精華與中國醫學名著，先後選刊者達四百餘種，今既得見此舉世絕無僅有之二寶典，故特表而出之，以公之於世，否則其或將永遠沉淪於故紙堆中矣！以其不足以成單行本，復與孫真人二方書同爲千古秘笈，故以之附驥，藉共傳焉！

最後，古之善爲醫以養其生者，在唯道是守，唯道是修。以道弘生，以道弘人，以道設教，以道濟世。萬法唯道，道唯自然。故老子曰：「人

法地，地法天，天法道，道法自然。」斯爲養生之無上綱宗。人法地者，在法地之厚德載物，順生承時，陰靜而有則，所以期人與地合功也。人法天者，在法天之行健不息，生物不測，陽動而有方，所以期人與天合德也。人法道者，在法道之自然而生生不息，以生養生，故生無已時，所以期人與道合也，天地合道，陰陽合德，乾坤合體，動靜合用，日月合明，死生合一；斯爲大道之樞機。以此爲醫，在以醫行道。故以醫救人，卽在以道救人。古之善以道救人者無廢人，善以道救物者無廢物！而善以道治病者，在善治於未病之先，而非在善治於已病之後；此所以在治病於無形，而病期於無病，醫期於無醫也。故善修道者，萬病不生，萬邪不侵，故能終生無病。

且無疾而終，亦非善之善者；其善終以完其生者，在能死而無死，得大解脫，得大自在，形死而神長存，神存而形骸自化也。斯在道家言，則爲「與天爲徒」「與化爲徒」者也。

是故太上養道，其次養神，其次養性，其次養心，再次養氣，再次養精，其下養形。吐納導引，飲食男女，則下之又下矣！故返老還童，長生不死，乃養生之術也，豈道也哉？孫思邈真人者，丹家中之鉅子而自隱於道，復又假醫以行其道者也！要方翼方中，雖大體皆言方藥，然如能融貫全書，而契得其頭腦處，則自能會其心要，在道而不在術，言方與藥，旨在由術以入於道；治病乃其用而非其體，切不可囿圖過去，以純醫方書視之是幸！

中華民國六十五年元月一日 文山邈叟於石屋草堂

孫思邈傳

（唐書卷二百五十二）

孫思邈，京兆華原人也。七歲就學，日誦千餘言，弱冠善談莊老及百家之說，兼好釋典。洛州總管獨孤信，見而歎曰：「此聖童也。但恨其器大，難爲用也！」周宣帝時，思邈以王室多故，隱居太白山。隋文帝輔政，徵爲國子博士，稱疾不起。嘗謂所親曰：「過五十年，當有聖人出，吾方助之，以濟人。」及太宗卽位，召詣京師，嗟其容色甚少，謂曰：「故知有道者，誠可尊重，羨門廣成，豈虛言哉！」將授以爵位，固辭不受。顯慶四年，高宗召見，拜諫議大夫，又固辭不受。上元元年，辭疾請歸，特賜良馬，及鄱陽公主邑司以居焉。當時知名之士，朱令文、孟洗、盧照鄰，執師資之禮以事焉。

思邈嘗從幸九成宮，照鄰留在其宅，時庭前有病梨樹，照鄰爲賦，其序曰：「癸酉之歲，余臥疾長安光德坊之官舍，父老云：是鄱陽公主邑司；昔公主未嫁而卒，故其邑廢，時有孫思邈處士居之。邈道合古今，學殫數術，高談正一，則古之蒙莊子；深入不二，則今之維摩詰；其推步甲乙、度量乾坤，則洛下閎安期先生之儔也。」照鄰有惡疾，醫所不能癒，乃問思邈，名醫愈疾，其道何如？思邈曰：「吾聞善言天者，必質之於人；善言人者，亦本之於天。天有四時五行，寒暑迭代。其轉運也，和而爲雨，怒而爲風，凝而爲霜雪，張而爲虹虹，此天地之常數也。人有四支五臟，一覺一寢，呼吸吐納，精氣往來。流而爲榮衛，彰而爲氣色，發而爲音聲，此人之常數也。陽用其形，陰用其精，天人之所同也。及其失也，蒸則生熱，否則生寒，結而爲瘤贅，陷而爲癰疽，奔而爲喘乏，竭而爲礁枯。診發乎面，變動乎形，推此以及天地，亦如之。故五緯盈縮，星辰錯行

，日月薄蝕，孛彗飛流，此天地之危診也。寒暑不時，天地之蒸否也。石立土踊，天地之瘤贅也。山崩土陷，天地之癰疽也。奔風暴雨，天地之喘乏也。川瀆竭涸，天地之礁枯也。良醫道之以藥石，救之以鍼劑。聖人之以至德，輔之以人事，故形體有可愈之疾，天地有可消之災。」又曰：「膽欲大而心欲小，智欲圓而行欲方。詩曰：如臨深淵，如履薄冰，謂小心也。赳赳武夫，公侯干城，謂大膽也。不爲利回，不爲義疚，行之方也。見機而作，不俟終日，智之圓也。」

復問養性之要，答曰：「天有盈虛，人有屯危，不自慎，不能濟也。故養性必先知自慎也。慎以畏爲本。故士無畏則簡仁義，農無畏則惰稼穡，工無畏則慢規矩，商無畏則貨不殖，子無畏則忘孝，父無畏則廢慈，臣無畏則勳不立，君無畏則亂不治。是以太上畏道，其次畏天，其次畏物，其次畏人，其次畏身。憂於身者，不拘於人；畏於己者，不制於彼；慎於

小者，不懼於大；戒於近者，不侮於遠。知此則人事畢矣。

思邈自云：開皇辛酉歲生，至今九十三矣。詢之鄉里，咸云數百歲人；話周齊間事，歷歷如眼見。以此參之，不啻百歲人矣。然猶視聽不衰，神采甚茂，可謂古之聰明博達不死者也！初魏徵等受詔，修齊梁陳周隋五代史，恐有遺漏，屢訪之，思邈口以傳授，有如目觀。東臺侍郎孫處約，將其五子庭、微、俊、佑、佐，以謁思邈。思邈曰：「俊當先貴，佑當晚達，佐最名重，禍在執兵。」後皆如其言。太子詹，事盧齊卿，童幼時請問人倫之事。思邈曰：「汝後五十年，位登方伯，吾孫當爲屬吏，可自保也。」後齊卿爲徐州刺史，思邈孫溥，果爲徐州肅縣丞。思邈初謂齊卿之時，溥猶未生，而預知其事。凡諸異迹，多此類也。

永淳元年卒，遺令薄葬，不藏冥器，祭祀無牲牢，經月餘顏貌不改。舉屍就木，猶若空衣，時人異之。自注老子莊子，撰千金方三十卷行於世。又撰福祿論三卷，攝生真錄及枕中素書，會三教論各一卷。子行天授中爲鳳閣侍郎。

校正千金翼方表

臣聞醫方之學其來遠矣上古神農播穀嘗藥以養其生黃帝岐伯君臣問對垂於不刊爲萬世法中古有長桑扁鵲漢有陽慶倉公張機華佗晉宋如王叔和葛稚川皇甫謐范汪胡洽深師陶景之流凡數十家皆師祖農黃著爲經方迨及唐世孫思邈出誠一代之良醫也其行事見諸史傳撰千金方三十卷辨論精博囊括衆家高出於前輩猶慮或有所遺又撰千金翼方以輔之一家之書可謂大備矣其書之傳於今訛舛尤甚雖洪儒碩學不能辨之

仁宗皇帝詔儒臣校正醫書臣等今校定千金翼方謂手物之繁必先得其要故首之以藥錄纂要凡治病者宜別藥之性味故次之以本草人之生育由母無疾故次之以婦人疾病之急無急於傷寒故次之以傷寒然後養其少小故次之以小兒人身既立必知所以自養故次之以養性養性者莫善於養氣故次之以辟穀氣之盈乃可安閒故次之以退居退居者當事補養故次之以補益若補養失宜則風疾乃作故次之以中風風者百病之長邪氣緣而畢至故次之以雜病又次之以萬病愈諸疾者必資乎大

藥故次之以飛鏤乳石性堅久服生熱故次之以瘡癰衆多之疾源乎脉證故次之以色脉色脉既明乃通腠穴故次之以針灸而禁經終焉總三十卷目錄一卷臣以爲晉有人攷刊正周易及諸藥方與祖訥論祖云辨釋經典縱有異同不足以傷風教至於湯藥小小不達則後人受弊不少是醫方不可以輕議也臣等不敢肆臆見妄加塗竄取自神農以來書行於世者而質之有所未至以俟來者書成繕寫將預

聖覽恭惟

皇帝陛下天縱深仁孝述前烈刊行方論拯治生類俾天下家藏其書人知其學皆得爲忠孝亦皇風之高致焉太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官貲外郎臣孫奇太常少卿充秘閣校理臣林億等謹上

千金翼方序

唐逸士孫思邈撰

原夫神醫秘術至蹟參於道樞實餌凝靈宏功
浹於真眡知關篇玄牡駐歷之効已深鬱策天
機全生之德爲大稽炎農於紀籙資太一而反
營魂鏡軒后於遺編事岐伯而宣藥力故能嘗
味之績鬱騰天壤診體之教播在神案醫道由
是濫觴時義肇基于此亦有志其大者高密問
紫文之術先其遠者伯陽流玉冊之經擬斯壽
於乾坤宣伊難老儔厥齡於龜鶴詎可獨病茲
適大道之真以持身抑斯之謂也若其業濟含
靈命懸茲乎則有越人徹視於臍藏秦和洞達
於膏肓仲景候色而驗眉元化剖腸而瀟胃斯
皆方軌疊跡思韞入神之妙極變探幽精超絕
代之巧晉宋方技既其無繼齊梁醫術曾何足
云若夫醫道之爲言寔惟意也固以神存心手
之際意析毫芒之裏當其情之所得口不能言
數之所在言不能論然則三部九候廼經絡之
樞機氣少神餘亦鍼刺之鈞軸况乎良醫則貴
察聲色神工則深究萌芽心考錙銖安假懸衡
之驗敵同機駁曾無挂髮之淹非天下之至精
其孰能與於此是故先王鏤之于玉板往聖藏

之以金匱豈不以營疊至道括囊真蹟者歟余
幼智蔑聞老成無已才非公幹夙嬰沈疾德異
士安早經厄瘳所以志學之歲馳百金而徇經
方耄及之年竟三餘而勤藥餌酌華公之錄悵
異術同窺採葛生之玉函奇方畢綜每以爲生
老兩儀之大德人者五行之秀氣氣化則人育
伊人稟氣而存德合則生成是生曰德而立既
知生不再於我人處物爲靈可幸蘊靈心闕顧
我性源者由檢押神秘幽求今古撰方一部號
曰千金可以濟物攝生可以窮微盡性猶恐岱
山臨目必昧秋毫之端雷霆在耳或遺玉石之
響所以更撰方翼三十卷共成一家之學譬觀
軌之相濟運轉無涯等羽翼之交飛搏搖不測
矧夫易道深矣孔宣繫十翼之辭玄文奧矣陸
績增玄翼之說或公斯義述此方名矣貽厥子
孫永爲家訓雖未能譬言中庶比潤上池亦足
以慕遠測深稽門叩鍵者哉儻經目於君子庶
知余之所志焉

青芝 赤芝 黃芝 白芝 黑芝

紫芝 赤箭 天門冬 麥門冬 木

女萎 雞 黃精 乾地黃 附子 遠志 葉附

澤瀉 附子 薯蕷 菊花 甘草 人參

石斛 牛膝 卷柏 細辛 獨活

升麻 羌活 防葵 蒼實 菴蘭子

意中人 車前子 附子 新實子 充蔚子 附木香

龍膽 免絲子 巴戟天 白英 白蒿

草部上品之下二十八味

肉蓯蓉 地膚子 忍冬 養梨子 附防風 葉附

石龍芻 絡石 千歲桑 黃連 沙參

丹參 王不留行 藍實 葉附 景天 花附 天名精

蒲黃 香蒲 蘭草 決明子 玄窮

蘼蕪 續斷 雲實 花附 黃芩 附葉 徐長卿

杜若 蛇床子 肉蓯蓉 漏蘆 苴根

飛廉 營實 根附 薇銜 五味子 旋花 根附

白兔藿 鬼督郵 白花藤

草部中品之上三十七味

當歸 秦膠 黃芩 子附 芍藥 乾薑 生薑 附

藁本 實附 麻黃 葛根 附葉 附胡 知母

大青 貝母 括樓 根附 玄參

苦參 石龍芮 石韋 狗脊 草薢

疫癘 通草 瞿麥 敗醬 白芷 葉附

杜蘅 紫草 紫苑 白鮮 白薇

葉耳 葉附 茅根 苗附 百合 酸漿 紫參

女萎 淫羊藿 仙靈脾 龜寶 附子 附也

草部中品之下三十九味

款冬 牡丹 防己 女苑 澤蘭

地榆 王孫 爵牀 白前 百部

王瓜 薺芩 高良薑 馬先蒿 蜀羊泉

積雪草 惡實 附子 附子 附子 大小薊根

垣衣 艾葉 水萍 海藻 昆布

葶草 陸種 井中 附子 附子 附子

烏菴 菟葵 鱧腸 附子 附子 附子

羅摩子 白藥 懷香子 鬱金 薑黃

阿魏

○卷之三

草部下品之上二十五味

大黃 桔梗 蓬蘽 芫花 根附

澤漆 大戟 莢花 旋復花 根附 鈎吻

藜蘆 附子 側子 羊躑躅 茵芋 射干

烏尾 貫眾 花附 半夏 由跋 虎掌

食岩子 蜀漆 恒山 青柏子 附子 牙子

白斂 白及 蛇含 草蒿 藿園

草部下品之下六十八味

連翹 白頭翁 蘭茹 苦艾 羊桃

羊蹄 鹿藿 牛蒡 陸英 蒺藜

蠶草 夏枯草 烏韭 菴休 虎杖

石長生 鼠尾草 馬鞭草 胡桐淚 馬勃

雞腸 蛇莓 苧根 菰根 狼跋子

弓弩弦 春杵頭細纒 敗天公 半天河

蟲魚部七十一味 論一首

石蜜	蜜蟻 <small>附</small>	蜂子 <small>附</small>	蜂子 <small>附</small>	杜蠟
桑螵蛸	海蛤	文蛤	魁蛤	石決明
秦龜	龜甲	鯉魚膽 <small>附</small>	鱖魚	鱖魚
鮑魚	鮑魚	鯽魚	鮑魚	伏翼
天鼠屎	蛭皮	石龍子	露蜂房	樗雞
蚱蟬	白蠟蠶	木蠹	蜚蠊	蜚蠊
蟻	蟻	蟻	蟻	蟻
鼈甲 <small>附</small>	鼈甲 <small>附</small>	烏賊魚骨 <small>附</small>	蟹 <small>附</small>	蟹 <small>附</small>
原蠶蛾	鰻鱺魚	鮫魚皮	紫貝	蝦蟇
鼈	蛇鼠 <small>附</small>	蛇鼠 <small>附</small>	蛇鼠 <small>附</small>	蛇鼠 <small>附</small>
鯨鯢甲	蜘蛛	蜻蛉	石蠹	蛇蛻
蛇黃	蜈蚣	馬陸	蠍	雀甕
鼠婦	螢火	衣魚	白頸蛇	蟻
蜚蠊	斑猫	光青	烏毒長	地膽
馬刀	貝子	田中螺汁	甲香	珂
果部二十五味				
豆蔻	葡萄	蓬蘽	覆盆子	大棗 <small>附</small>
藕實	雞頭實	芡實	栗	櫻桃
梅實	枇杷葉	柿	木瓜	甘蔗
石蜜 <small>附</small>	沙糖	芋	烏芋	杏核人 <small>附</small>
桃核人 <small>附</small>	李核人 <small>附</small>	李核人 <small>附</small>	梨	
柰	安石榴 <small>附</small>			
柔部三十七味				
白瓜子	白冬瓜	瓜蒂 <small>附</small>	冬葵子 <small>附</small>	根葉 <small>附</small>
苧實	苦菜	薺 <small>附</small>	蕪菁子 <small>附</small>	萊服根

龍葵子 <small>附</small>	芥	首宿	淫子 <small>附</small>
麥實 <small>附</small>	麥實 <small>附</small>	麥實 <small>附</small>	麥實 <small>附</small>
白蘘荷	菰菜	紫蘇子 <small>附</small>	水蘇
香薷	薄荷	秦艽梨	苦瓠
馬芹子	葶	落葵	蕪菁
葫蘆也	蒜 <small>附</small>	薑	薑
米穀部二十八味			
胡麻	青囊	麻黃子 <small>附</small>	鉛糖
赤小豆	豆	大麥	糖麥 <small>附</small>
青粱米	黃粱米	白粱米	粟米
藥米	林米	陳廩米	酒
糯米	黍米	粳米	稻米
有各未用一百九十六味			
青玉	白玉髓	玉英	璧玉
紫石英	白石華	黑石華	黃石華
石肺	石肝	石脾	石腎
陵石	碧石青	遂石	白肌石
五羽石	石流青	石流赤	石名
終石	玉伯	文石	曼道石
石濡	石雲	石劇	路石
敗石	越砥石	金壘	夏臺
鬼目	鬼蓋	馬顛	馬唐
牛舌	羊乳	羊實	犀洛
菰藟	雀梅	雀翹	雞涅
鼠耳	蛇舌	龍常草	離樓草

黃護草	吳唐草	天雄草	雀醫草	木甘草
益決草	九熟草	兌草	酸草	異草
澤草	茹草	華草	勒草	委草華
吳葵華	封華	北行華	陳華	排華
節華	徐李	新雉木	合新木	排蒲木
遂陽木	學木核	木核	枸核	荻皮
桑黃實	滿陰實	可聚實	讓實	蕙實
青雌	白背	白女腸	白扇根	白給
白并	白辛	白昌	赤舉	赤涅
黃秋	徐黃	黃白支	紫藍	紫給
天蓼	地朕	地參	地筋	地耳
土齒	燕齒	酸惡	酸緒	巴棘
巴朱	蜀格	墨根	苗根	參果根
黃辯	良達	對蘆	糞藍	委蛇
麻伯	王明	類鼻	師系	逐折
并苦	領友	父陸根	索干	荆莖
鬼麗	竹付	秘惡	唐夷	知枝
本松	河煎	區余	三葉	五母林
疥拍腹	常史之生	救救人若	城東腐木	庭黃蟲
丁公寄	城裏赤柱	慶	裸	蝸籬
芥	載	石靈蟲	行夜	蜚厲
天杜蟲	桑蠹蟲	帝前	蛇類	
麋魚	丹戲	地防	黃蟲	
搜雞	益符			

唐本退二十味

黃草 姑活 別騎 杜蒿 石下長卿

千金翼方目錄

○卷之五

腐舌	練石草	弋共	葦草	五色符
囊草	翹根	鼠姑	船虹	屈草
赤赫	淮木	占斯	嬰桃	鳩鳥毛

婦人來字第一 論一首方七首

婦人積聚第二 方六首

婦人乳疾第三 方一十三首

婦人雜病第四 方一十三首

婦人面癰第五 論一首方三十九首

熏衣泥木香第六 方六首

令身香第七 方一十三首

生髮黑髮第八 方一十九首

○卷之六

產後心悶第一 方四首

產後虛煩第二 方一十三首

陰脫第三 方八首

惡露第四 方一十八首

心痛第五 方四首

腹痛第六 方一十六首

虛損第七 方一十七首

○卷之七

虛乏第一 方一十二首

盜汗第二 方四首

下乳第三 方一十六首

中風第四 方一十一首

心悸第五 方四首

下痢第六方一十七首

淋渴第七方一十一首

○卷之八

崩中第一方三十六首

月水不利第二方三十四首

損傷第三方七首

○卷之九

太陽病用桂枝湯法第一五十七證方五首

太陽病用麻黃湯法第二一十六證方四首

太陽病用青龍湯法第三四證方二首

太陽病用柴胡湯法第四一十五證方七首

太陽病用承氣湯法第五九證方四首

太陽病用陷胃湯法第六三十一證方一十六首

太陽病雜療法第七二十證方一十三首

陽明病狀第八七十五證方一十一首

少陽病狀第九九證

○卷之十

太陰病狀第一八證方二首

少陰病狀第二四十五證方一十六首

厥陰病狀第三五十八證方七首

傷寒宜忌第四十五首

發汗吐下後病狀第五三十證方一十五首

霍亂病狀第六一十證方三首

陰易病已後勞復第七七證方四首附方六首

○卷之十一

養小兒第一合八十九條方二十首灸法二首論一首

小兒雜治第一合五十七首論一首

眼病第二合一百三十三方灸法二首論一首

○卷之十二

養性禁忌第一論一首

養性服餌第二方三十七首

養老大例第三論三首

養老食療第四方十七首論五首

○卷之十三

服茯苓第一方六首

服松柏脂第二方二十首論一首

服松柏實第三方一十九首

酒膏散第四方六首論一首

服雲母第五方三首論一首

服水第六論一首法七首

○卷之十四

擇地第一

服藥第二

飲食第三

養性第五

種造藥第六法三十五首

雜忌第七

○卷之十五

叙虛損論第一論一首

大補養第二論一首方八首

解散發動第三論一首方三十五首與第二十一卷通

補五藏第四方四十五首

五藏氣虛第五方九首

補虛圓散第六方二十二首

○卷之十六 中風

諸酒第一方二十首

諸散第二方九首論一首

諸膏第三方三首

獨僻第四方四首

心風第五方一十四首

風眩第六方一十七首

○卷之十七

中風第一方三十五首論四首灸法二首

脚氣第二論一首方二十一首

癰瘡第三方一十六首灸法一首

癰瘍第四方一十四首灸法一首

○卷之十八 雜病

霍亂第一方二十七首

瘧疾第二方二首續法十二首針灸法七首

黃疸第三論三首方二十八首針灸法七首

吐血第四論三首方三十首

胃中熱第五方一十七首

壓熱第六方一十三首論一首

○卷之十九

消渴第一方二十二首

淋病第二方二十首

水腫第三方二十六首并五不治證

千金翼方目錄

瘧疾第四方一十四首

瘧疾第五方一十四首

寒食散第六方九首

飲食不消第七方一十七首論一首

雜證第八方一百二十首

○卷之二十

備急第一方二十七首論一首

盛毒第二論一首方七首灸法一首

藥毒第三方一十二首

從高墮下第四方一十一首

金瘡第五方六十二首

沙蟲第六方三十一首

瘰癧第七方九首

陰病第八方十四首

○卷之二十一

總療萬病第一論一首

阿加陀圓理萬病第二方一十一首論七首

耆婆療瘧病第三方一十一首論七首

踰翅療冷第四方六首

○卷之二十二

飛鍊研煮鍾乳及和草藥服法第一方六首

飛鍊研煮五石及和草藥服法第二方一十一首

服石及寒食散已遺失節度發病之法合四十五條

解石及寒食散并下石第四論一首方六十九首

○卷之二十三 瘧病

黃父相癰疽論第一方一首

診癰疽起發處第二方一首

候癰疽色法第三

診知是癰疽法第四

診癰疽有膿法第五

候人年得疽法第六

相五色疽死生法第七

薄貼第八方三十一首

處癰疽第九論一首方三十三首

○卷之二十四

癰疽發背第一方九首

鼠瘻第二論一首方二十一首灸法三首

癰疽第三方八首

惡核第四論一首方一十三首

丹痧第五方二十八首

甘濕第六論二首方三十八首

腸痔第七方三十六首論一首

疥癬第八論一首方三十四首灸法一首

代指第九方六首

濕熱瘡第十方三十四首

○卷之二十五

診氣色法第一

診脈大意第二

診四時脈第三

診寸口脈第四

診關上脈第五

診尺中脈第六

診雜病脈第七

○卷之二十六 針灸

取孔穴法第一

婦人第二法四十五首

小兒驚癇第三法二十一首

鼻病第四法七首

舌病第五法二十五首

脚氣第六法三首論一首

諸風第七法六十九首論

時行第八法四首

黃疸第九法一十一首

瘡病第十法一十三首

○卷之二十七

肝病第一五十一法

膽病第二一十二法

心病第三一十八法

小腸病第四八十一法試二首

脾病第五三十二法

胃病第六三十四法

肺病第七四十五法

大腸病第八二十二法論一首

腎病第九二十四法

膀胱病第十二十二法

○卷之二十八

消渴第一一十二法論一首

淋病第二十二法

尿血第二十七法

水病第四二十五法

癰疽第五十七法論一首

痔漏第六十八法

脫肛第七十四法

卒死第八十三法

雜法第九

鍼灸且忌第十

○卷之二十九 禁經

持禁齋戒法第一

受禁法第二

雜受禁法第三

禁法大例第四

掌訣法第五

禁鬼客忤氣第六

禁溫疫時行第七

禁瘧病第八

禁瘡腫第九

禁喉痺第十

禁產運第十一

○卷之三十

禁金瘡第十二

禁蠱毒第十三

禁通注第十四

禁邪病第十五

禁惡獸虎狼第十六

禁蛇毒第十七

禁蠍蜂第十八

禁狗鼠第十九

護身禁法第二十

禁賊盜第二十一

呪童子令說鬼姓字第二十二

上卷目錄

採藥時節第

白英春採葉夏採莖
秋採花冬採根

烏頭烏喙正月二月

正日
天明

本月九月秋暴黃精

牛膝二月八月細辛二月八月

白高二月探防風二月

茜根二月三月當歸二月三月

庚子月攝暴文五月
百龍方五月五日攝

華解月月暴暴按按葵月

沙草根 日集 大黃 日集

千金翼方卷

扶令扶神二月入陰

猪苓二月入秦皮

言辭三月四徐長

五月探景

癸卯年二月二日

尊日三陰射干

厚朴二月九月採陰無美

景天四月四日

廣熱月暴亡

澤瀉五月六月採實

由從容五月五日採陰

大小薊採五月紅草

五月

五月採根

桂二月八月杜仲二月五月

石南二月四月採葉
二月採實陰

黃芩三月二日採食大青三月四日採食

日按暴案宣孫陰

水探暴 花探陰

青相子五月六月採子

黃環三月陰 烏芋三月暴

南	黃	知	四	月	南	早	四	月	五
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

夏村亭記
淩跡

車前子
日五採陰五

蛇床子五月陰茵陳蒿五月陰

旋復花五月採 烏尾五月採

五月六月
五月六月

五月探
有之
五月探

藥錄纂要	五月五	胡五月五	蒜五月五	青蘘極朝
紫芝	六月八	茅根	六月八	蒜花
松脂	六月八	五木耳	六月八	石斛
續斷	七月八	被衝	七月八	蘇黃
海藻	七月八	陸英	七月八	南桂
桃核仁	七月八	瓜蒂	七月八	水蘇
腐婢	七月八	苦實	七月八	意或仁
漏蘆	七月八	營實	七月八	五味子
恒山	七月八	牙子	七月八	蛇含
遠志	七月八	星	七月八	女青
巴豆	七月八	蜀椒	七月八	雷丸
蓋草	七月八	乾薑	七月八	松實
枳實	七月八	山茱萸	七月八	桑葉
皂莢	七月八	栗	七月八	在
大豆	七月八	菴蘭子	七月八	決明子
貝母	七月八	女貞	七月八	橘柚
棘刺	七月八	苧實	七月八	忍冬
木蘭	七月八	冬葵子	七月八	白鮮

論曰有天竺大醫者渡云天下物類是藥藥為物之中無一物而非藥者斯理之實也地神農本草舉其大綱未盡其

理天師各錄其理但述五刑豈卒其事且令後學者因事效法顧類之無窮則神農之意從可知矣所以述其藥名只谷令學徒知無物之非藥耳

王泉	玉屑	丹砂	空青	綠青
曾青	白青	荷青	石膽	雲母
朴消	消石	芒消	滑石	石鍾乳
紫石英	礬石	青礬石	白石英	五石脂
太極根	紫石英	石中黃	禹餘糧	黃禹餘糧
金屑	銀屑	水銀	雄黃	雌黃
殷孽	孔公孽	石腦	石硫黃	重黃
陽起石	疑水石	石膏	磁石	玄石
理石	長石	膚青	石黛	鐵落
鐵	生鐵	剛鐵	鐵精	鐵漿
食鹽	光明鹽	綠鹽	蜜陀僧	桃花石
珊瑚	石花	乳牀	青琅玕	寒石
特裏石	握裏石	方解石	蒼石	土連
代赭	肉赭	大鹽	戎鹽	青鹽
赤鹽	白鹽	鈔丹	錫粉	錫鏡鼻
銅弩牙	金牙	石灰	冬灰	炭
銀弩牙	伏龍肝	東壁土	半天河	地漿
硃砂	礬石	赤銅屑	銅礬石	銅青
白堊	瓦屑	烏古瓦	石	不灰木
青芝	赤芝	黃芝	白芝	黑芝
紫芝	赤箭	天門冬	麥門冬	木
萎蕤	黃精	乾地黄	昌蒲	遠志
澤瀉	薯蕷	菊花	甘草	人參

石斛	牛膝	卷柏	細辛	獨活
升麻	柴胡	防葵	蒼耳	葶藶子
薏苡仁	車前子	瞿麥子	芳蔚子	木香
龍膽	黃絲子	巴戟天	白英	白蒿
白茯苓	地膚子	忍冬	黃連	防風
石龍芮	絡石	千歲葉	黃連	沙參
丹參	黃芩	景天	天冬	王不留行
蒲黃	蘭草	決明子	苦參	香蒲
蘇無	續斷	雲實	黃耆	徐長卿
杜若	蛇床子	黃芩	黃芩	西根
飛廉	白茅	鬼督郵	白芍藥	五味子
秦艽	黃芩	芍藥	蔓本	乾薑
麻黃	葛根	前胡	知母	大青
貝母	枯樓	玄參	苦參	石龍芮
石韋	狗脊	單解	菝葜	通草
瞿麥	敗醬	白芷	杜蘅	紫草
紫苑	白鮮皮	白薇	蔓耳	茅根
百合	酸漿	王參	女萎	淫羊藿
桑寄生	地榆	王孫	防己	女苑
澤蘭	王瓜	薤白	高良薑	馬先蒿
蜀羊泉	積零草	惡實	莎草	大小薊
垣衣	艾葉	水萍	海藻	昆布
石草	陸蠶	葶藶	角菜	井中苔
雞腸	齒齕	百脉根	蘿摩子	白藥

懷香子	鬱金	薑黃	百兩金	阿魏
大黃	枯梗	甘遂	葶藶	芫花
澤漆	大戟	葶藶	及己	天雄
附子	側子	羊躑躅	茵芋	射干
黃芩	貫衆	半夏	由跋	虎掌
白欬	白及	蛇含	草蒿	葶藶
連翹	白頭翁	蘭如	羊矢	羊桃
辛蹄	鹿藿	牛扁	陸英	蒲葦
蓋草	夏枯草	烏韭	蚤休	虎杖
石長生	鼠尾草	馬鞭草	馬勃	松脂
蛇莓	苧根	菰根	狼跋子	弓弩弦
敗天公	敗蒲席	敗船如	屋遊	赤地利
赤惠若	三白草	牽牛子	猪膏母	獨行根
狗舌草	烏慈母	猪膏	狼毒	鬼臼
蘆根	甘蕉根	菰苗	酢漿草	茵芋
蒲公草	商陸	女青	水蓼	角蒿
白附子	鸛虱	魚網	馬絆繩	昨藥何草
破翁	破故紙	甌帶灰	鬼蓋	夜露草
雀麥	茯苓	琥珀	玉屑	拍寶
茵桂	杜桂	杜仲	故麻鞋底	女貞實
楓香脂	乾漆	蔓刺實	杜刺	女貞實
熟核	五加皮	沉香	木蘭	桑上寄生
丁香	藥木	辛夷	木蘭	桑上寄生

[illegible]

濕經書卷第二

附子	側子	天雄	獨活	升麻	菴蘭	薏苡	巴戟天
貫衆	白及	蒲葦	澤瀉	升麻	菴蘭	薏苡	巴戟天
磁石	石膏	天門冬	羌活	升麻	菴蘭	薏苡	巴戟天
獨活	升麻	羌活	升麻	菴蘭	薏苡	巴戟天	細辛
防風	王不留行	豈窮	黃芩	杜若	杜若	杜若	杜若
辛夷	杜若	五加皮	木蘭	杜若	杜若	杜若	杜若
竹葉	厚朴	松實	秦皮	杜若	杜若	杜若	杜若
防己	秦椒	女苑	澤蘭	竹瀝	竹瀝	竹瀝	竹瀝
山葵	吳茱萸	荜薢子	魯青	礬石	礬石	礬石	礬石

白膠	阿膠	鹿茸	鹿角	鹿脂
雞頭	蔓荊	竹瀝	肉蓯蓉	防風
芎藭	景天	丹參	絲石	千慮藥汁
王不留行	山樓木汁	蛇床	淫蘆	苘根
飛廉	礬石	杜捷	芫花	旋復花
附子	側子	天雄	獨活	茵芋
當歸	秦元	芍藥	乾薑	葛根
石龍芮	狗脊	草薢	菝葜	敗醬
蔓耳	白鮮	桑葉	青囊	大豆卷
石南	蜀椒	蔓荊	皂莢	天門冬
白朮	萎蕤	乾地黃	昆蒲	澤瀉
菊花	蜀葵	石斛	牛膝	細辛
柴胡	菴蘭	薏苡	車前子	柏子仁

新寶	蒲葦	杜仲	乾桑
五加皮	酸棗	枸杞	桑寄生
續斷	天名精	松子	桑寄生

秦元	蔓荊	狗脊	菴蘭	通草
石南	防風	豈窮	牛膝	天門冬
女萎	乾地黃	石斛	荊子	荊子
菝葜	杜仲	乾漆	野葛	野葛
大豆卷	天雄	附子	附子	附子

身痛痺第四	青琅玕	石灰	丹砂	雄黃	水銀
疏黃	牙子	白及	鐵落	枳實	枳實
菝葜	莽草	柳花	蜀羊泉	水萍	水萍
防風	薏苡	羊蹄	蓋草	敗荷	敗荷
菝葜	青相	青蒿	桑羊角	蟬蛻	蟬蛻
天鼠矢	天鼠矢	天鼠矢	天鼠矢	天鼠矢	天鼠矢

驚風第五	鈎丹	紫石英	白石脂	秦皮	銀屑
玄石	鐵精	鈎藤	款冬花	牡丹皮	牡丹皮
白鮮皮	礬石	女苑	柏子仁	茯苓	茯苓
茯神	桔梗	羌花	葶藶子	蛇蛻	蛇蛻
遠志	人參	細辛	防葵	龍膽	龍膽
杏仁	龍骨	龍齒	牛黃	頭髮	頭髮
白芝	龍角	羊齒	羊骨	亂髮	亂髮
牛齒	白馬齒	白馬齒	赤馬齒	白馬齒	白馬齒
鹿茸	牡狗齒	豚卵	狐五藏	石蜜	石蜜

海蛤 炸蟬 露蜂房 白僵蠶 蛇脫
雀甕 蛇黃 犀婦 蜈蚣 六畜毛蹄甲
鬼脂第六

代猪 粉錫 金牙 衛矛 赤箭
銅鏡鼻 升麻 牛黃 青木香 藍寶
麝無 徐長卿 雲寶 黃環 狸骨
獺肝 桃花 桃泉 蜈蚣 蛇膽
亭長 羌青 斑蝥 石長生 狼毒
鬼白 商陸 躑躅 白及 野葛
琥珀 六畜毛蹄甲

蟲毒第七

方解石 代猪 金牙 衛矛 赤箭
徐長卿 升麻 瓜蒂 雷石 紫苑
黃環 青木香 巴豆 麝香 景天
蕋荷 犀角 羚羊角 蛇卵 獺肝
狐空 鸕骨 蜂房 胡鷲屎 絞魚皮
白環蛇 蛇蛻 蜈蚣 斑蝥 羌青
芫花 藜蘆 野葛 樞子 猪苓
敗鼓皮 桑上寄生 六畜毛蹄甲
痰實第八

淡竹葉 枳實 吳茱萸 厚朴 胡椒
檳榔仁 萊菔 茯苓 恒山 松蘿
旋復花 大黃 芫花 羌花 半夏
烏頭 黃芩 前胡 巴豆 柴胡
白朮 細辛 朴消 芒消
周冷積聚腹痛腸堅第九

礞石 雄黃 礞石 厚朴 特生礞石
曾青 戎鹽 硫黃 陽起石 石膏
理石 高良薑 朴消 元花 桔梗
吳茱萸 荳蔻 旋復花 麥門冬 太一餘糧
澤瀉 茯苓 人參 柴胡 秦龜
藿園 防葵 牡丹 羌花 海藻
肉苁蓉 丹參 巴戟天 莽草 芍藥
烏頭 麻黃 貝母 乾薑 玄參
岩參 蘭茹 狼毒 大黃 附子

腹痛脹滿嘔吐第十

厚朴 竹茹 枳實 吳茱萸 檳榔
葛根 桑白皮 松蘿 橘皮 大黃
杜梗 甘遂 乾薑 大戟 藜蘆
半夏 恒山 朴消 生薑 藁本
阿膠 禹餘糧 人參 戎鹽

胃脘滿第十一

方解石 蘭草 杜若 莎草 竹葉
厚朴 枳實 乾薑 前胡 玄參
紫苑 拘杞 桔梗 羌花 茯苓
芫花 旋復花 射干 烏頭 半夏
恒山 人參 菊花 細辛 柴胡
補五臟第十二

白石脂 五石脂 琥珀 紫苑 石韋
大黃 桔梗 石蜜 龍骨 牛髓
鹿肉 鵝肉 乾漆 柏子仁 女貞
銀屑 沙參 酸棗 五味子 枳實

山茱萸 麥門冬 乾地黃 昌蒲 澤瀉
 罌藥 人參 石斛 細辛 茯苓 貝母
 龍膽 巴戟天 牡丹 韭 貝母
 蕪菁 葱白 覆盆 當歸 鍾乳
 玄參 苦參

六氣第十三

玉泉 鍾乳 五石脂 白石英 柏子仁
 柏葉 蘭草 續斷 茵陳 黃耆
 飛廉 營實 五味子 旋花 澤瀉
 罌藥 巴戟天 大棗 牡蒙 青囊
 烏麻 枳實 赤箭 蕪菁子 苦菜
 蒲桃 覆盆子 芍藥 紫草 淫羊藿
 羊肉 桑螵蛸 牛髓 蠟 牛肉

鹿茸 鹿角 麋角 猪肚 雲母粉
 兔屎 兔肉 戎鹽 石蜜

長陰陽益精氣第十四

羊腎 牛腎 肉苁蓉 蓬蘽 礞石
 理石 地膚子 決明子 杜若 白棘
 蛇床子 苘根 黑石脂 五味子 天雄
 附子 桔樓 玄參 石韋 石龍芮
 白薇 草解 紫參 麥門冬 遠志
 小草 罌藥 石斛 牛膝 卷柏
 細辛 柴胡 車前子 羌蔚子 菟絲子
 巴戟天 茯苓 枸杞 杜仲 丹砂
 扁青 雲母 滑石 鍾乳

五石脂 乾漆 金屑 乾地黃 防葵
 菟絲子 烏麻 天門冬 青蘘 貝母
 淫羊藿 附子 天雄 羊腎 雲羊角
 礞石

長肌肉第十六

藥本 天門冬 當歸 白馬莖 桑寄生
 久癸子 白芷 龜寶 垣衣 麥門冬
 麻仁 乾地黃 澤瀉 罌藥 菟絲子
 石斛 甘草 女貞子 五加皮 枳實
 胡麻 玉泉 礞石 赤石脂 厚朴
 蒲桃 赤箭 五味子 酸棗仁

堅筋骨第十七

玉泉 雲母 杜仲 乾漆 枸杞
 硫黃 蔓荆 絡石 礞石 戎鹽
 續斷 烏麻 金屑 五加皮 酸棗仁

陰下濕痒第十八

木蘭 槐皮 五加皮 杜仲 蛇床子
 漏蘆 飛廉 陽起石

消渴第十九

曾青 滑石 紫石英 白石英 凝水石
 丹砂 石膏 理石 竹筴 桑白皮
 枸杞根 松脂 茯苓 馬乳 兔骨
 紫參 赤小豆 大麥 小麥 澤瀉
 萊服 人參 麥門冬 葦葉 腐婢
 粟米 青梁 甘草 牡蠣 猪肚
 雞屎白 雲實 黃連 礞石 括樓

葛根 玄參 苦參 茅根 竹根
長石 知母 菟根 生薑汁 王瓜
冬瓜 水萍 羊酪

消食第二十
白朮 桔梗 太黃 薑苓 大豆屑
穢麥 皂莢 萊菔根 麥門冬 吳茱萸
檳榔 橘皮 小蒜 厚朴 苦參

淋閉第二十一
玉泉 石膽 芒消 茯苓 琥珀
石鷲 瞿麥 胡蘆 茅根 鯉魚齒
髮髮 亂髮 頭垢

利小便第二十
消石 滑石 紫參 括樓 百合
白石脂 海藻 榆皮 地膚子 山茱萸
蒲黃 棘人 天門冬 車前子 麻子仁
赤小豆 郁李仁 冬瓜 冬葵子 牽牛子
茅根 律草 犍牛尿 橘皮 枳實
長石 天名精 苦參 茵陳 秦朮

止小便第二十三
赤石脂 鈆丹 粉錫 昌蒲 王瓜
括樓 技葉 牡蠣 菟根 蘆根
雞腸草 龍骨 鹿茸 鹿角 雞肫旺
山茱萸

明目第二十四
玉泉 丹砂 空青 紫貝 螢火
貝齒 馬珂 石膽 鍾乳 礬石

五石脂 鹵鹹 戎鹹 理石 特生礬石
蔓荊子 桑椹子 槐子 麝仁 地膚子
鐵精 長石 黃連 景天 花 香蒲
決明子 飛廉 杜若 枳實 秦元
合歡 秦椒 棘仁 人參 細辛
蒼黃 葶藶 菟絲子 芫蔚子 葶藶
烏麻 薺子 藍青子 蓼子 葱子
前胡 玄參 瞿麥 石決明 石龍芮
羚羊角 羖羊角 青牛膽 兔肝 狗脊

止淚第二十五
空青 曾青 蔓荊 麝仁 綠鹽
苦參 白芷 杜若 菊花 欒花
按其 皂莢 芫藶 決明子 白朮

日赤痛第二十六
空青 車前子 曾青 石膽 礬石
戎鹽 按其 炙人 薺子 欒花
鯉魚膽 藥木 石鹽 萎蕤 決明子
益肝膽第二十七

空青 曾青 礬石 酸棗仁 細辛
龍膽 苦參 菟絲 黃連
補食心氣第二十八
紫石英 遠志 羚羊角 人參

補養腎氣第二十九
六畜腎 絡石 澤瀉 石南 鹿解
車前子 狗脊 栗子 沙參 白棘
玄參 黑石脂 礬石 瞿麥 礬石

石斛 鹿茸

補脾第三十

大棗 櫻桃 甘蔗 石蜜

致逆上氣第三十一

石膽 藤蕪 蜀椒 欬冬 桑根白皮 狼毒 竹葉 女苑 白前 吳茱萸 百部根 當歸 麻黃 貝母 紫苑 白鮮皮 堇花 藜蘆 烏頭 附子 鬼臼 射干 半夏 蜀漆 昌蒲 遠志 甘草 細辛 防葵 杏仁 桃仁 瓜丁 鯢脂肉 牡蠣 桂心 白石脂 羊肺 紫石英 鍾乳 硫黃 蒺藜 芫花 五味子 茯苓

下氣第三十二

鉆丹 梅實 蛇床 石韋 水蘇 竹葉 蘇子 薄荷 薤白 秦艽 梨 甘草 石斛 細辛 牡荊 枇杷葉 甘蕉 署藥 馬肉 白石英 鹿茸 杏仁 石膏 橘皮 鍾乳 雲母 礬石 胡椒

霍亂轉筋第三十三

木瓜 雞屎白 乾薑 附子 瞿麥 女萎 香薷 藟豆 葶藶 橘皮 人參 桂心 白朮 厚朴

腸痔第三十四

石膽 消石 丹砂 五石脂 水銀

雄黃 礞石 石硫黃 孔公尊 礞石 龜木 槐子 桐皮 飛廉 敗醬 露蜂房 鰻鱗魚 蛇脫皮 鱗鱗 蟬皮 龜甲 猪後足懸蹄

鼠漏并痔第三十五

鼠尾草 續斷 連翹 夏枯草 王不留行 桐葉 及己 通草 狼毒 敗醬 王瓜 昆布 牡蠣 鱖魚 露蜂房 文蛤 龜甲 蝟皮 鼈甲 蟬蛇膽 蛇脫皮 斑蝥 虎骨 地膽 猪懸蹄 五石脂 陵鯉甲

三蟲第三十六

粉錫 梓白皮 山茱萸 檳榔 衛矛 蕪荑 天門冬 天名精 桑白皮 乾漆 蔓荊 苦參 麝香 雷丸 特生裏石 棟實 苒實 麝香 通草 白頸蚯蚓 桃仁 桃花 連翹 貫衆 鶴虱 篇蓄 青桐 蘆蘆 牙子 樛實 柳皮 薏苡根

下部腫第三十七

石硫黃 雄黃 雌黃 苦參 艾葉 大蘇 益 馬鞭草 蟬蛇膽

崩中下血第三十八

白芨 伏龍肝 敗脫茹 青石脂 衛矛 桃毛 紫葳 燧木 當歸 桑寄生

白歛 茅根 牡狗齒 玉泉 鯉魚骨

白鹽 龍骨 白膠 阿膠 牛角腮

陽起石 地榆 生肌黃 茜根 白芷

文葉 景天花 烏賊魚骨 小麥 大小薊根

女人血閉第三十九

銅鏡鼻 銅牙 桃仁 茅根 烏賊魚骨

白芷 括樓 大黃 桑螵蛸 牛角腮

蟪蛄 蝨蟲 麝蟲 水蛭 豆豉

番蘭子 陽起石 紫葳 黃芩 巴豆

牛膝 瞿麥 當歸

女人寒熱疔瘕漏下第四十

白堊 乾漆 茯苓 黃芩 蛇床子

禹餘糧 陽起石 秦椒

產難胞衣不出第四十一

代脂 石鵝 冬葵子 弓弩弦 滑石

蚘蟬 澤瀉 續斷 雞羊角 王不留行

女人陰冷腫痛第四十二

松蘿 白鮮皮 卷柏

陰蝨瘡第四十三

土陰孽 菴蓄 五加皮 黑石脂 礬石

藥木 桐葉 礬石 石脂 蛭蟻

龜甲 狐羣

傷寒溫疫第四十四

犀角屑 羚羊角 徐長卿 麻黃 前胡

生薑汁 葛根 人青 杜樓 柴胡

青木香 吳藍 貝母 玄參 白薇

知母 桂心 芍藥

健忘第四十五

遠志 昌蒲 人參 茯神 黃芩

蘭茹 白鳥心 龍膽 龜甲 通草

通九竅第四十六

大棗 芥子 遠志 昌蒲 細辛

蔓荊

下部痢第四十七

樺實 龍骨 鼠尾草 營實 黃連

黃芩 乾薑 附子 倉米 蜀椒

五石脂 無食子 櫛若 地榆 龍膽

黃蘗

虛損洩精第四十八

白棘 韭子 鹿茸 山茱萸 澤瀉

菟絲子 牡蠣 白龍骨

唾粘如膠并唾血第四十九

紫苑 紫參 旋復花 麻黃 茯苓

桂心 槐子 芎藭 乾薑 射干

小麥

吐血第五十

戎鹽 柏葉 水蘇 敗船茹 生地黃汁

竹茹 蟪蛄 文葉 白膠 大小薊根

雞羊角 馬屎

下血第五十一

白瓷屑 伏龍肝 柏葉 青羊脂 艾葉

五石脂 赤箭 天名精 蒲黃 生地黃

黃芩 茜根 敗船茹 水蘇 白膠

衄血第五十二

馬屎 槲豚 亂髮灰 水蘇 紫參 柏葉 王不留行

尿血第五十三

生地黃汁 龍骨 戎塩 麝耳 葱浮汁

耳聾第五十四

磁石 蔓蒲 山茱萸 烏雞脂 雞脂

通草 王瓜

止汗第五十五

牡蠣 龍骨 柏實 衛矛

出汗第五十六

山茱萸 細辛 石膏 蜀椒 乾薑

葱白 桂心 葛根 麻黃

堅齒第五十七

桑寄生 香蒲 蔓荊 秦椒

蜀椒 鼠李根 戎塩

癰腫第五十八

薤白 飛廉 薤白子 白棘 王不留行

木蜀皮 絡石 紫石英 五石脂 礞石

芍藥 防己 澤蘭 大蒜 連翹

黃耆 白朮 苦參 敗醬 通草

王瓜

惡瘡第五十九

白及 薤盧 蛇銜 青桐 牙子

狼毒 營實 黃芩 當歸 苦參

草解 昨黃 松脂 漏蘆 及己

通草 地榆 蜀羊泉

熱極喘口舌焦乾第六十

石膏 石蜜 麥門冬 枳椇 絡石

杏仁 茯苓 松脂 紫苑 款冬

梅子 太黃 甘草

利血脈第六十一

玉泉 丹砂 空青 長石 芒消

乾地黄 人參 甘草 通草 芍藥

桂心 蜀椒 麻子

失魂魄第六十二

玉泉 丹砂 紫石英 茯神 琥珀

龍骨 人參 牛黃

悅人面第六十三

白瓜子 雄黃 丹砂 落葵子 鹿髓

茵桂 旋復花 麝香 瓜樓

口瘡第六十四

黑石脂 乾地黄 黃連 龍膽 大青

升麻 礞石 小藥 苦竹葉 酪

酥 敗

脚弱疼冷第六十五

石斛 石鍾乳 熟孽 孔公孽 石硫黃

附子 豉 丹參 五加皮 竹瀝

大豆 天雄 側子 木防己 獨活

松節 牛膝

千金翼方卷第二

論曰金石草木自有本經而條例繁富非淺學近識所能悟之忍違重實假披討所以錄之於卷附之於方使忠臣孝子公孫之際造次可見故錄之以冠篇首焉

玉石部上品二十二味

味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脈療婦人帶下十二病除氣瘕明耳目久服耐寒暑不飢渴不老神仙輕身長年人臨死服五斤死三年色不變一名玉札生藍田山谷採無時

味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴骨如麻豆服之久服輕身長年生藍田採無時

味甘微寒無毒主身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面殺精魅邪惡鬼除中惡腹痛毒氣疥癬諸瘡久服通神明不老輕身神仙能化為赤作末各真朱光色如雲母可折者良生符陵山谷採無時

無時

味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神益肝氣療目赤痛去膏翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高神仙能化銅鐵鈇錫作金生益州山谷及越嵩山有銅處銅精重則生空青其腹中空三月中旬採亦無時

味酸寒無毒主益氣療乾鼻止洩痢生山之陰穴中色青白

味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補

不足盛陰氣久服輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越嵩採無時

味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒二歲久服通神明輕身延年不老可消為銅劍辟五兵生豫章山谷採無時

味甘平無毒主目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精久服輕身不老生朱崖山谷武都朱提採無時

味酸辛寒有毒主明目目痛金瘡諸癰瘰癧女子陰腫痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子散積聚效逆上氣及鼠癭惡瘡鍊餌服之不老久服增壽神仙能化鐵為銅成金銀一名畢石一名黑石一名碁石一名銅勒生羌道山谷羌里勾青山二月庚子辛丑日採

味甘平無毒主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五藏益子精明目下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服輕身延年悅澤不老耐寒暑忘高神仙一名雲珠色多赤一名雲華五色具一名雲英色多青一名雲液色多白一名雲砂色青黃一名磷石色正白生太山山谷齊廬山及琅邪北定山石間二月採

味甘溫無毒主逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱痿冷下焦腸弱強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋一名公乳一名廬石一名夏石生少室山谷及太山採無時

味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙鍊之白如銀能寒能

熱能滑能滋能辛能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水之陽採無時

消石 味苦辛寒大寒無毒主五臟積熱胃脹閉滯去畜結飲食推陳致新除邪氣療五藏十二經脈中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩渴消渴利小便及癰腫瘰癧之如膏久服輕身天地至神之物能化成十二種石一名芒消生益州山谷及武都隴西元採無時

芒消 味辛苦大寒主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推陳致新生於朴消

芒消 味酸寒無毒主寒熱溼白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒除固熱在骨髓去鼻中息以鍊餌服之輕身不老增年岐伯云久服傷人骨能使鐵為銅一名羽涅一名羽澤生河西山谷及隴西武都石門採無時

芒消 味甘寒大寒無毒主身熱洩瀉女子乳難壅閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六腑津液去留結止渴令人利中久服輕身耐飢長年一名液石一名共石一名脫石一名番石生諸陽山谷及太山之陰或採北白山或卷山採無時

芒消 味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安眠蠅填下焦止消渴除胃中久寒散難腫令人悅澤又服溫中輕身延年生太山山谷採無時

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山太如指長二三寸六面如削白微有光其黃端白後名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二月採亦無時

白石 味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安眠蠅填下焦止消渴除胃中久寒散難腫令人悅澤又服溫中輕身延年生太山山谷採無時

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山太如指長二三寸六面如削白微有光其黃端白後名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二月採亦無時

白石 味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安眠蠅填下焦止消渴除胃中久寒散難腫令人悅澤又服溫中輕身延年生太山山谷採無時

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

白石 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

神仙一名石脂生太山山谷九月採

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧穀中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃子非也

禹餘糧味甘寒平無毒主好淫寒熱煩滿下赤白血閉藏瘕太熱療小腹痛結煩或鍊餅服之不飢輕身延年一名白餘糧生東海池澤又山島中或池澤中

金石部中品二十九品
金屑味甘辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除邪毒氣服之伸仙生益州採無時

服膏味甘辛平有毒主安五藏定心神驚悸除邪氣久服輕身長生生永昌採無時

水銀味甘辛寒有毒主疥癬癰疽白禿殺皮膚中蟲墮胎除熱以傳男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不死一名永生符陵平土出於丹砂

雄黃味甘苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽疔死脫療疥蟲瘡癰疽鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癰瘕氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇虺毒解殺毒憂澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之陽採無時

雌黃味甘辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿癰疽殺毒蟲蝨身瘁邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部腫瘡身而白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之夕服輕身增年不老令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精重則生雌黃採無時

殺毒味甘辛溫無毒主爛傷瘀血淺刺寒熱鼠瘻癰瘕結氣脚冷痿弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採無時

石中黃味甘辛溫無毒主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘰癧利九竅下乳汁男子陰瘻女子陰蝕及傷食病常欲眠睡一名通石殺毒根也青黃色生梁山山谷

石脂味甘辛溫無毒主風寒虛損脚腰疼痛安五藏益氣一名石脂生名山土石中採無時

石硫黃味酸溫大熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿療心腹積聚邪氣冷癖在骨軟逆上氣脚冷痿弱無力及鼻衄惡瘡下部腫瘡上血殺疥蟲能化金銀銅鐵奇物生東海牧羊山谷中及太山河西山攀石液也

陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血癰瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子虛頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子一名白石一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山採無時

水石味甘辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痛久服不飢一名白石一名寒水石一名凌水石色如雲母可折者良鹽之精也生常山山谷又水中縣及邯鄲

石脂味甘辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中膈氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細石細理白澤者良黃

者令人淋生齊山山谷及齊盧山皆蒙山採無時

磁石 味辛鹹寒無毒主周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗

酸疳除大熱煩滿及耳聾著骨藏強骨氣益精除煩通關節

消腫腫鼠瘻頸接喉痛小兒驚癇飲水飲之亦令人有子一

名玄石一名處石生太山川谷及慈山陰有鐵處則生其

陽採無時

玄石 味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少

精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽

山陰有銅銅者雖去身雄

玄石 味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精明目破瘻

聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風

痿痺一名玄制石一名肌石如石骨順理而細生漢中山谷

及盧山採無時

玄石 味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通

血脈明目去翳眦下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺間

邪氣久服不飢一名方石一名土石一名直石理如馬齒方

而潤澤玉色生長子山谷及太山臨海採無時

玄石 味辛鹹平無毒主蠱毒蛇藥肉諸毒惡瘡不可久服令

人瘦一名推青一名推石生益州川谷

玄石 味辛甘平無毒主風熱惡瘡癰疽瘰癧氣在皮膚中

除胃腸中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生

牧羊平澤及砮城或析城採無時

玄石 主堅肌耐痛

玄石 微寒主療下部及脫肛

玄石 味甘無毒主金瘡爛痛熱中胃腸氣寒食不化一名跳鏡

玄石 平微溫主明目化銅瘰癧瘰癧定心氣小兒風癇陰虛脫肛

玄石 味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵淚生鹽州

五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光澈一名石鹽

玄石 味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚腎眩暗

玄石 味鹹辛平有小毒主久刺五痔金瘡面下癰腫面膏

藥用之

玄石 味甘溫無毒主大腸中冷膿血利久服令人肌熱飽食

玄石 味甘平無毒主宿血去目中障翳未吹鼻中生南海

玄石 味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與腎同一名乳花

玄石 味甘溫無毒酒漬服與腎同一名乳花一名連石

玉石部下品三十一味

玄石 味辛平無毒主身熱火瘡癰傷白禿疥癬死肌浸淫

在皮膚中發硬服之起陰氣可化爲丹一名石珠一名青珠

生蜀郡平澤採無時

玄石 味辛甘大熱生溫熱有毒主寒熱鼠瘻瘰癧死肌風

痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除腸中熱止消渴益肝氣

破積聚癰冷腹痛主鼻中息肉久服令人筋力火鍊百日服

一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青分石一名玄制石一

名周羊石一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食鹽生

漢中山谷及少室採無時

玄石 味甘溫有毒主明目利耳暖內絕寒破堅結及風

癰殺百蟲惡獸久服延年一名蒼礬石一名犀毒生西域採

無時

玄石 味甘溫無毒主痼冷積輕身延年多食令人熱

玄石 味苦辛大寒無毒主胃中留熱結氣黃疸通血脈去

毒生一名黃石生方山採無時

玄石 味甘平有毒主寒熱下氣瘰癧殺禽獸生西域採無時

土硫 味鹹無毒主婦人陰飲大熱乾癆生高山崖上之陰色白如脂採無時

代赭 味甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃濁下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣除五藏血脈中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名須丸一名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有染爪甲不渝者良採無時

白堊 味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒素肌膏去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已噎逆喘滿明目目痛生河東鹽池

大鹽 味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胃中病令人吐生邯鄲及河東池澤

戎鹽 味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採

白堊 味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕月閉積聚陰腫痛漏下無子洩利不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時

欬丹 味辛微寒主吐逆胃反驚癰癰疾除熱下氣止小便利除毒熱癰腫全瘡溢血鍊化還成九光久服通神明一名欬華生於欽生蜀郡平澤

粉錫 味辛寒無毒主伏尸毒蠱殺三蟲去醫癥瘕惡瘡腐胎止小便利一名解錫

錫 主女子血閉癥瘕伏腸絕孕及伏尸邪氣生桂陽山谷

銅 主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞

金 主味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良

石炭 味辛溫主疰瘍疥癬熱氣惡瘡癰疾死肌隨眉殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生中山川谷

冬灰 味辛微溫主黑子去脫息肉疽蝕疥癬一名藜灰生玄谷川澤

鐵 主癥瘕堅積去邪惡氣

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

主 主下部瘡脫肛

草部上品之上四十味

年神仙
名龍芝生泰山

不老延年神仙一名丹芝生霍山

不老延年神仙一名金芝生嵩山

魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

老延年神仙一名玄芝生常山

服輕身不老延年。一名木芝。生高夏山谷。六芝皆無毒。六月

赤龍 味辛溫主殺鬼精物毒氣消癰腫下支滿疝下血

陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾

蟲去伏尸。保定肺氣。去寒熱。養肌膚。益氣力。利小便。冷而能

月七月八月採根暴乾

羸瘦短氣。身重目黃。心下支滿。虛勞炙熱。口乾燥渴。止嘔吐。

美顏色有子。久服輕身不老。不飢。秦名羊韭。齊名愛韭。楚名

乾

大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫陰

嗜食作煎餅久服輕身延年不飢。一名山薺。一名山薑。一名

味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌角結肉諸

服去面黑。好顏色。潤澤。輕身不老。一名熒。一名地節。一名

黃精 味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延

生山谷二月採根陰乾

肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胸

藏內傷不足。通血脈。益氣力。利耳目。生者尤良。

身胎動。下血。胎不落。墮。踈折。瘀血留血。衄鼻吐血。皆擣飲。

土地者佳二月八月採根陰乾

九竅明耳目出音聲生百龍耳聾瘡溫腸胃止小便利四肢濕

疾不待居作以爲病以乘之會可作以爲病以乘之

耳明目不忘不迷惑延年益心智高志不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月採根陰乾

味苦溫無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚皴皸熱面目黃久服輕身不老好顏色延年葉

名小草主益精補陰氣止虛損夢遺一名棘苑一名要統一名細草生大山及冤句川谷四月採根葉陰乾

味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止遺精消渴淋瀝逐勝脫三焦停水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上肩鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名芒芋一名鵲鴝生汝南池澤五月六月八月採根陰乾

味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身育採

味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月採

味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眩下氣止腰痛補虛羸羸羸充五藏除煩熱強陰夕月耳目聰明輕身不飢延年一名山羊秦楚名玉延鄭越名主諸生高山空月八月採根暴乾

味苦甘平無毒主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除胃中煩熱安腸胃利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節華一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傳延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾

味辛甘溫平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡腫解毒溫中下氣煩滿短氣傷藏救欬止渴通經脉利血氣解百藥毒為尤土之精安和七十二種石一千二百種草久服輕身延年一名蜜比一名美草一名蜜草一名路草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成

味甘微寒微溫無毒主補五藏安神定志鬼止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胃弱逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘久服輕身延年一名人街一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風

味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱喘氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名石遂生六安山谷水傍石上七月八月採莖陰乾

為君味甘酸平無毒主寒濕痺四股拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一名百倍生河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾

味辛甘溫平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癢瘦血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿痺強陰益精久服輕身和顏色令人好容體一名萬歲一名豹足一名求股一名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾

耳明目不忘不迷惑延年益心智高志不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月採根陰乾

味苦溫無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚皴皸熱面目黃久服輕身不老好顏色延年葉

名小草主益精補陰氣止虛損夢遺一名棘苑一名要統一名細草生大山及冤句川谷四月採根葉陰乾

味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止遺精消渴淋瀝逐勝脫三焦停水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上肩鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名芒芋一名鵲鴝生汝南池澤五月六月八月採根陰乾

味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身育採

味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月採

味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眩下氣止腰痛補虛羸羸羸充五藏除煩熱強陰夕月耳目聰明輕身不飢延年一名山羊秦楚名玉延鄭越名主諸生高山空月八月採根暴乾

味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胃中除咳痺腫鼻風癰疾下乳結汁不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰山谷二月八月採根陰乾
味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛實肥癰瘰女子疝瘕瘰諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或隴西南安二月八月採根暴乾

味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟溫疫瘡氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癰頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

為君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胃中邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益精一名地薰一名山菜一名茹草葉名芸蒿辛香可食生弘農川谷及宛句二月八月採根暴乾

味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫瘧癰癩驚邪狂走癰五藏虛氣小腹支滿腫脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見鬼一名裂蓋一名房嫺一名爵離一名農果一名利如一名方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日採根暴乾

味苦酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身生少室山谷八月九月採實日乾

味苦微寒微溫無毒主五藏瘀血腹中水氣腫脹留

熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅脇中寒熱周痺婦人月水不通消食明目久服輕身延年不老驅蠱食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾

味甘微寒無毒主助急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根下三蟲一名解蠱一名屋葵一名起實一名蠶生真定平澤及田野八月採實採根與時

味甘鹹寒無毒主氣瘕止痛利水道小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲飲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛久服輕身耐老

及味甘寒主金瘕止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲一名當道一名茅音一名蝦蟇衣一名半蓮一名勝鳥生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾

味辛微溫無毒主明目目痛淚出除痺補五藏益精壯療心腹腰痛久服輕身不老一名義莢一名大戟一名馬辛一名大蓀生咸陽川澤及道傍四月五月採暴乾

味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣瘕血逆大熱頭痛心煩久服輕身

主瘕瘕下疳瘕可作浴湯一名益母一名益明一名大孔一名貞蔚生海濱池澤五月採

味辛溫無毒主邪氣辟毒及溫鬼強志主疥癬瘰癧癰瘰癧中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘧癰毒行藥之精久服不夢無驚寐輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷

味苦寒大寒無毒主胃間寒熱驚癰邪氣續絕傷足五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱浸下刺去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老一名陵蘇生齊胸

山谷及冤包一月八月十一月十二月採根陰乾

味甘辛平無毒主補虛不足益氣力肥健汁去

面黧養肌散陰堅骨中其精自出兩有餘瘰癧口舌燥

渴寒血為積久服明目輕身延年一名黃蘗一名黃縷一名

唐蒙一名玉女一名赤網一名黃蘗生朝鮮川澤田野蔓延

草木之上色黃而細為赤網色淺而大為黃蘗九月採實暴乾

味甘辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨安

五藏補中增志去無氣瘰癧面遊風小腹及陰中相引痛下氣

補五勞益精利男子生已郡及下邳山谷二月八月採根陰乾

味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延

年一名穀米一名白草生益州山谷春採實置於秋採花

冬採根

味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮

令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老

草部上品之下 三十八味

味甘酸微溫無毒主五勞七傷補中除虛中寒熱

痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除勝脫邪氣腰痛止

痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

味甘寒無毒主勝脫熱利小便補中益精氣去皮膚

中熱氣散惡瘡止癢強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤

澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十日採實

陰乾

味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長生益壽十二月

採陰乾

味甘辛溫微寒無毒主惡血凝滯結聚喉痺乳難

自體風癢頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒疳積瘰癧陰

瘰癧

瘰癧可作摩粉其葉主風癢可煮以浴久服長肌肉明目輕身

一名麥通一名屈人一名止行一名打羽一名并推一名即

煎一名茂生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾

味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見

風行周身骨節疼痛瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

乳金瘡內癰久服輕身葉主中風熱汗出一名銅芸一名面

草一名自枝一名屏風一名簡根一名百黃生沙苑川澤及

邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾

味甘微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋瀝風

濕鬼疰惡毒補內虛不足瘰癧身無潤澤出汗除虛中熱痛

殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍蟠

一名草續斷一名龍朱一名龍華一名懸愛一名草毒九節

多味若良生梁州山谷濕地五月七月採根暴乾

味甘溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不

消喉舌腫不通本藥不下大驚入腹除邪氣養腎主腰體痛

堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老延年通神

一名石鱉一名石礎一名略石一名明石一名領石一名懸

石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正月採

汁味甘平無毒主補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸

痺久服輕身不飢耐老通神明一名黃蘗生太山川谷

味甘寒微寒無毒主熱氣目痛骨傷淚出明目腸澀腹

痛下痢婦人陰中腫痛五臟冷熱久下或澀膿血止消渴大

驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名王

連生空陽川谷及蜀郡太山二月八月採

味甘微寒無毒主血積驚氣除寒瘧補中益肺氣療胃

痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人

一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識
美一名文布生河內川谷及冤句般陽嶺山二月八月採根
暴乾

川芎 味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積
聚破穀除痰止煩瀉益氣養血去心腹痞疾結氣腰脊痠脚
痺除風邪留熱久服利人一名祁蟬草一名赤參一名不羊
乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾

王不留 味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺內
寒止心煩鼻衄難疽惡瘡癰乳婦人產難久服輕身耐老增
壽生太山山谷一月八月採

黃芩 味苦寒無毒主解諸毒殺蟲蛇疰鬼蠱毒久服頭不白
輕身其葉汁殺百毒解毒解狼毒射罔毒其葉可以染青生
河內平澤

黃芩 味苦酸平無毒主大熱火瘃身熱煩邪惡氣諸毒癰
疔寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕身明目久服通
神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名慎火
生太山川谷四月四月七月七日採陰乾

天名精 味甘寒無毒主瘰癧血瘕欲死下血止血利小便除
小蟲去痺除胃中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老
一名麥句薑一名蝦蟇藍一名家首一名天門精一名玉門
精一名龜顯一名蟾蜍蘭一名觀生平原川澤五月採

黃芩 味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消痰血久
服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採

古蒲 味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰
耳久服輕身耐老一名雞生南海池澤

千金翼方卷二本草上

服益氣輕身不老通神明一名水香生天吳池澤四月五月採
根暴乾

白芷 味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦
人血閉無子除腦中冷熱面上遊風去來目淚出多涕唾忽
忽如醉頭寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛骨風痛濕中內
寒一名胡窮一名香果其葉名蕤蕤生武功川谷斜谷西嶺
三月四月採根暴乾

龍腦 味辛溫無毒主救逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰云三
歲久服通神主身中老風頭中久風風眩一名微燕一名江
離芳龍腦也生雍州川澤及冤句四月五月採葉暴乾

龍腦 味苦辛微溫無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋
骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌內及跌傷惡
血腫痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一名蜀折一名接
骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾

龍腦 味辛苦溫無毒主洩痢腸辟殺蠱毒去邪惡結氣止
痛除寒熱消渴花王見鬼精物多食令人狂走殺精物下水
燒之致鬼久服輕身通神明益壽一名負實一名雲英一名
天豆生河間川谷十月採暴乾

龍腦 味甘微溫無毒主癰疽久敗瘻排膿止痛大風癩疾五
痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補
丈夫虛損五勞七傷止渴腹瀉痢疾益氣利陰氣白水者冷
補其平葉落及筋攀癰腫瘡一名戴按一名戴根一名
獨根一名草草一名蜀脂一名白本生蜀郡山谷白水漢中
二月十日採陰乾

徐長卿 味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒瘕疾邪惡氣溫腫又服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三月採。

杜若 味辛微溫無毒主胃脅下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛多浮淡出敗倒目眩眈止痛除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘一名杜若一名杜連一名白連一名白苓一名苦生武陵川澤及冤句二月八月採根暴乾。

蛇床子 味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除痺氣利關節顯癰惡瘡溫中下氣令婦人子藏熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名蛇床一名恩益一名繩毒一名蔓棘一名檣藤生臨淄川谷及田野五月採實陰乾。

茵陳蒿 味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰乾。

蒲葇 味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁止遺溺熱氣瘕瘕如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾。

白朮 味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血勝脫不足跌跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絲一名地血一名如應一名茅蒐一名倩生喬山山谷二月三月採根暴乾。

白朮 味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌助敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根上洩痢腹痛五藏客熱除邪逆氣疽癰諸惡瘡金瘡傷提生肉復肌一名精微一名精麻一名牛棘一名牛勒一名薑薺一名山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾。

獨活 味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫暴癢疥水疥癢癰久服輕身明日一名獨活一名承膏一名承肌一名無心一名無頭生漢中川澤及冤句邯鄲七月採葉陰乾。

五味子 味酸溫無毒主益氣數逆上氣勞傷癰瘕補不足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生齊山山谷及代郡八月採實陰乾。

旋花 味甘溫無毒主益氣去面疔黑色媚好其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花一名金沸一名美草生潁州平澤五月採陰乾。

白芨 味苦平無毒主蛇虺瘡癰疽瘰癧肉中瘰癧瘰癧諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末著痛上立消毒入腹者煮飲之即解一名白芨生交州山谷。

兒齒 味苦辛平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草。

白芷 味苦寒無毒主解諸藥藥肉中毒酒漬服之主虛勞風熱生積南交州廣州平澤。

草部中品之上 三十七味

當歸 味甘辛溫大溫無毒主破逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘡金瘡養飲之溫中止痛除客血內寒中風狂汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉

一名乾歸生隴西川谷二月八月採根陰乾

苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便瘡風無問久新通身癢急生飛鳥山谷二月八月採根暴乾

味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澼洩利逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍瘰癧熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名內虛一名黃父一名經本一名姑婦其子主腸澼膿血生疳歸川谷及寬句二月二月採根陰乾

味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脈緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名白朮一名餘谷一名犁食一名解倉一名鋌生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾

味辛溫大熱無毒主胃滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞發逆上氣止嘔吐久服去臭氣通神明生犢為川谷及荊州揚州九月採

味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人產後陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤瘡風邪痺曳金瘡可作沐藥面脂實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微生生崇山山谷正月二月採根暴乾二十日成

味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五藏邪氣緩急風骨痛字乳餘癰止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青

味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒瘰癧寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛骨風痛生根汁大寒療消渴傷寒壯熱葛穀主下痢十歲已上白葛燒以粉瘡止痛斷血葉主金瘡止血花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五月採根暴乾

味苦微寒無毒主瘰癧瘰癧骨中痛心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾

味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒又瘰癧熱瘡下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩一名蜚母一名連母一名野麥一名地參一名水參一名水溪一名貨母一名蜚母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名非逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燭一名壽生河內川谷二月八月採根暴乾

味苦大寒無毒主瘰癧時氣頭痛大熱口瘡三月四月採根陰乾

味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕瘰癧乳難金瘡風癩瘡腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱洩出汗安五臟利骨髓一名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勒母生晉地十月採根暴乾

味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷除腸胃中固熱八疸身面黃唇乾口燥短氣通月水止小便便利一名地樓一名果臝一名天瓜一名澤姑實名黃瓜主

胃痺恍惚澤人面黃葉療中熱傷暑生弘農川谷及山陰地入
土深者良生國地者有毒二月八月採根暴乾三十日成

味甘苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補
腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱主痛狂邪忽忽不知人

溫瘧酒酒血瘕下寒血除胃中氣下水止煩渴散頸下核癰
腫心腹痛堅癥定五臟久服補虛明目強陰益血精一名重臺

一名多臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷
及寬包三月四月採根暴乾

味甘苦寒無毒主心腹結氣積聚寒濕下注目眩癰
水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志無精利九

竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤癰瘰瘡下諸瘡平胃
氣令人食食輕一名水楓一名苦蕒一名地楓一名兔楓

一名絲楓一名白莖一名虎麻一名綠莖一名綠白一名陵
郎生汝南山谷及田野二月八月十月採根暴乾

味甘苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣去積聚止煩
平腎胃氣補陰氣不足失精並冷久服輕身明目不老令人

皮膚光澤有子一名魯臬能一名地槌一名石能一名彭柏
一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

味甘苦平無毒主勞熱邪氣五癰閉不通利小便水道
止煩下氣通膀胱瀉補五勞安五藏去惡風益精氣一名石

藟一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生華陰
山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾

味甘苦甘平微溫無毒主腰背強關機緩急周痺寒濕膝
痛煩利老人瘵失溺不節男子脚弱腰膝風邪淋露少氣目

關堅脊利悅仰女子傷中關節重一名百枝一名強枝一名

扶蓋一名扶腸生常山川谷二月八月採根暴乾

味甘苦甘平無毒主腰背痛筋骨節風寒濕周痺惡瘡不
瘰熱氣傷中悲怒陰痿失溺腸即老血老人五緩一名赤節

生真定山谷二月八月採根暴乾

味甘苦平溫無毒主腰背寒痛風濕益血氣止小便利生
山野二月八月採根暴乾

味辛甘平無毒主去惡氣除脾胃寒熱通利九竅血脈
關節令人不忘瘰癧瘰癧常飲心煩嘔吐音聲瘵耳聾散癰

腫諸結不消及金瘡惡毒風癰癰折斷鼻息肉腐胎去三歲
一名附支一名丁乳生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

味苦辛寒無毒主關格諸瘕結小便不通出刺決癰腫
明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長

毛髮一名巨句葵一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採
實陰乾

味甘苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥癬疽痔馬
熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後腰痛一名鹿腸一名

鹿茸一名馬鹿一名澤貶生江夏川谷八月採根暴乾

味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵
目淚出長肌厚滿可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅痛風

痛頭眩目癢可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白脂一
名實一名元一名符離一名澤分一名南蘇可作浴湯生河

東川谷下澤二月八月採根暴乾

味甘苦寒無毒主心腹打氣主癰中益利九竅通水
道療腹腫脹痛痛以合膏療小兒驚風一名紫丹一名

採根熟洗暴乾

牙酸平寒無毒主熱煩滿定志安氣利水道產難吞其

如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾

女 味辛溫無毒。上風寒流涕霍亂。洩瀉腸鳴。上下無常。處驚癇寒熱。百病瘵肺傷。好逆出汗。又寒在膀胱。多溺飲酒。夜食發病。一名白死。一名織女苑。一名萌生。漢中川谷。或山陽正月二月採陰乾。

澤蘭 味苦甘微溫無毒。主乳婦內衄。中風餘疾。大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水。金瘡腫痛。瘰癧瘰癧。產後金瘡。內塞一名虎蘭。一名龍葉。一名虎蒲。生汝南諸大澤傍。三月三日採陰乾。

地榆 味苦甘酸微寒無毒。主婦人乳產痛。七傷帶下。十二病止。痛除惡肉。止汗瘵。金瘡。止膿血。諸瘰癧。瘰癧。酒除消渴。補絕。傷產後內塞。可作金瘡膏。生桐柏及冤句山谷。二月八月採根暴乾。

王孫 味苦平無毒。主五藏邪氣。寒濕痺。四肢酸疼。膝冷痛。瘰癧。百病益氣。吳名曰功草。楚名王孫。齊名長孫。一名黃孫。一名黃昏。一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

黃昏 一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

羊泉 味苦微寒無毒。主頭禿惡瘡。熱氣疥癬。加解瘰癧。瘰癧。齒女子陰中內傷。皮間實積。一名羊泉。一名羊胎。生蜀郡川谷。

生江南池澤

井中苦及大寒主漆瘡熱瘡水腫并中藍殺野葛已豆諸毒

解毒味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名解榮生水傍

解毒味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水田即蒼菜也

一名接余五月採

虎毒味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒

立已汁塗殺眉生連而繁生下濕地

狗齒味甘溫無毒主下氣溫中破痰積生巴蜀

酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西

名老蘭幽州謂之雀獸

白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州

陳香子味辛平無毒主諸瘰癧及蛇傷

血金瘡味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿

消腫腫功効烈於鬱金

何應味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癰腫下惡氣除邪

鬼蠱毒生西蕃及崑崙

千金翼方卷第二

千金翼方卷第三

草部下品之上 三十五味

大味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚
留飲宿食湯滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五
藏平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小
腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月
採根生乾

甘味苦微溫有小毒主胃管痛刀刺傷腸胃為山出
驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消積養
咽痛下蠱毒一名利如一名麥圖一名白藥一名梗草一名
蘇芎生嵩高山谷及宛句二月八月採根生乾

甘味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲
宿食破癥瘕積聚利水殺道下五水散膀胱留熱皮中痞熱
氣腫滿一名甘棠一名度基一名度澤一名重澤一名王田
生中山川谷一月採根陰乾

味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚氣結食寒熱癥瘕
逐邪通利水道下膀胱水谷留滯及陷邪水止出目浮
腫身暴中風熱癰毒利小瘕久服令人虛一名子廬一名單
蒿一名大室一名大通生嵩山澤及田野立夏後採陰
乾得酒良

元花味辛苦微溫有小毒主好逆上氣喘鳴咽腫短氣
五藏更毒及癰腫瘰癧消胃中寒水喜噎水腫五水在
五藏皮膚及腫痛下寒毒肉毒及服令人虛一名去水一名
毒魚一名杜元其根名黃桑根藥用毒魚生淮源川
谷三月三日採花陰乾

味苦辛微寒無毒主心胃熱大腹水氣四肢面目浮腫
丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆華大戰苗也生
太山川澤二月三日七月七日採葉陰乾

大味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腫兩急痛積聚
中風皮膚癢痛吐逆頭眩腫頭痛發汗利大小腸一名印
鉅生常山十二月採根陰乾

鉅味苦辛寒微寒有毒主傷寒溫瘧下十二水破積聚大
堅癥瘕湯滌腸胃中留滯飲食寒熱邪氣利水道瘰癧飲飲
救生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾

黃芩花味鹹甘溫微溫冷利有小毒主結氣脅下滿驚悸除
水去癥間寒熱補中下氣消胃上瘰癧如膠漆心骨寒水
膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眇瞖利大腸通血脈益
色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平澤
川谷五月採花日乾二十日成

鬼鹿味辛溫有大毒主金瘡乳產中惡風欬逆上氣水腫殺
鬼瘡蠱毒破癥瘕除腳膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸
一名野葛折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傳高山谷
及會稽東野

惡瘡殺諸蟲毒去死肌瘰癧瘰癧不通鼻中息肉馬刀爛
瘻不入湯一名葱苳一名葱菜一名山葱生太山山谷二月
採根陰乾

及已味苦平無毒主心腹積聚除二蟲生山谷二月採
烏甘味苦平無毒主心腹積聚除二蟲生山谷二月採
痺好逆上氣破積聚寒熱消胃上瘰癧冷食不下心腹冷疾臍

間痛有脚痛不可使仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之
名射罔殺禽獸

射罔 味苦有大毒療尸疰癰堅及頭中風痺痛一名毒一
名即子一名烏喙

射罔 味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱瘰癧
墮引腰痛不能行步癰腫腰結又墮胎生則陵山谷正月一
月採陰乾長三寸以上為天雄

天雄 味辛甘温大温有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣發
急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行麥頭而風去來疼痛
心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武
勇力作不倦又墮胎一名曰幕生少室山谷二月採根陰乾

射罔 味辛甘温大熱有大毒主風寒欬逆邪氣温中金瘡破
癰堅積聚血癰寒濕痺拘攣膝痛脚冷弱不能行步腰
脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎
為百藥長生捷為山谷及廣漢冬月採為附子春採為烏頭

射罔 味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節脚冷寒熱鼠
瘦又墮胎

射罔 味辛温有大毒主賊風在皮膚中淫痒痛温瘰癧毒
諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山二
月採花陰乾

射罔 味苦温微温有毒主五臟邪氣心腹寒熱羸瘦如癰狀
發作有時諸關節風濕痺痛癰疽風流走四肢脚弱一名完
草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾

射罔 味苦辛微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散
結氣腹中邪逆食飲大熱瘵老血在心脾間欬唾言語氣臭
散胃中熱氣久服令人虛一名烏扇一名烏蒲一名烏嬰一

名烏吹一名章蔓生南陽川谷田野二月三日採根陰乾
射罔 味苦辛有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癰瘰癧聚大水
下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採
射罔 味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破
癰瘰癧除頭風止金瘡花瘰癧瘰癧令人洩一名貫節一名貫渠
一名百頭一名虎卷一名栴檀一名白萍一名藥藻此謂草
鵲頭生玄山山谷及冤句少室山二月八月採根陰乾

射罔 味辛平生微寒熱温有毒主傷寒寒熱心下堅下氣喉
咽腫痛頭眩胃脹欬逆腸鳴止汗消心腹胃腸熱滿結欬
嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎瘰癧黃汗
面目生令人吐熱令人下用之湯洗令消盡一名守田一名
地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾
射罔 主毒腫結熱
射罔 味苦温微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋
瘰癧利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及冤句二月八
月採陰乾
射罔 味苦甘寒有毒主齒痛中蠱肉痺拘急使人健行見
鬼瘵癰狂風潮頭倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔
馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及雍州
五月採子
射罔 味辛平微温有毒主瘰癧及欬逆寒熱腹中癰堅瘰癧結積
聚邪氣蠱毒鬼疰瘰癧中邪結氣吐之生江林山川谷及
蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾
射罔 味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱熱發溫瘰癧鬼毒瘰癧中
瘰癧吐逆瘰癧鬼蠱往來水脹酒酒惡寒鼠瘦一名五草生益
州川谷及漢中八月採根陰乾

青樹 味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風癢身痒殺三蟲惡瘡疥癬癰蝕下部腫癢子名章次明療瘡口青一名章蒿一名章蒿生平谷道傍二月採葉陰乾五月六月採子

牙子 味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥癬惡瘡癰疽去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及冤句

八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人

白 味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名冤

拔一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷一月八月採根具乾

白 味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痲緩不收除白癬疥蟲一名甘根一名連及草生北山川谷及冤句及越山

益州山 谷八月採陰乾

日 一名青蒿一名方漬生華陰川澤

蛇 味鹹甘平微溫有小毒主心痛溫中去長蟲白癢燒蟲蛇螫毒瘡疥癬蟲疽蝮去蛇蟲寸白惡瘡一名瞿蠭生東海

池澤及渤海武八月採陰乾

草部 下品之下 六十八味

生太山 山谷八月採陰乾

白頭翁 味苦溫無毒有毒主溫瘧狂易寒熱微殺積聚癰氣

逐血止痛療金瘡蠅蚋一名野丈人一名胡王使若一名柰何草生高山山谷及田野四月採亦療毒痢

臘 味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癰疽除息肉一名屈据一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良

羊 味苦寒主面目通身漆瘡作灰療金瘡大驗

羊 味苦寒有毒主燥熱身暴赤色風水積聚惡瘡除小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼桃一名羊腸一名長莖一名御衣一名鈹式生山林川谷及生田野二月採陰乾

蟲 一名東方伯一名連蟲陸一名鬼目一名蠶生陳留川澤

生汶山 山谷

又療牛病 生桂陽川谷

短氣 不足脚腫生熊耳川谷及冤句立秋採

草 一名及生田野者其葉採葉秋採並根

氣 殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月十月採

氣 脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川

谷四月採

烏 味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣療黃疸

金匱要略中在氣好顏色生山谷石上

味苦微寒有毒主驚癇瘧疾手足熱氣在腹中腹中痛

瘧疾陰熱下二蟲去蛇毒一名葉休生山陽川谷及荒甸

百長生味微溫主通利月水破留血凝結

三蟲一名丹草生咸陽山谷

葉七月採花陰乾

馬鞭草主下部腫瘡

胡桐味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩渴水和服之取

吐又主牛馬急黃黑汗水研二三兩灌之立瘳又為金銀錢

藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃蘗實有皮肉木

者云是胡桐樹液淪入土石皴固地作之其堅高太皮赤似

白楊青桐葉故多胡桐木堪器用又名胡桐律西域傳云

胡桐似桑而曲

馬鞭草味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬死生園中久腐處

主腫上小便利

大寒主胃腹大熱不止瘰癧瘰癧射上傷寒大熱甚良

字根寒主小兒赤丹其清汁汁瘰癧

大寒主腸胃固執消渴止小便利

寒主解中毒煩悶

平主婦人崩中吐衄血不止燒作灰服之

平主中蠱毒燒作灰水服

味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣生屋

上陰處八月九月採

亦地利味苦平無毒主赤白冷熱諸利斷血破血帶下赤白

生肌肉所在山谷有之

亦卑使也味苦苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癰疽五藏積氣

除積聚消腫生池澤畔

白甘味苦辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癰

除積聚消腫生池澤畔

苦辛苦寒有毒主下氣秦脚雨水腫除風毒利小便

浮腫瘡封之湯漬散傳並良

生山谷中不入方用

龍眼子味甘辛平有小毒主水腫水研一十枚服之吐惡添

加至三十枚三日一服瘳則止又主風虛寒熱身熱瘰癧

腫尸疰惡氣疰取油塗之葉主脚氣風腫不仁瘰癧傳之

味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘰癧虛熱消瘳

汁及生汁服之生故墟道傍

移生草味辛苦溫有大毒主蠱疰諸毒瘡及等生齊魯山澤

獨行根味苦苦公有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨為

泥封之日三四次瘳水煮一二兩取汁服吐蠱毒

烏頭 味酸苦寒無毒主風毒熱腫游丹蛇傷膏傳并飲之
各 味苦寒有小毒主熱蠱煩渴不能食生搗汁服三四合
多則令人吐

狼毒 味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅
下積癰瘰癧鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續毒生
秦耳山谷及秦島二月八月採根陰乾而沈水者良

蛇白 味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐
邪解百毒瘡癰喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚腎熱
大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九日一名天曰
一名解毒生九真山谷及冤句二月八月採根

甘蕉根 味甘寒主消渴客熱止小便利
甘蕉根 大寒主癰腫結熱

龍膏 味苦平無毒主浸淫疥癬瘡疽殺三蟲療女子陰蝕生
東萊山公五月採陰乾

龍豆 味酸寒無毒主惡瘡癰疽膏傳之殺諸小蟲生道傍
同實 味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫
龍公草 味甘平無毒主婦人乳癰腫水煎汁飲之及封之立
消一名攝攝草

間陸 味辛酸平有毒主水腫疔瘡癰疽除癰腫殺鬼精疔瘡
胃中邪氣水腫癰疽腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有
神一名芴芴一名夜呼生咸陽川谷

女青 味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥一名
雀蛇蛇銜根也生朱崖八月採陰乾

水蠱 主蛇每搗傳之絞汁服止蛇毒又內心悶水煮漬持脚
消氣腫

角蒿 味辛苦平有小毒主甘濕蠱諸惡瘡有蟲者

紫葉同 味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨
屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾

白附子 主心痛血痺面上百病行藥熱主蜀郡三月採

鴆 味苦平有小毒主蛇蟻蟲用之為散以肥肉臍汁服方
寸匕亦圓散中用生西戎

龍帶 主腹脹痛喘如蟻汁服主胃反小便失禁不通及淋
中惡尸疰金瘡刀不出

龍腦 水服主噎噎心痛胃滿
龍腦 水煎汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止

及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止

龍 味甘平無毒主女人產不出煮汁飲之一名龍一名驚
麥生故墟野林下葉似麥

龍 久若主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒
灰水服之

木部上品二十七味

茯苓 味甘平無毒主胃脅逆氣憂憂驚恐悸心下結痛寒
熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好啞大腹淋瀝腸中
痰水水腫淋結開胃腕調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守

中又服安魂養神不飢延年一名伏兔其有木根者名茯神
茯苓 平主辟不得瘵風眩風虛五勞口乾止驚悸多悲怒善
忘開心益養安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月
採陰乾

五淋生 味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消痰血通
五淋生永昌

龍 味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥癩風氣安五藏
除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主

惡瘧久服輕身不老延年一名松骨一名松肪生太山山谷六月採

松葉味甘溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

狗脊味甘平無毒主驚悸妄五藏氣陰風濕痺瘡疥瘰癧

狗脊明不飢不老輕身延年生太山山谷積葉九良

狗脊味甘微溫無毒主吐血衄血利血崩中赤白輕身益氣

狗脊主火灼爛瘡長毛髮

狗脊味辛溫無毒主百病養精神顏色為諸藥先聘通使

狗脊久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交趾桂林山谷

狗脊味辛溫無毒主下氣効逆結氣噎痺吐吸心痛脅風骨

狗脊痛濕筋通脈止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不

老生南海山谷

狗脊味甘辛平苦平無毒主瘰癧瘡風痺浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所在大山皆有

狗脊味甘辛溫無毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓腰膝五藏

五緩急急風寒濕痺瘰癧瘡疥瘰癧消痰血痞結腰痛女子血利

小腸去蛇蟻生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至

後採乾之

狗脊味甘辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明

目眩齒利九竅去白蟲長蟲上風頭痛腦鳴目淚出益氣久

服輕身耐老令人潤澤顏色小劑實亦等

狗脊味甘辛溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣

生河間南陽宛句山谷或平壽都鄒高岸上及田野中八月

九月採實陰乾

狗脊味甘辛平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服

肥健輕身不老生武陵川谷冬採

狗脊味甘辛平無毒主腰膝痛小兒背強癰腫安胎充飢

茵陳 味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胃中嘔不止洩利瀉露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐折療鼠瘻明目益氣生交趾寬旬三月九月十月採皮陰乾

茵陳 味甘苦平無毒主疥癬解毒藥不祥利水道久服輕身一名猓猓生衡山山谷及濟陰寬旬二月八月採陰乾

茵陳 味苦平大寒無毒主逆上氣溢筋急惡瘕殺小蟲除煩熱風寒嘔吐根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主五疳黃疸神明輕身益氣生益州

茵陳 味苦平大寒主胃中痰熱逆上氣瀝大寒瘥暴中風風痺胃中大熱止煩悶

茵陳 味微寒主嘔噦溫氣寒熱吐血崩中溢筋

茵陳 味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

茵陳 味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦瘥除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胃中痰滯停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安胃氣止瀉洩明目生河內川澤九月十月採陰乾

茵陳 味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕理去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面腫溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利久服輕身明目強力長年一名蜀葵一名雞足一名魁實生漢中山谷及琅邪寬旬東海縣九月十月採實陰乾

吳茱萸 味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛散逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸實不消中惡

吳茱萸 味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛散逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸實不消中惡

心腹痛逆氣利五藏根殺三蟲根白皮殺燒蟲治喉痺逆止洩注食不消女子經產餘血療白癰一名殺生上谷川谷及寬旬九月九日採陰乾

秦皮 味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗寒氣除熱目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癰身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名客皮一名名檀生廬江川谷及寬旬二月八月採皮陰乾

狗脊 味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒飽鼻白頰赤癰瘡瘰癧自熱赤癰胃心大小腸大熱心中煩悶胃中熱一名木丹一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾

獨活 味苦溫無毒主消穀逐水除痰瘰癧殺三蟲伏尸瘠寸白生南海

合歡 味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州山谷

秦椒 味辛溫生溫熱寒有毒主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神生大山川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採實

茵陳 味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒生霍山山谷八月採陰乾

茵陳 味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中瘕瘕血閉寒熱羸瘦養胎

茵陳 味苦無毒主瘥癘益氣一名陵茗一名多華生西海川谷及山陽

茵陳 味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒

茵陳 味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒

去二蟲化食逐寸白散腸中噓噓喘息一名無姑一名殿塘生曹山川谷三月採實陰乾

家蠶 味辛苦大熱無毒功用與桑葉同少為劣爾療水氣用之乃佳

狼子木 味甘鹹平無毒王折傷破惡血養好血安胎止痛生肉

始王木 味苦平無毒王傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷

折傷木 味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血閉止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷

苦茶 味甘苦微寒無毒主瘰癧利小便去痰熱渴令人少睡春採之

主下氣消宿食作飲加茱萸薑等良

根白皮 味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脈絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

甘有毒 黑者王女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其毒熱陳白者止久洩益氣不飢其金色者治癰飲積聚腹痛金瘡一名桑園一名木麥五木耳名櫟益氣不飢輕身強志生獾為山谷六月多雨時採即暴乾

味苦甘平無毒 主腹脹邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛療發熱溫瘧可為吐湯利水道一名女羅生熊耳山川谷

松樹上五月採陰乾

味辛寒無毒 主心腹癰腫潰膿止痛決刺結瘰癧丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺主癰

州川谷

刺花 味苦平無毒王金瘡內涌冬至後百二十日採之實主明目心腹癢痺除熱利小便生道傍四月採一名疥莫一名馬胸一名刺原又有棘針療腰痛喉痺不通

黑 色為塊新者亦柔靱

及 味辛苦微寒一云溫平無毒主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚腎出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云合糯一作米炭相思子貯之則不耗膏王耳聾

等州 味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交廣

等州戎人謂之二果

本部下品四十五味

味苦平有毒 主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除邪逆寒熱一名凌泉一名大就生蜀郡山谷三月採根陰乾

味辛苦平有毒 主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛癢脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男實殺蠱毒破積聚逐風痺一名鬼目主華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾

味辛溫生溫熱 實有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲癰癰大腹水脹蕩滌五藏六腑開通閉塞利水殺道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺斑蝥毒可鍊銀之益血脈令人色好變化與鬼神通一名巴椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去

心皮

獨 味辛溫大熱有毒主邪氣熱速溫中透骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢清精女子字乳餘癰散風邪腹結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白髮身增年開腰理通血脉去積聚調經節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名薄藪生武都川谷及巴郡八月採實陰乾

附 味辛苦溫有毒主風頭腫痛乳癰疔瘡除結氣疥癬殺蟲魚瘰癧不通乳難頭風瘰癧可用沐勿令入眼一名瑠璃一名養草生山谷及宛句五月採葉陰乾

龍 味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道根主毒瘡腫齒堅齒去白蟲一名爵李一名單下李一名棗生高山川谷及丘陵上五月六月採根

王 味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名柳生田野採無時

苦 味苦寒無毒主目痛淚出傷腎消目腫生漢中川谷五月採

微 微溫無毒主瘰癧瘡瘡

微 微溫主霍亂吐下不止

甘 味甘無毒主五癰去三蟲毒生永昌

苦 味苦溫無毒主風濕痺痛除四肢腰脊氣脹痛一名多椒一名猪椒一名桑椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採根葉釀酒

金 主金瘡止血

雷 味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫

夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲守白自出不止久服令陰痿一名雷矢一名雷靈亦著殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴乾

腹 味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣遺溺通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川谷及田野改丘墟地四月採

白 白湯皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃

白 白湯皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易在皮膚中癢癢等消潰服之取葉圓太蒂小無風自動者良水湯葉燉枝味苦平無毒主久刺亦白搗和水絞取汁服一升日二大效

刺 味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癰癩狂無濕痺寒冷癢痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有藥花功用又別非此花也

小 味苦大寒無毒主口瘡甘露殺諸蟲去心腹中熱氣一名山石榴

寒 味苦平無毒主三蟲下氣消穀

微 微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

苦 味辛溫無毒主邪氣諸瘕瘕酸續絕傷補骨髓一名連木生蜀郡山谷採無時

白 味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物癰腹脹滿消穀除熱蠱囊結婦人胞不落明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月採葉陰乾

雷 味苦寒有小毒主溫瘧傷寒大熱煩狂殺三蟲疥癬利小便水道

龍腦 瘵瘵瘵精小便洩精商主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸癰殺精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒

主驚癇癲疾 身熱如火腹中堅方熱洩父服輕身通神明延年生晉地川谷及大山巖水岸土穴中死龍處採無時

主驚 味苦平有小毒主驚癇寒熱盛狂狂除邪逐鬼療小兒百病諸癰熱口不開大人狂顛又墮胎父服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光

主瘵 味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘵瘵毒癰瘵去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急瘵瘵毒婦人產難墮胎去面黧目中膚腎久服除邪不夢驚癲癲通神仙山中臺川谷及益州雍州山谷春分取之生者益良

止渴

牛乳 微寒補虛羸止渴

羊乳 溫補寒冷虛羸

微寒補五藏利大腸主口瘡

微寒 味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面好飽食飲時嘔久服強志不飢輕身長生生雍州山谷十一月取

味甘 平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋瀝折跌傷損久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煮鹿角為之得火良

味甘 平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒如瘵狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不

足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傳致膠生東平郡煮牛皮作之出東阿

味甘 平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利功優於酥生酥中

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

上熱 味甘平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

味甘 平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

甘草味甘大熱無毒主緩中平乳餘痰及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

芍藥熱主虛勞寒中羸瘦

燐之主小兒洩痢腸鳴驚癇

白朮下閉血瘀血疲痛女人帶下血燐之味苦無毒水干時瘳時氣寒熱頭痛補中填骨髓久服增年

蘭味甘溫無毒主安五藏平三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩痢消渴以酒服之

可圓無瘳味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

主虛志

肝主明目

主補腎氣無精

主小兒牛癘

白朮味鹹平無毒主消渴止吐洩安中益氣養脾胃自死者不良

寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燐之主肩瘦惡瘡

黃連主水腫腹脹脚滿利小便

白朮味鹹甘平無毒主傷中脈絕陰不起強志益氣長肌肉肥健生小兒驚風除百病

眼主黃眼赤眼

主毒瘡疥癩惡氣鬼毒瘰癧不祥止衄血內漏

生雲中平

白朮療婦人產下白崩

亦馬胎療婦人赤崩

主小兒馬瘳

主生髮

主女子崩中赤白

主喜志

主寒熱小兒疳瘳

味辛苦冷主熱下氣長助強腰脊壯健強志輕身不飢

療寒熱瘳

名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金瘡止血

主喜眠令人不睡

味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積聚婦人瘕疾

銅器飲之

女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日

主明目如湯惡瘡

主憂志氣除邪

主頭風痺下部匿瘡鼻中息

主類癩寒熱卒風癰伏日取之

主金瘡止血

白朮味鹹溫主安五藏補絕傷輕身益氣

味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣

主寒熱小兒驚癇

味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志

生齒不老療虛勞酒酒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利

洩精溺血破留血在腹散石淋腫骨中熱瘳

安胎下氣殺鬼精攪不可近陰今瘳久服耐老四月五月

解角時取陰乾便好

味鹹無毒主惡瘡瘰癧逐邪惡氣留血在陰中除小腹血

急痛腰脊痛折腰惡血益氣七月取

味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋急痛救逆以酒和服之良

主補腎氣

肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之

主虛損洩精

肉溫補益五藏

主氣力悅澤人面

主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡肩膊頭骨尤良

主狗咬瘡

辟惡魅

肉主惡心欲嘔益氣力

肉味甘酸平無毒主安五藏補絕傷軀身益氣久服利人

刺者心腹痛走無常處及肩膊惡瘡頭骨尤良

肉瘰癧症

陰平主月水不通男子陰癰燒之以東流水服之

肉平無毒主頭眩痛癰疾

主熱中消渴

主凍瘡

主目暗

肉味辛平無毒主補中益氣

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇狂走

胎胎毛尤良

肉主墮胎今產易生山都平谷

收風頭腫氣通膝理柔皮膚不可久陰令痿一名官脂

肉味甘無毒主痺止血共氣力生南山山谷及淮海邊子月取

肉味甘溫無毒主驚癇癰疾鬼疰蠱毒除寒熱首勝九瘡

邪氣變縮一名豚頭陰乾藏之勿令敗

肉主五痔伏瘕在腸腸內蝕

肉主小兒驚癇五月五日取

主驚邪憂志

主和理腎氣通利膀胱

主傷寒熱渴

主補中益氣止渴利

主小兒驚癇

肉主諸骨藥解斑蝥先青毒

肉味甘酸平無毒主瘰癧瘰癧

肉味甘平閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡

者尤甚

肉主寒熱黃疸濕痺

肉味鹹無毒主癰疽諸癰蝕惡瘡陰囊爛瘡在土中行五

月取令乾燔之

肉味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鱗止又救燒服之

肉瘰癧氣溫病及牛馬時行病瘰癧之亦良

五藏及腸味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰癰腫

雄狐尿燒之辟惡在木石上者是

肉主馬肺病蟲蝨等病

二又主水腫不瘳垂死者作羹臠食之下水大效胞乾之湯

磨如雞卵許公腹脹吐諸蠱毒

白蜜 味甘平無毒主金瘡止血生肉療癰腫水研如漿
按日二服之

白蜜 主心腹卒痛諸症

白蜜 主心腹卒痛諸症

白蜜 主濕水

白蜜 主濕水二服五合良燥水者晝體成字濕水者不忌食
乳小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主小兒熱多等症多服便利

白蜜 主風寒濕痺五緩六急安胎
無毒主中惡腹痛及諸折骨痛乳難

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

白蜜 主下血閉

頭血主雀盲

頭目痛次癰癰女子帶下源不利除疝瘕育取之良

書骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾

雄鵠味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散

解者是雄也

鵝膽味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之

鵝屎味甘平有毒主蠱毒鬼症逐不祥邪氣破五癰利小便

生青尚山平谷

孔雀屎微寒主女子帶下小便不利

鵝屎一名蜀水花去面黑野竈誌

頭微寒主鯁及噎燒服之

鵝頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癰疾

千金翼方卷第三

安主小兒頭瘡口瘡重舌目翳一名鮒魚令專作藥土胃弱不下食作鱸主久赤白痢

伏龍味鹹平無毒主目眩癢痛利水道明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂一名蠅蠅生太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾

天龍味辛寒無毒主面腫腫皮膏洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑肝一名鼠法一名石肝生合浦山谷十月十二月取

龍子味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒復殺之又療腹痛疝積亦燒為灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕

石龍子味鹹寒有小毒主五瘰癧結氣破石淋下血利小便利水道一名蜥蜴一名山龍子一名守宮一名石蜥生平陽川谷及荆山山谷間五月取若石上令乾

蜂蟻味苦鹹平有毒主驚癇瘰癧寒熱邪氣癰疾鬼精蠱毒腸痔火熱之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂刺生梓桐山谷七月七日採陰乾

補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河內川谷樗樹上七月採暴乾

乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠱

人面色好男子陰癆病女子崩中赤白淫液餘病滅諸瘡癰痕生頰川平澤四月取自死者勿令中濕中濕有毒不可用宋味苦平有毒主目赤痛些傷淚出瘀血血閉寒熱酸慄

無子一名魂常生漢中川澤五月取

利血脈及九竅女子月水不通積聚除賊血在胃腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良

子通利血脈生晉陽川澤及人家屋間立秋採

堅主涌痛月閉目中淫膏青腎白膜癆吐血在胃腹不去及破骨膝折血結金瘡內寒產後中寒下乳汁一名蠟蟻一名蜚齊一名勃齊生河內平澤及人家積糞草中取無時及行者良

月取

無子利水道及墮胎一名跋一名至掌生雷澤池澤五月六月採暴乾

惡肉療溫瘡血痕腰痛小兒脅下堅

中重痛小兒氣瘰瘻潰

中下血五色小腹陰中相引痛瘡亦死肌五邪痔瘡時驚腰

肉主少氣吸足不立地生南海池澤取無時

烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕

腫痛寒熱瘕瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘕多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時

鱖魚味鹹寒有毒主胃中邪氣熱結痛鳴僻面腫敗瘰癧之致

小主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時

魚味鹹雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精

魚主溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癢乾

鱖魚味甘有毒主五疳瘕瘕殺諸蟲

鱖魚皮主蠱氣蠱疰方用之即殺力乾鱖魚皮也

紫貝主明目去熱毒

蝦味辛寒有毒主邪氣故瘕堅而難腫陰瘕瘕服之不患熱

病瘕陰蝕疽癰惡瘡銅火傷瘡能合玉石一名蟾蜍一名鼈

又一名去甫一名苦蠶生江湖池澤五月五日取陰乾東行

者良

龜味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡癰傷止痛氣不足一名長

股生水中取無時

龜微溫無毒瘕瘕折續筋骨搗搏之二日一易四足及尾

王婦人墮胎易產

肉熱無毒主小兒疳瘕大腹時行勞傷

微寒無毒主小兒疳瘕大腹時行勞傷

蟬味甘苦寒有小毒主心腹脹痛下部腫瘡目腫痛

平有小毒主皮膚風毒婦人產後瘕瘕餘疾

蟬味甘苦微寒有毒主瘕瘕

肉釀作酒療癰疾諸瘕心腹痛下結氣除蠱毒其腹中杏鼠

有小毒瘕瘕瘕

鱖甲微寒主五邪驚喘悲傷燒之作灰以酒或水和方寸

匕瘕瘕瘕

肉味酸微寒主大人小兒瘕七月七日取其網療喜志

石味鹹寒有毒主五瘕破石淋墮胎

肉解結氣利水道除熱一名沙蟲生江漢池澤

蛇味甘平無毒主小兒百一十種瘕癰瘕癰瘕寒熱

腸時蟲毒蛇癰疥古搖頭大人五邪言諸得越惡瘕瘕明

目火熱之良一名石出子衣一名蛇符一名龍子皮一名龍

子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月十五日取

之良

蛇主心痛瘕疰石淋產難小兒驚癇以水煮研服汁出鎮

南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色

蛇味辛溫有毒主鬼瘕蠱毒瘕瘕蛇蟲魚毒殺鬼物老精

溫瘕去三蟲瘕心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江

南赤頭足者良

龜味辛溫有毒主腹中大堅瘕破積聚息肉惡瘕白瘕瘕

寒熱瘕結瘕下痢一名百足一名馬鮠生玄竟川谷

龜味辛平無毒主父蠱瘕瘕毒氣出刺出汗瘕瘕室其土

房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及梓桐或人室間

龜味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名燥

合生漢中採蒸之生樹枝間結蚶房也八月取

蟬味酸溫微寒無毒主氣瘕不得小便婦人月閉血瘕瘕

瘕寒熱利水道一名負蟬一名蟬蟬一名蟬蟬生魏郡平谷

及人家地上五月五日取

蛇 味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼瘧通神精一名夜光一名放火一名燭燭一名即燭生階地池澤七月七日取陰乾

魚 味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強背起摩之又療淋瀝胎塗瘡滅癰一名白魚一名鱈生咸陽平澤

白頭 味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸鬼瘧蠱毒殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍生平土三月取陰乾

蠅 味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下咽噎解毒除惡瘡一名蠅站一名天蠅一名蠅生東城平澤夜出者良夏至取暴乾

蟻 味鹹寒有毒主小兒驚癇瘕瘕腹脹寒熱大人癰疾狂易手足端寒肢滿貫脉一名蟻蟻火熱之良生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐

所 味辛寒有毒主寒熱鬼瘧蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡阻蝕死肌破石瘡血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取陰乾

蛇 味辛微溫有毒主蠱毒風瘧鬼瘧墮胎三月取暴乾

地膽 味辛寒有毒主鬼瘧寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癰瘕瘕蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下一名蜺青一名青蛙主汶山川谷八月取

馬刀 味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠癰止煩滿補中去厥痺利機閥用之當

鍊得水爛入腸又二得水良一名馬蛤生江湖池澤及東海取無時

田中 味鹹平有毒主目腎鬼瘧蠱毒腰痛下血五瘕利水道除寒熱溫瘧解肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤

甲 味鹹平無毒主目腎痛氣急止利下淋生南海

鱗 味鹹平無毒主目中翳斷血生肌貝類也大如鯢皮黃黑而骨白以為馬飾生南海採無時

論曰為獸蟲魚之類凡一百一十六種皆是生命各各自保愛其身與人不同所以稱近取諸身遠取諸物人自受命即鳥獸自愛固可知也是以須藥者皆須訪覓先死者或市中求之必不可得自殺生以救己命若殺之者非近方之意也慎之慎之

果部二十五味

豆 味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海

藟 味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原縣煌山谷

酸 味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅強志倍力有子又療暴中風身熱大驚久服輕身不老一名覆盆一名

覆 一名陰囊生荆山平澤及宛句

甘 味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採

大 味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣

通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥補中

益氣強力除煩悶療心下懸腸脾久服輕身長年不肌神仙

生藥 味甘辛多食令人多寒熱瘧疾者不可食

藥覆麻黃 能令出汗生河東平澤

鵝寶 味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕

身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

雞頭寶 味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣

強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙一名鴈喙寶一

名文生雷澤池澤八月採

麥寶 味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身一名麥

粟 味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生山陰九

月採

櫻桃 味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

梅實 味酸平無毒主下氣除熱煩渴女心肢體痛偏枯不仁

死肌去青黑誌惡疾止下痢好唾口乾生漢中川谷五月採

火乾

枇杷 味苦平無毒主卒死不止下氣

柚 味甘寒無毒主通鼻氣腸胃不足

木瓜 味酸溫無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其

枝亦可煮用之

甘藷 味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸

白蜜 味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利出益州及西

戎煎鍊沙糖為之可作餅塊黃白色

沙糖 味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之若甘蔗汁煎

作蜀地西戎江東並有之

芋 味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝

烏芋 味甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名藉姑一

名水萍一月生葉如芋三月三日採根暴乾

杏核仁 味甘苦溫冷利有毒主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產

乳金瘡寒心胃腸驚癩心下煩熱風氣去來時行頭痛解肌

消心下急殺狗毒五月採之其兩仁者殺人可毒狗

蛇 味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆

寶 味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷

桃核仁 味苦甘平無毒主瘀血閉經邪氣殺小蟲止欬逆

上氣消心下堅除卒暴擊血破癰腫通月水止痛七月採取

仁陰乾

桃花 殺疰惡鬼令人好顏色味苦平無毒主除水氣破石淋

利大小便下三蟲悅澤人面三月三日採陰乾

桃葉 味苦微溫主殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五毒不

祥一名桃奴一名暴暴是實者樹不落實中者正月採之

桃仁 主下血瘕寒熱積聚無子帶下諸疾破堅閉剉取毛用之

桃 殺鬼辟邪惡不祥食桃樹蠱也

白皮 味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱

葉 味苦平無毒主除尸蟲出瘡中蟲

鍊之 主保中不飽及風寒

實 味酸多食令人有熱生太山川谷

李核仁 味苦平無毒主僵仆躑躅血骨痛

椒 大寒主消渴止心煩逆奔氣

實 味苦除痼熱調中

梨 味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食

余 味苦寒多食令人臃脹病人尤甚

女石榴 味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食

酸實 療下痢止漏精

東行形 療蛇蟲寸白

白瓜 味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣不肌久服

輕身耐老主除煩滿不樂久服寒中可作面脂令面悅澤一

名水芝一名白瓜子生青高平澤冬瓜人也八月採

白瓜 味甘微寒主除小腹水腫利小便止渴

瓜 味甘苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒效逆

上氣及食諸果病在胃腹中皆吐下之去腹中息肉瘰癧黃疸

花 主心痛效逆生青高平澤七月七日採陰乾

之 味甘寒無毒主五藏六腑寒熱癰瘦五癰利小便療

婦人乳難內閉久服堅骨長肌肉輕身延年生少室山十二

月採之

之 味甘苦寒無毒主惡瘡癰瘰利小便解蜀椒毒

苦為百菜主其心傷人

見 味甘寒大寒無毒主青盲白瞖明目除邪利大小便去

寒熱殺蛇蟲久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實細

莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採

苦 味甘苦寒無毒主五藏邪氣厥氣胃痺腸澼渴熱中疾惡

瘡久服安心益氣聰察少壯輕身而老耐飢寒高年不老一

名茶苦一名游冬生益州川谷山陵道傍凌冬不死

三月三日採陰乾

青 味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目目痛

及 味甘溫無毒主利五藏輕身益氣可長食之無

毒子主明目

來 味甘溫無毒主服及炮炙服食大下氣消穀去痰

滑肥健人生持服上消渴試有大效

龍 味甘苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療子腫所

在有之

之 味甘溫無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴

不 味甘溫無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明目日安中久食

溫中

自 味甘平無毒主安中利人可久食

之 味甘溫無毒主效逆下氣溫中補體葉主調中去臭氣

九月採陰乾

之 味甘溫無毒主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫難

身生雷澤川澤

之 味甘溫無毒主明目補中不足其莖葱白半可作湯主

傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺不通安胎歸

於日除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒

之 主傷寒頭痛

之 平溫主弱血解穀蘆毒

之 味甘苦溫無毒主金瘡瘡敗輕身不飢耐老歸於骨菜芝

也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗

之生魯山平澤

之 味甘微酸溫無毒歸於心安五藏除胃中熱利病人可久

食子主夢泄精溺白根主養髮白裏荷微溫主中蠱及瘡

之 味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒

之 味甘溫主下氣除寒中其子尤良

之 味甘溫無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟惡

氣久服通神明輕身耐老主吐血衄血血崩一名雞蘇一名

勞祖一名芥菰一名芥菰生九真池澤七月採

之 味甘溫無毒主寒熱風癰瘰癧生瘰癧結聚聚下瘰癧

除濕一鼠真一名薑芥生漢中川澤

味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫

宿食不消下氣養汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解

勞乏

味辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者生下

濕地所在有之

地川澤

味辛平無毒主女子赤白帶下血養精保血脉益氣令人

肥健嗜食一名水葵生南海池澤

似橘皮而無苦味

味甘寒無毒主消渴熱痺

味酸寒無毒主滑中散熱主悅澤人面一名天葵一

名紫露

味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日中採乾用之

味辛微溫主蠅蚋瘡多食令人氣喘

味辛溫有毒主散癰腫瘡除風邪殺毒氣獨子者亦佳

歸五藏久食傷人損目明五月五日採

除邪毒五月五日採之

味甘寒無毒主馬毒發瘡洗之并服之重葉也出小

品方萬異云云除蛇蝎毒及癰腫

味辛溫無毒主風游丹腫乳癰

米穀部二十八味

味甘平無毒主傷中虛羸補土內氣力長肌肉填髓

腦堅腸鳴寒食者止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱藏因久服

輕身不老明目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不

落生者產後生者一名巨勝一名狗頭一名方壺一名

味辛平無毒主五藏邪氣風寒濕痺在氣補腦髓堅筋

骨久服耳目聰明不飢不老增壽一名生中原川谷

散腹多食令人見鬼狂走久服通神壯身一名麻勃此麻

花上勃勃者七月七日採長

味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐水利小便破積

血復血脉乳婦產後餘疾長移可為沐藥久服肥健不老神

仙九月採入土者損人生太山川谷

味甘微溫主補虛多止渴去血

味甘平無毒主濕痺筋攣腰癢五藏胃氣結積益

氣止毒去黑疥潤澤皮毛

味甘平無毒主積年惡瘡不愈五月五日中採乾用之

熱痺傷中淋瀝下血散五藏結積內寒殺烏頭毒久服令

人身重炒為屑味甘主胃中熱去腫除痺消穀止腹脹生太

山平澤九月採

味甘酸平無毒主下水排癰腫脹血寒熱熱中消渴

止利小便止逆卒澀下脹滿

味甘寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘧疾煩躁渴悶虛勞

喘吸脚冷又殺六畜胎子

味鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣調中又云令人多

熱為五穀長

吐留中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜軟

味甘無毒主消渴熱中女子血虧生常山及少室採無時

陵石 味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤

石 味甘無毒主明目益精去白癆延年

後石 味甘無毒主清渴傷中益氣生大山陰採無時

白肌石 味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石

一名洞石生廣德國卷山青石間

龍石 無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

五石 主輕身長年一名金黃生海水中蓬陵山上倉中黃

如金

石 味酸無毒主療淺益肝氣明目輕身長年生武都山

石間青白色

石 味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石者生

山石間

石 味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採

紫加石 味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無理生邯鄲

山如爵此二月採

後石 味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

石 味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松

高五六寸紫花用莖葉

文石 味甘主寒熱心煩一名秦石生東郡山澤中水下五色

有汁潤澤

曼諸石 味甘主益氣輕身長年一名陰精六月七月

石上青黃色夜有光

山石 味苦平有毒主女子帶下一名秦石生山之陽正月

生葉如藜蘆葉有衣

石 主明目益精氣令人不飢渴輕身長年一名石芥

石 味甘無毒主目痛流淚寒熱溢血一名蠶烈一名顧喙

二月五月採莖葉陰乾

石 味甘無毒主渴消中

路石 味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒濕益氣耐寒實骨髓

一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃至赤黑二歲

一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

石 味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

石 味甘無毒主渴痺

石 味甘無毒主目痛止痛除熱瘥

金 味甘平無毒主金瘡內漏一名葉金生澤中高處

石 味甘主百疾濟絕氣

石 味苦主小腹瀉利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年

生宛包一月七月採

石 味酸平無毒主明目一名來其實赤如五味十月採

石 味甘平無毒主小兒寒熱癰一名地蓋生垣墻下藁生

赤旦生暮死

石 味甘有毒療浮腫不可多食

石 味甘寒主調中明目一名羊麻一名羊栗生下濕地

莖有節生根五月採

石 味辛無毒主癰瘰

牛古 味酸溫無毒主輕身益氣一名豕凡生水中澤傍實

太葉長尺五月採

石 味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃二月採

立夏後母死

石 味苦寒主頭禿惡瘡疥癬癰生蜀郡

犀 味甘無毒主瘡一名犀洛一名泥洛

鹿 味甘無毒主小兒驚癇瘡疥癰癰大人瘡五月採

虎掌 味酸無毒。主輕身益氣。生丹陽澤地。高尺許。實如棗。

雀巢 味酸寒有毒。主蝕惡瘡。一名子雀。生海水石谷間。葉與實如麥李。

雀巢 味鹹。主益氣明目。一名去母。一名更生。生藍中。葉細黃。莖亦有刺。四月實。實中黑。五月採陰乾。

雞豆 味甘平無毒。主明目。日中寒風。諸不足。水腹邪氣。補中止洩。痢瘵。女子白沃。一名陰洛。生雞山。採無時。

相鳥 味苦。主陰痿。一名烏葵。如蘭香。亦生山陽。五月十五日採陰乾。

開耳 味酸無毒。主痺寒。寒熱止。一名無心。生田中下地厚。華肥莖。

蛇舌 味酸平無毒。主除留血。驚氣蛇癰。生大水之陽。四月採。花八月採根。

龍常草 味鹹溫無毒。主輕身益陰。氣瘰癧。寒濕生河水。傍如龍。芻冬。長生。

龍腰草 味鹹平無毒。主益氣力。多子。輕身長年。生常山。七月八月採實。

神護草 可使獨守。叱咄人。冠盜不敢入門。生常山。北八月採。無毒。主痺益氣。令人嗜食。生隴西。

吳萸草 味甘平無毒。主輕身益氣。長年生。故稻田中。日夜有光。草中有膏。

大雄草 味甘溫無毒。主益氣陰痿。生山澤中。狀如蘭。實如大豆。赤色。

蒼管草 味甘無毒。主輕身益氣。洗浴爛瘡。瘰癧風水。一名白氣。春生。秋花白。冬實黑。

水甘草 主療癰腫。盛熱。洗之。生木間。三月生。大葉如蛇床。

四四相值。但折枝種之。便生。五月花白。實核赤。三月三日採。

蒼管草 味辛溫無毒。主效逆。肺傷。生山陰。根如細辛。

九熟草 味甘溫無毒。主出汗止洩。瘰癧。一名烏粟。一名雀粟。生人家庭中。葉如棗。一歲九熟。七月採。

允草 味酸平無毒。主輕身益氣。長年生。蔓草。木上。葉黃。有毛。冬生。

酸草 主輕身延年。生名山。醴泉上。陰居。莖有五葉。青澤。根赤。黃。可以消下。一名醜草。

皇草 味甘無毒。主瘰癧。寒熱。去黑子。生籬木上。葉如葵。莖傍有角。汁白。

龍草 主癰腫。一名鼠肝。葉滑青白。

辛草 味辛無毒。主傷金瘡。

勸草 味甘無毒。主瘀血止。精溢。盛氣。一名黑草。生山谷。如枯樓。

吳萸草 味辛平無毒。主痺氣。強陰。瘰癧。面勞。疔。解煩。堅筋骨。瘰癧。風頭。可作沐藥。生蔓木上。一名鹿葵。九月採陰乾。

吳萸草 味鹹無毒。主理心。心氣不足。

封華 味甘有毒。主疥癬。養肌。去惡肉。夏至日採。

北岩華 味甘無毒。主氣脈溢。一云片華。

排華 味甘無毒。主上氣。解煩。堅筋骨。

節華 味甘無毒。主傷中。瘰癧。溢腫。皮主。脾中。客熱。氣一名山節。一名連節。一名通漆。十月採。暴乾。

徐李 主天無氣。輕身長年。生太山。陰如李。小形。實青色。無核。熟採食之。

如桃

合新木 味辛平無毒解心煩止瘡癰生遼東

桃木 味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如秦實赤三核

欒陽木 味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟

赤可食

學木 味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如雞核五

月採陰乾

木 療腸泄草療不足子療傷中根療心腹滯氣止渴十月採

狗 味苦療水身面癰腫五月採

秋 味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有刺實赤黃

十月採

桑 味酸溫無毒主字乳餘疾輕身益氣一名草王葉如

荏苒方莖大葉生園中十月採

蒲 味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長生

深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可 味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道

中穗如麥葉如艾五月採

實 味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

王明目補中

主傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐水

主魯山平澤

生方山山谷 味苦主惡瘡疥敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推

如燕盧採無時 味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉

白女腸 味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕生深山谷

中葉如藍實赤赤女腸亦同

白 味苦寒無毒主瘰癧皮膚寒熱出汗令人變

白 味辛平無毒主伏蟲白癰腫痛生山谷如藜蘆根白相

連九月採

白 味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名玉蕭

一名箭桿葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾

白 味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採

根白而香

白 味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名荒蒲十

月採

赤 味甘無毒主腰痛一名羊餘一名陵渴生山陰二月花

赤 味甘無毒主瘰癧中有核三月三日採葉陰乾

赤 味甘無毒主瘰癧中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處

採無時

黃 味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

除 味辛平無毒主心腹積瘕主惡瘡生澤中大莖細葉

香如薑本

黃 味甘生山陵三月四月採根暴乾

紫 味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫 味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月二日

採根根如烏頭

天 味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中

地 味苦平無毒主心氣女子陰血結一名承從一名夜

光二月採

地 味苦無毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青

腎女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生葉黃白色四月採

地筋味甘平無毒主去氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根
一名上筋生澤中根有七月生四月實白三月二日採根
地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青
生薑味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙
主小兒疳寒熱五月五日採
酸漿主惡瘡去白蟲生水像狀如澤瀉
酸漿味甘平無毒主內漏止血不足生昌陽山採無時
巴豆味甘無毒主寒止血帶下生雒陽
蜀椒味甘平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如霍
菌有刺
主緩筋令不痛
由根味甘平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草藤
上並有刺實如棧
參果味甘苦有毒主風癰一名白連一名烏蒙一名風聖一
名使蒲生百餘根根有衣裹莖三月二日採根
黃連味甘平無毒主心腹疝氣口瘡腫陽一名經緯
長蘆主苦痛止渴輕身生山陰蔓莖大如葵子滑小
八月採似蒼蘭
味苦主身瘡癰白亮瘰癧洗之生房陵
長蘆味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝
一名自死生平陵如蘭葉重厚白莖葉實赤黑九月採根

王明味甘苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草
精美根五月採
師參味甘無毒主癰腫惡瘡瘻洗之一名巨骨一名巨骨一
名鬼色生平澤八月採
殺鼠益氣明目一名巨骨實生末間華黃七月實黑
如大豆
採陰乾
主發逆上氣益肺氣安五藏一名蠶熏一名王荆三月
領左味甘有毒主心腹痛鍊中不足葉如辛草冬生燒作灰
又性相味甘辛有毒以熨癰腫瘻洗一名膏魚一名杜澤
索十味甘無毒主易耳一名馬耳
刺空療瘰癧八月十月採陰乾
生石上按之日系為沐
味甘無毒主止痛除血
味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢
味甘無毒主療跌折
味甘無毒主瘰癧
味辛無毒主瘰癧
味酸主結氣難在喉頭者生海中八月九月採
味辛無毒主心腹熱瘧
二葉味甘辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫一名三石一名當田
生田中差小黑白高二尺根黑三月採陰乾
五母味甘苦有毒主瘰癧不便下劑一名鹿麻一名歸澤麻
一名天麻一名若一草生田野五月採
疥拍腹味甘辛溫無毒主輕身瘰癧五月採陰乾生上黨

常更之生 味甘平無毒主明目實有刺大如稻米

救殺人者 味甘有毒主癰疽通氣諸不足生人家宮室五月

十月採暴乾

丁公 味甘王金瘡癰延年一名丁父生石間蔓延不上葉

細大枝赤莖母大如碩黃有汁七月七日採

城裏赤 味辛平瘰癧人漏血白次陰蝕濕痺邪氣補中益

氣生平陽

城裏肉 味鹹溫主心腹痛止洩便膿血

味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青

味酸無毒主諸惡氣

味苦無毒主欬嗽

味苦無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

雄黃 主明目辟兵不祥益氣力狀如蠟螭

天南星 味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉二月採

石菖蒲 味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足

石 主石瘡小便不利生石中

行夜 瘰癧痛寒熱利血一名負盤

味甘無毒主燭睛明目生江夏

味甘無毒主痺止血

赤七月七日採

八月採

蛇 療瘰癧內漏一名蛇短主色而文

主婦人寒熱

搜雞 味甘無毒療瘰

益母 療閉一名無舌

地防 令人不飢不渴生黃陵如澤各土中

黃 味苦寒無毒生地上赤頭長尺有角重居七月七日採

唐本述二十

重 味甘平無毒主明目止淚療瘰癧去臭惡氣傷寒頭痛

上氣腰痛一名蔥草生下濕地二月採生乾者良

姑活 味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐

老一名冬葵子生河東

別 味甘微溫無毒主風寒濕痺身重四肢酸寒邪麻節

痛一名別枝一名別騎一名龍驤生藍田川谷二月八月採

世 味甘溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脈

滿盛生田野五月八月採

石下長 味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老

魅注易主走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷

醫古 味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採

練石草 味苦寒無毒主五癆破石淋膀胱中結氣利水道小

便生南陽川澤

大 味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛癰疽皮中有邪熱手足

寒無色生益州山谷

鹽 味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸溺身熱可作

鹽花生淮南平澤七月採

五色 味甘微溫主欬逆五藏邪氣調中益氣明目殺蟲青

符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴

郡山谷

山 味甘苦寒無毒主溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮南

味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目
久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生青蒿平澤二月八月採
單治味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名
賊生丹水

味酸無毒主下氣止煩渴可作浴湯藥色黃生蜀郡立
秋取

原草味苦微寒無毒主骨脊下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服
輕身益氣耐老生澤中川澤五月採

赤蘇味苦寒有毒主疥瘍惡敗瘡除二蟲邪氣生益州川谷
二月八月採

准水味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰
蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤

占斯味苦溫無毒主邪氣濕痺寒熱疽瘡除水堅積血癥月
閉無子小兒疳不能行諸惡瘡癰腫止腹瀉令人子有子一

名灰皮生太山山谷採無時

味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好色
美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾

有大毒入五藏爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名鴆日
生南海

千金翼方卷第五

婦人

論曰婦人之病難療比之丈夫十倍費功所以古人別立婦人方焉是以今方具在四卷一卷泛療婦人三卷專論產後好學者宜細意用心觀之始得觀其深趣耳

婦人求子第一 論一首 方七首

論曰夫人求子者服藥須有次第不得不知其次第者男服七子散女服溫胞湯及坐藥并服紫石門冬丸則無不得效矣不知此者得力鮮焉

七子散主丈夫風虛目閉精氣衰少無子補不足方

牡荊子 五味子 菟絲子 車前子

新實子 石斛 薯蕷 乾地黄

杜仲 杜皮 鹿茸 遠志 各貳兩 附子 炮去皮

蛇牀子 苴蕸 山茱萸 天雄 炮去皮

人參 茯苓 黃耆 牛膝 各伍分

桂心 續斷 巴戟天 肉苁蓉 各分 鍾乳 貳兩

右貳拾肆味搗篩為散酒服方寸匕日二不知加至二匕

以知為度思生令醋滑猪雞魚鯨油麋不能酒者蜜和丸

服亦佳一方加覆盆子二兩行房法一依素女經女人月

信斷一日為男二日為女三日為男四日為女以外無子

每日午時夜半後行事生子吉餘時生子不吉

主婦人斷緒二三十年及生來無子并數數失子服

此皆有子長命無病方

朴消 桃仁 生皮 茯苓 牡丹皮

大黃 各參 人參 桂心 芍藥 厚朴 炙

細辛 牛膝 當歸 橘皮 附子 炮去皮

蘇蟲 炙 水蛭 各壹兩

右壹拾陸味咬咀以酒五升水六升合漬一宿煮取三升

分肆服日三夜一服每服相去時辰少時更服如常覆被

少取汗汗不出冬月著火籠必下積血及冷赤腹如赤小

豆汁本為婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或

月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不

堪更服亦一日二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿

一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大

好一日後仍著導藥千金翼方有結梗

坐導藥方

皂莢 去皮 炙 五味子 乾薑 細辛 各壹兩

葶藶子 苦瓠 格山 柴更 礬石 燐半 大黃

戎鹽 蜀椒 附子 當歸 各貳兩

右壹拾壹味搗篩內輕絹袋子中如指許大長三寸盛藥

今藏內子門中坐臥任意勿行走急小便時即去之仍易

新者一日當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未

見病出亦可至十日安之千金翼方有結梗

延服紫石門冬丸

紫石門冬丸

紫石 炙 烏頭 炮 天門冬 各壹兩

烏賊魚骨 牛膝 人參 牡丹皮

桑寄生 乾薑 細辛 厚朴 炙 食茱萸

續斷 各五 署預 檀兩 柏子仁 壹兩 牡荊子 壹兩

當歸 芍藥 桂心 辛夷心 卷柏

右貳拾陸味搗篩為末鍊蜜和丸如梧桐子酒服十九日

二種加至參拾九慎如藥法

白微丸 主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療方

白微 車前子 各三分 澤蘭 太一餘糧

赤石脂 細辛 人參 桃仁 各一分 覆盆子

麥門冬 白芷 各一分 紫石英 石膏 各一分 薑本

菴蘭子 蒼柏 各一分 蒲黃 桂心 各一分 當歸

芎藭 蛇床子 各一分 乾薑 蜀椒 各一分

乾地黃 各一分 茯苓 遠志 各一分 白龍骨 各一分

橘皮 半兩 桑令 遠志 各一分 白龍骨 各一分

右取拾捌味為末鍊蜜和丸如梧桐子酒服拾伍丸

日再增至肆拾九以知為度亦可增至伍拾九慎勿雜藥

生之醋消驢馬等肉覺有娠則止勿妄傳也

慶雲散 主丈夫陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子 五味子 各一分 菟絲子 各一分 白朮 各一分 色赤

石斛 各三分 天雄 各一分 天門冬 各一分 紫石英 各一分

桑寄生 各一分 桑寄生 各一分 桑寄生 各一分

右取味搗篩為散先食酒服方寸匕日三服不耐冷者去

寄生加細辛肆兩陽氣不少而無子者去石斛加續斷拾

伍枚良

王婦人下焦二十六疾不孕絕產方

菟絲子 各一分 桑寄生 各一分 桑寄生 各一分

右取味搗篩為末鍊蜜和丸如大豆先食酒服方寸匕日三

服不效和增之若腹中無堅積者去桑寄生加通草壹兩惡耳

者加藥丸以苦酒搜散乃內少蜜和為丸

婦人續聚第二方 方一十三首

千金翼方 卷五 婦人一

壯蒙丸 主男子血癰女子血癰心腹堅積聚乳餘疾小腹堅

滿貫臍痛熱中腰背痛小便不利大便難不下食有伏蟲臍

脹腫久寒熱胃管有嘔氣方

牡蒙 烏喙 各一分 石骨 各一分 藜蘆 各三分

巴豆 各一分 乾薑 各一分 桂心 各一分 生薑 各一分

右取味搗篩為末別搗巴豆如膏合諸藥令調和搗至熟

以飲服如小豆貳丸日三服如不得入少蜜

烏頭丸 主心腹積聚臍中氣悶脹滿血癰內傷瘰癧血產乳癰

病及諸不足方

烏頭 各一分 巴豆 各一分 石骨 各一分 藜蘆 各三分

太黃 各一分 戎鹽 各一分 苦參 各一分 黃芩 各一分

生薑 各一分 桂心 各一分 生薑 各一分

右取拾壹味搗篩為末內蜜膏牛膽汁拌和搗三千杵丸

如梧桐子大宿不食酒服五丸臥須臾當下黃者心腹積

也青如粥汁者臍上邪氣也下崩血如腐肉者內傷也赤

如血者乳餘疾也如蟲刺者蟲也下已必渴渴飲粥飢食

蘇麻三日後當溫食食必肥濃四十日平復

治婦人瘰癧結脅肋下疾

乾薑 各一分 桑寄生 各一分 桑寄生 各一分

桃仁 各一分 桑寄生 各一分 桑寄生 各一分

杏仁 各一分 桑寄生 各一分 桑寄生 各一分

右取拾陸味搗篩為末鍊蜜和丸如梧桐子夫食以飲服

參丸可增至拾九丸金剛大黃明各

生肌黃丸 主婦人臍下結堅大如杯升月經不通發熱往來

下痢膿血此為氣瘕也若生肉瘕不可瘥未生瘕者可瘥方

千金翼方 卷五 婦人一

能食飲并諸虛不足少氣心悸不安方

黃耆 半夏各半 大棗各半 當歸 乾地黃

桂心 人參 茯苓 遠志各半 芍藥

澤瀉 五味子 麥門冬各半 白朮

甘草炙 乾薑各半

右壹拾陸味以水壹斗半煮取貳升壹服五合日三服

婦人乳疾第二方方六首

治乳敗方

當歸 芍藥 黃耆 雞骨

附子炮 枳實各半 桂心各半 人參 薏苡仁各半

右壹拾味搗篩為散酒服方寸匕日三服

治乳癰始作方

大黃 棟實 芍藥 馬蹄炙

右肆味等分搗篩為散酒服方寸匕取汗出差

右壹拾貳味搗篩為散酒服方寸匕日三夜一服加至一

生魚鱖魚 伏龍肝

大黃 莽草各半

右肆味別搗魚如膏下篩三物更搗令調以生地黃汁和

治乳癰初有異則行此湯并將圓補之即愈方

如粥傳腫上日五六夜二三

治乳癰初有異則行此湯并將圓補之即愈方

如粥傳腫上日五六夜二三

治乳癰初有異則行此湯并將圓補之即愈方

如粥傳腫上日五六夜二三

如粥傳腫上日五六夜二三

如粥傳腫上日五六夜二三

麥門冬焙 黃耆 芍藥

茯苓 甘草炙 通草各半 桑寄生 防風

人參各半 糖楓各半 大棗各半

右壹拾貳味以水壹斗半煮取貳升去滓內糖分肆服

次服天門冬圓

天門冬焙 通草 黃耆 防風

乾地黃 桑寄生 人參各半 羌活各半 大黃各半

白芷各半 升麻各半 澤瀉 茯苓 天雄炮 去皮

黃芩 枳實各半 五味子各半

右壹拾柒味搗篩為末鍊蜜和圓酒服貳拾圓日一加至

參拾圓

婦人雜病第四方方一十二首

治婦人斷產方

故繆子布壹尺燒一味末酒下終身不復懷孕也

治婦人無故衄血方

龍骨色兩

右壹味搗篩為散酒服方寸匕空服服日三久者貳拾圓

又方

鹿角屑 大豆黃卷 桂心各壹兩

右叁味搗篩為散空腹酒服方寸匕日三服

又方

紅故布為散酒服方寸匕日三服亦主遺尿

治婦人遺尿不知出時方

白薇 芍藥各壹兩半

右貳味搗篩為散酒服方寸匕日三服

又方

葵石 熱

牡蠣 熱

右貳味搗篩為散酒服方寸匕亦治丈夫

治姪娠得熱病五六日小便不利熱入五藏方

葵子 壹升

榆白皮 壹把切

右貳味水伍升煮五沸服一升日三服

又方

葵子

茯苓 各壹兩

右貳味搗篩為散水服方寸匕日三小便利則止

治婦人小便不通方

葵子 貳升

朴消 壹兩

右貳味以水五升煮取二升分再服

治婦人卒不得小便方

杏仁 柒枚熬令變色去皮尖

右壹味搗篩為散以水服之立下

又方

紫苑為末并花水服三指撮立通

治丈夫婦人轉胞不得小便八九日方

滑石 壹兩

寒水石 壹兩

葵子 壹升

右叁味以水一斗煮取五升服一升即利

婦人經服硫黃圓忽患頭痛項冷冷飲又心胃煩熱骨眼

背癢痛有時生瘡喉中乾燥四肢痛癢方

枯樓根

麥門冬 去心

龍膽 各壹兩

土瓜根 捌兩

大黃 貳兩

杏仁 貳兩 去尖

右陸味搗篩為末別搗杏仁如泥鍊蜜和圓如梧子大

飲下拾圓日三稍加至二十圓

婦人面藥第五

論一首 方三十九首

論曰面脂手膏衣香澤且仕人貴勝皆是要然今之醫門極為秘惜不許子弟洩漏一法至於父子之間亦不傳示然聖人立法欲使家家悉解人人自知豈使愚於天下令至道不行擁蔽聖人之意甚可怪也

面脂主面及髮髮黑好凡其面上之病悉皆主之方

丁香 拾分

零陵香

桃仁 去皮

土瓜根 白斂

白及

施子花

沈香

防風

當歸

辛夷

麝香 研

芎藭

商陸 各壹兩

白芷

葵藿

菟絲子

甘松香

藿香 各拾兩

蜀水花

青木香 各壹兩

茯苓 伍兩

木蘭皮

藁本

白蠟 蠶 各貳兩半

冬瓜仁 兩

鵝脂

羊髓 拾兩

羊腎脂 壹升

豬脂 貳升

清酒 伍升

生指肪脂 貳大升

右叁拾貳味切以上件酒按猪脂汁漬藥一宿於脂中以炭火煎三上三下白芷黃綿濾貯器中以塗面

面脂方

防風

芎藭

白芷

白蠟 蠶 各壹兩

葵藿

茯苓

白斂

細辛

土瓜根

枯樓根

桃仁 去皮

蜀水花

青木香

當歸

辛夷

鵝脂 壹升

羊腎脂 壹升

猪脂 貳升

鹿升

右壹拾貳味細切綿裹酒二升漬一日一夜內脂中急火煎之三上三下然後緩火一夜藥成去滓以寒水石粉半

兩內脂中以杵木昆熟攪任用之

又方

杏仁 貳升 去尖

白附子 叁兩

蜜 貳兩

白鮮皮 壹兩

生白羊髓 貳升半

真桑 貳兩

白鮮皮 壹兩

雞子白 叁枚

胡粉 貳兩

以皂莢湯洗之

下陰乾

石

右捌味以清酒貳升半先取杏仁盆中研之如膏又下雞子白研二百遍又下羊髓貳百遍諸藥內之研五百遍至千遍攪佳初研杏仁即少少下酒薄漸下使盡藥成以指捻看如脂即可用也草藥絹篩取最細如粉佳又方

當歸 芎藭 細辛 洛伍 蜀水花 密陀僧
商陸 辛夷 木蘭皮 枯樓 白殭蠶
藁本 桃花 香附子 杜蘅 麝香
零陵香 姜蕤 土瓜根 各一分
丁香 略半 白芷 各一分 白附子 玉屑 各五分
搗脂 在合 鹿髓 壹升 白蠟 肆兩 猪膏 貳兩 羊髓 壹升
右貳拾玖味細切醋浸密封一宿明曉以指膏則三上三下以白芷黃為藥成去滓攪數萬遍令色白便回風日良

面膏方
杜蘅 牡蠣 熱三云
細辛 白附子 白芷 當歸 木蘭皮
白朮 獨活 姜蕤 天雄 茯苓
玉屑 略壹 羌活 防己 商陸 梔子花
橘皮 略壹 白斂 人參 各壹 甘松香 青木香
藿香 零陵香 丁香 各壹 麝香 半兩 白大脂
白羯脂 半兩 牛髓 壹升 羊脂 叁具
右參拾貳味以水浸中醃等五日日別再易水又五日日別一易水又十日二日一易水凡二十日止以酒壹升按羊脂令消盡去脂乃細切香於釜中浸之密封一宿晚以諸脂等合煎三上三下以酒水氣盡為候即以綿布絞去滓研之千遍待凝乃止使白如雪每夜洗面書則洗却

更添新首一日以後色等花髮滋潤白銀七癰面膏主有黑點及瘡癩并皮膚皺癢方

防風 藁本 辛夷 芍藥 當歸
白芷 牛膝 商陸 細辛 密陀僧
芎藭 獨活 雞舌香 零陵香 姜蕤
木蘭皮 麝香 丁香 未穿真珠 各壹兩
麝仁 杏仁 各壹兩 牛髓 伍升 油 壹升
臘月脂 貳升 麝香 腦 各壹兩 羊脂 壹兩
右貳拾伍味先以水浸腦髓使白麝香以上咬咀如麥片乃於腦髓脂油內煎之三上三下即以綿裹搗去滓乃內麝香及真珠末研之千遍凝即塗面上甚妙珍癰癩云難治者以此方治之也

面藥方
香附子 諸藥 白芷 壹兩 零陵香 貳兩 茯苓 貳兩
蔓菁油 貳升 牛髓 壹升
白蠟 貳兩 麝香 半兩
右玖味切以油髓微火煎五物令色變去滓內麝香研千遍凝每澡豆洗面而塗之

朱砂研 雄黃研 水銀霜 略半 胡粉 貳兩 黃芩 屎 體
右伍味合和淨洗面夜塗之以壹兩藥和面脂令稠如泥先於夜欲卧時澡豆淨洗面并手乾拭以藥塗面厚薄如尋常塗面厚薄乃以指細細摩之令藥與肉相入乃卧一上經五日五夜勿洗面止就上作難即得要面不洗面至第六夜洗面塗一如前法滿三度洗更不塗也一如常洗面也其色光淨更未塗時百倍也

悅澤面方

雄黃

朱砂

白蠟

真珠

右辟味並粉末之以面脂和胡粉內藥和攪塗面作凝曉以醋漿水洗面訖乃塗之二十日後如凝脂五十歲人塗之面如弱冠夜常塗之勿絕

令面生光方

蜜陀僧研以乳煎之塗面即生光

令面白媚好方

白附子

白芷

杜若

赤石脂

白石脂

杏仁

桃花

瓜子

牛膝

雞矢白

姜蕤

遠志

右膏拾貳味各三分搗篩為末以人乳汁一升白蜜一升和勻服服米圓日三服

麝用塗面方

鹿角

芎藭

細辛

白斂

白木

白附子

天門冬

白芷

杏仁

牛乳

右膏拾味鹿角先以水漬之百日令乾總內乳中微火煎之令汁竭出角以白練袋盛之餘藥勿收至夜取牛乳石上摩鹿角塗面曉以清漿水洗之令老如少也

急面皮方

大猪蹄一具治如食法水二升清漿水一升不渝釜中煎成膠以洗面又和溲豆夜塗面曉以漿水洗令面皮

急矣

治婦人令好顏色方

女

鉉丹

右貳味搗碎酒服一升日再服男十日女二十日

知則止黑色皆從大便出色白如雪

又方

白瓜子

白楊皮

冬分

桃花

右參味搗篩為散以飲服方寸匕日三服三十日面白五十日手足白一云欲白加瓜子欲赤加桃花

令面手白淨溲豆方

白鮮皮

白蠟

白附子

鷹矢白

芎藭

白木

青木香

白芷

白檀香

麝香

丁香

甘松香

瓜子

臘

杏仁

桂心

白梅

冬瓜仁

雞子白

猪脂

右貳拾味先以猪脂和麝香令乾然後合諸藥搗篩為散又和白豆屑二升用洗手面十日內色白如雪二十日如凝脂

又方

麝香

貳分

猪脂

兩具

萊絲子

參兩

大豆黃卷

兩具

木蘭皮

參兩

冬葵子

兩具

首烏

參兩

姜蕤

兩具

右膏拾壹味以水浸猪脂三四度易水血色及浮脂盡乃搗諸味為散和令相得暴曬篩以洗手面而淨先潤而香

一方若無前件可得者直取首烏香一分土瓜根商陸青木香各一兩合搗為散洗手面大佳

溲豆方

細辛

半兩

白木

參分

商陸

兩具

冬瓜仁

半合

黃絲子

兩具

猪脂

兩具

藥本

防風

白芷

白附子

茯苓

杏仁去皮

桃仁去皮

豆末雞升

右壹拾玖味以藥將猪膽壹具令爛取汁和散

又方

丁香

沈香

青木香

桃花

鍾乳粉

真珠

玉屑

蜀水花

木瓜花

棗花

梨花

紅蓮花

李花

櫻桃花

白蜜葵

旋復花各肆兩

麝香壹錢

右壹拾玖味搗諸花別搗諸藥具珠玉屑別研成粉合和

大豆末合研之通密肝勿洩常用洗手面作攤一百日其面如玉先淨潤澤臭氣粉滓皆除咽吸臂膊皆用洗

治面疱瘡癰三十年以上并冷瘡癰癰令滅方

斑蝥去翅

巴豆去心

胡椒

胡粉

鵝脂

金泚沙

蜜陀僧

高良薑

海蛤

各壹兩

右捌味為粉以鵝脂和夜半塗曉以甘草湯洗之

治面好黧方

礬石燒

硫黃

白附子

各壹兩

右叁味細研以大醋一盞浸之一宿淨洗面塗之慎風

治面疱方

白附子

青木香

麝香

由跋

細辛

又方

木蘭皮

伍兩取厚者

梔子仁

陸兩

右貳味為散以蜜將服方寸匕日三服

治面疱甚如豆瘡搗之黃水出及黑色頭鬚不可去方

冬瓜子

柏子仁

茯苓

冬葵子

右肆味等分搗篩飲服方寸匕日三服

白

主面瘡

癰癰瘡方

附子拾伍枚

蜀椒一升

野葛一尺伍寸

右叁味切醋漬一宿猪膏一斤煎附子黃去滓塗之日三

好鼓鐵片

木蘭皮

甘草

右陸味搗篩為末鍊蜜和圓如梧桐子以飲服拾圓日三

服稍加至貳拾伍圓

又傳方

差黎子

梔子仁

鼓鑪

木蘭皮

右肆味為末以醋漿水和之如泥夜塗上日未出時以暖

水洗之亦滅癰痕

又方

鷓鴣矢

飛水銀霜方

水銀一斤

朴消

大醋

黃礬

錫一斤

玄精

鹽花

各壹斤

右柒味先鍊錫訖又溫水銀令熟乃投錫中又搗玄精黃

礬令細以絹篩之又搗錫令碎以鹽花并玄精等各和以

醋拌之令濕以鹽花壹斤釐底乃布藥令平以朴消蓋上

訖以盆蓋合以鹽灰為泥泥縫固際乾之微火三日武火

四日凡七日去火一日開之搗取極須勤心守勿令須臾

問懶慢大失矣

鍊粉方

胡粉二大升盆中盛水投粉於中熟攪以雞羽水上掃取以舊破雞子拾枚去黃瀉白於瓷碗中以粉置其上以瓷碗密蓋之伍升米下蒸之乃暴乾研用傳面百倍省面有光

滅癩方

衣魚二枚白石脂壹分鴈屎三分白附子一分白礬錢許右伍味為末臘月猪脂和傳慎生冷風且令肌膩

滅癩方

丹參

右貳味和煎傳之滅癩神妙

又方

以蜜塗之佳

又方

取禹餘糧半夏等分搗末以雞子黃和充以新布拭癩上令赤以塗之勿見風塗之二十日十年癩並滅

手膏方

桃仁 杏仁 荔枝核 橘仁 薑合 赤芍 荔枝 大棗 辛夷 當歸 牛腦

羊腦

白狗腦 狗腦 狗腦 狗腦

右壹拾壹味先以酒漬腦又別以酒陸升煮亦以以上藥令沸停冷乃和諸腦等然後碎辛夷二味以綿裹之去棗皮核合內酒中以瓷器貯之五日以後先淨乾取塗手甚光潤而忌近火炙手

治手足皴裂出血出疹癩方

取猪脂著熱酒中以洗之即瘥

治冬月冒涉凍凌面目手足麻痺及始發疼痛欲瘥方

取麥稷煮取濃汁熱漬手足兼洗之三五即度瘥

治手足皴凍欲脫方

右伍味以水肆升煎令濃塗洗之三數遍即瘥

治凍傷十指欲墮方

取馬矢叁升煮令麻沸漬冷易之半日愈

重衣香方

重衣香 重衣香 重衣香

重衣香 重衣香 重衣香

右陸味末前竹乾香中先取硬者熟煮難碎者各別搗或細切吹咀使如黍粟然後一一薄布於盤上自餘別搗亦別布於其上有須篩下者以紗不得太細別煎蜜就盤上以手搜搗令勻然後搗之燥濕必須調適不得過度太燥則難圓太濕則難燒燥則香氣不發燥則煙多煙多則惟有焦臭無復芬芳是故香復須細燥濕合度蜜與香相稱久又須微使香與綠煙而共盡

沈香 白檀香 各伍兩 丁香 甘松香

藿香 青木香 艾納香 雞舌香 雀腦香 酪薑

麝香 羊脂 白檀香 參兩 零陵香 拾兩

右壹拾貳味各搗令細黍粟狀等物令細末乃和令相得若置衣箱中必須綿裹之不得用紙秋冬猶著暑熱暑之時令香速浥凡諸草香不但須新及時乃佳若欲少作

浥衣香方

沈香 白檀香 各伍兩 丁香 甘松香

藿香 青木香 艾納香 雞舌香 雀腦香 酪薑

麝香 羊脂 白檀香 參兩 零陵香 拾兩

右壹拾貳味各搗令細黍粟狀等物令細末乃和令相得若置衣箱中必須綿裹之不得用紙秋冬猶著暑熱暑之時令香速浥凡諸草香不但須新及時乃佳若欲少作

浥衣香方

沈香 白檀香 各伍兩 丁香 甘松香

藿香 青木香 艾納香 雞舌香 雀腦香 酪薑

麝香 羊脂 白檀香 參兩 零陵香 拾兩

右壹拾貳味各搗令細黍粟狀等物令細末乃和令相得若置衣箱中必須綿裹之不得用紙秋冬猶著暑熱暑之時令香速浥凡諸草香不但須新及時乃佳若欲少作

浥衣香方

沈香 白檀香 各伍兩 丁香 甘松香

藿香 青木香 艾納香 雞舌香 雀腦香 酪薑

者準此為大率也

乾香方

丁香 壹兩 麝香

白檀

沈香 略半

零陵香 伍兩

甘松香 朱兩

麝香 細兩

右藥味先搗丁香令碎次搗甘松香合搗訖乃和麝香合和泥衣

五香圓

并湯主療一切腫下氣散毒心痛方

丁香

藿香

零陵香

青木香

甘松香 略參

桂心

白芷

當歸

香附子

檳榔 各壹兩

麝香 壹兩

右壹拾壹味搗篩為末鍊蜜和搗千杵圓如梧子大令咽

令津盡日三夜一日一夜用拾貳圓當即覺香五日身

香十日衣被香忌食五辛其湯法取檳榔以前隨多少皆

等分以水微微火上煮一炊久大沸定內麝香末壹銖勿

去滓澄清服壹升凡丁腫口中喉中脚底背甲下癰疽痔

漏皆服之其湯不瘥作圓含之數以湯洗之

十香圓

令身體百處皆香方

沈香

麝香

白檀香

青木香

零陵香

白芷

片松香

藿香

細辛

芫蕘

檳榔

豆蔻 略壹兩

香附子 半兩

丁香 參分

右壹拾肆味搗篩為末鍊蜜和綿裹如梧子大日夕含之咽津味盡即止忌五辛

香粉方

白附子

茯苓

白木

白芷

白欬

白檀 略壹兩

沈香

青木香

雞舌香

零陵香

丁香

麝香 略壹兩

麝香 壹分

粉英 陸升

千金翼方 卷五 婦人一

右壹拾肆味各細搗篩下以取色青黑者乃麝搗細下

貯粉囊中置大合子內以粉覆之密閉七日後取之粉香

至盛而色白如本欲為香粉者不問香之白黑悉以和粉

粉雖香而色至黑必須分別用之不可悉和之粉囊以熟

帛雙綯作之

令身香第七 方一十三首

香身方

甘草 略分

芫蕘 壹兩

白芷 參分

右叁味搗篩為散以飲服方寸匕日三服三十日口香四

十日身香

又方

瓜子

松根白皮

大棗 各壹兩

右叁味為散酒服方寸匕日二服百日衣被皆香

又方

瓜子

芫蕘

桑本

當歸

杜蘅

右柒味搗篩為散食後以飲服方寸匕日三服五日口香

十日身香

二十日肉香 二十日骨香 五十日遠聞香 六十

日透衣香 一方有白芷

又方

治諸身體臭方

竹葉 略兩

桃白皮 肆兩

右氣味以水壹石貳斗煮取五斗浴身即香也

又方

治諸腋臭方

伏龍肝 為末和作泥傅之瘡

又方

牛脂和胡粉參合煎令可圓塗之

又方

三年苦酒和石灰塗之

又方

赤銅屑以大醋和銅器中炒令極熱以布裹剪腋下冷則易之瘡

又方

青木香貳兩

附子

石灰各壹兩

礬石貳兩

米粉壹升

又方

右伍味搗篩為散如膏粉服良

又方

馬齒草壹束搗碎以蜜和作團紙裹之以泥紙上厚半寸暴乾以火燒熟破取更以少許蜜和仍令熱勿使冷也先以生布揩之然後藥夾腋下令極痛亦忍不能得然後以手巾勒兩臂著身即瘡

石灰散方

石灰壹升

青木香

楓香

薰陸香

陽起石各貳兩

摘皮貳兩

礬石肆兩

又方

右捌味並搗篩為散以綿作袋懸如肆指長四寸展使著藥先以布揩令瘡夾之也

又方

石灰伍合

馬齒草貳兩

礬石壹兩

甘草香壹兩

又方

右肆味合搗篩先以生布揩病上令黃汁出拭乾以散傳之滿三日瘡永除

又方

二月社日盜取社家麻績一團猥地摩腋下二七通擲著五道頭勿令人知永瘡人知即不效

生髮黑髮第八

方一十二

治髮薄不生方

先以醋泔清洗禿處以生布指令火熱臍下指并細研鐵生煎三遍塗之日三遍

生髮鬚骨方

附子

荆實貳兩

松葉

拍葉各壹兩

右伍味咀合盛置瓦瓶中陰乾百日出搗以馬鬚膏和

如薄髮塗頭後如澤法裏絮中無入中風二十日長

生髮膏令髮速長而黑傳藥時特忌風方

烏家

莽草

續斷

皂莢

澤蘭

白木

細辛

竹葉各壹兩

防風

辛夷各壹兩

拍葉細切

杏仁別勝

松葉各壹兩

猪脂各壹升

右壹拾肆味切先以三年大醋煮升漬令一宿肉藥脂中煎三三下膏成去滓塗髮及頂上並有

生髮膏主髮鬚落不生方

升麻

蒼尾各壹兩

白芷

防風各壹兩

蜈蚣肆枚

馬鬚脂

驢鬚脂

雄雞脂各壹兩

猪脂

狗脂各伍合

雄雞脂各壹兩

右拾壹味藥伍味脂取成煎者並切以醋漬一宿曉日煎之沸則停火冷更上一沸並有三三下去滓傳頭以膏澤用之三十日生矣

又方

羊矢灰壹兩取汁洗之三日一洗不過十洗即生矣

治髮落方

拍葉切壹升

附子貳兩

右貳味搗篩猪脂和作參松圓洗髮時即內壹圓泔中髮不落其藥以布裏密器貯勿令洩氣

長髮方

蔓刺子參升 大附子參枚

右貳味咬咀以酒壹斗貳升漬之盛瓷瓶中封頭二十日取雞肪煎以塗之澤以汁櫛髮十日長一尺勿過面塗

又方

麻子仁參升 秦椒參升

右貳味合以酒漬一宿以沐髮長矣

又方

麻子貳升 白桐葉壹把

右貳味以米泔汁煮去滓適寒溫沐二十日長矣

治髮落方

石灰參升水拌令濕炒令極焦停冷以絹袋貯之以酒參升漬之密封冬二七日春秋七日取酒溫服一合常令酒氣相接七日落止百日服之終身不落髮生也

又方

桑白皮壹石以水壹石煮二沸以沐髮三過即止

今白髮還黑方

龍腦白正 旋復花 秦椒各壹升 桂心壹尺

右時味搗篩為散以井花水服方寸匕日三服三十日還黑髮方至

又方

烏麻九蒸九暴搗末棗膏和圓丸服之

又方

八角肉子壹枚 大附子半升

右貳味於銅釜中煎取兩沸內好髮石大如棗子壹枚消盡內脂灰兩枚又煎得干之瀝至凝內竹筒中拔白髮以膏塗上即生黑髮

髮黃方

髮黃方

臘月猪膏和羊大灰塗頭等分傳之二日一為取黑止

又方 以醋煮大豆爛去豆煎冷稠塗髮

又方

熊脂塗髮梳之散頭牀底伏地一食頃即出形盡當黑用之不過一升

染髮方

石榴參顆皮桑亦得針沙如粟核許大醋陸升水參升和藥合煮得壹斗沸即熟灰汁洗乾染之

治頭髮早白

又主虛勞腦髓空竭胃氣不和諸藏虛絕血氣不足故令人髮早白少而美髮及憂愁早白遠視眩

疏風淚出手足煩熱恍惚忘誤連年下痢服之一年後大驗

瓜子壹升 白芷二尺 當歸 豆豉 甘草欲黃兩

右伍味搗篩為散食後服方寸匕日三酒漿湯飲任性服

之一方有於子貳兩

千金翼方卷第六

婦人二

產後心悶第一 方四首

治產後心悶眼不得開方

當產婦頭頂上取髮如指大令人用力挽之眼即開

單行治手角散治產後心悶是血氣上衝心方

於羊角 煮枝燒成灰

右壹味擣篩為散取東流水服方寸匕若不瘥須更更服

取瘥止

單行治羊角散治產後心悶方

於羊角 煮枝燒成灰

右壹味擣篩為散以溫酒服方寸匕若不瘥須更更服取

瘥止亦治產難

單行生赤小豆散主產後心悶方

赤小豆

右壹味擣篩為散以東流水服方寸匕不瘥須更更服即愈

產後虛煩第二 方二十三首

單行白湯治產後胃中煩熱逆氣方

薤白切 半夏湯洗人參 甘草炙 知母各兩

麥門冬拌心 石膏碎綿裹 桂枝各兩

右捌味咬咀以水壹斗參升煮取肆升分為五服日三夜

再然煮著加石膏知母各壹兩

竹根切壹斗伍升

右以水貳斗煮取柒升去滓內小麥壹升大棗貳拾枚復

煮麥熟又內甘草壹兩麥門冬壹升去心湯成去滓溫

服伍合不瘥更服取瘥若短氣亦服之極佳

人參當歸湯主產後煩悶不安方

人參 當歸 芍藥 麥門冬去心 茯苓壹升

乾地黄 桂心各兩 大棗壹拾枚 淡竹葉切參

右玖味咬咀以水壹斗貳升先煎竹葉及米取捌升去滓

內藥煮取參升適寒溫分參服若煩悶不安者當取貳壹

升以水參升煮取壹升盡服之甚良

單行知母主產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹 人參 茯苓 黃芩 甘草各壹兩

右伍味咬咀以水陸升煮取貳升分參服

單行知母主產後乍寒乍熱通身溫熱胃心煩悶方

知母參兩 黃芩 芍藥各兩 桂心 甘草各壹兩

右伍味咬咀以水伍升煮取貳升伍合分為參服一方不用

竹葉湯主產後心煩悶不解方

生淡竹葉切 麥門冬去心 小麥各壹升 大棗拾枚擘

茯苓 生薑洗切參兩 甘草綿裹

右柒味咬咀以水一斗先煮竹葉小麥取捌升內諸藥煮

取參升分為參服若心中虛悸者加人參貳兩若其人食

小無氣力者可更加白粳米伍合氣逆者加半夏貳兩

單行知母主產後虛煩頭痛短氣欲死心中悶亂不起方

生淡竹茹 麥門冬去心 小麥伍合 大棗拾枚擘

生薑洗切參兩 甘草壹兩

右陸味咬咀以水捌升煮竹茹小麥取壹升仍內諸藥更

煮取貳升分為貳服羸人分為三服若有人參內壹兩若

無人參內茯苓壹兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心

驚悸安定精神有即為良無自依本方服一劑不瘥更作

服之苦逆氣者加半夏貳兩洗去滑

單行白芍散 主產後煩悶不食方

白大骨燒之搗篩以水和服方寸匕

單行小豆散 治產後煩悶不能食虛滿方

小豆參桑枝燒作屑以冷水和頓服之

單行蒲黃散 治產後苦煩悶方

蒲黃

右壹味以東流水和服方寸匕極良

治產後虛熱往來心胃中煩滿胃即疼及頭痛壯熱時發甚又似微瘧方

蜀漆葉 黃芩 桂心

生地黃 壹斤 黃芩

蟬母各參兩 芍藥壹兩

右捌味以水壹斗先煮地黃取柒升去滓下諸藥煮

取貳升伍分參服湯治寒熱不損人

治產後虛熱頭痛方

白芍藥 乾地黃

牡蠣各伍兩 桂心參兩

右肆味以水伍升煮取叁升半分三服湯不損人無

毒亦治腹中急痛若通身發熱更加黃芩貳兩大熱即除

鹿角屑壹兩 主婦人產後血不盡去苦煩悶方

右貳味以水叁升先煮貳三沸去滓內鹿角屑攪令調頻

服須臾更下

陰脫第二 刀八首

女坐漬法主產後陰道不閉方

石灰 青升熱令乾燒草

右壹味以水貳斗按灰中適寒溫入汁中坐漬之須臾復

易如常法此是神秘方不傳已治人有驗

治婦人陰脫

當歸 黃芩 各壹兩 分兩 蟬母 半兩 牡蠣 半兩

右伍味以酒壹斗先煮酒服方寸匕日三服禁葷重良

治婦人陰脫

黃芩 地黃 各壹兩 芍藥 壹兩 牡蠣 壹兩

右伍味以酒壹斗先煮酒服方寸匕日三服禁葷重良

治婦人陰脫

黃芩 地黃 各壹兩 芍藥 壹兩 牡蠣 壹兩

右伍味以酒壹斗先煮酒服方寸匕日三服禁葷重良

治婦人陰脫

黃芩 地黃 各壹兩 芍藥 壹兩 牡蠣 壹兩

右伍味以酒壹斗先煮酒服方寸匕日三服禁葷重良

右伍味以酒壹斗先煮酒服方寸匕日三服禁葷重良

亦治脫肛

治婦人陰脫方

治婦人陰脫方

右壹味末之每日空腹酒和服方寸匕日三服

又方 取車脂傳之即愈

治婦人產後腹中風痛重洗方

當歸 獨活 各壹兩 白芷 地榆 各壹兩 枳實 石脂 各壹兩

右伍味以水壹斗伍升煮取壹斗貳升以洗冷之

惡露第四 刀一廿八首

治產後惡露不盡方

鐵秤雞雄令極赤投於酒壹斗中浸令無聲出雞頭服

之不盡更作

紫湯 治產後惡露未盡又兼有風身中急痛

取大豆壹升先取新布搭之令光生熟令豆不復聲緣斷以清酒壹升投豆中停三沸漉去滓每服壹升日三夜一服

乾地黃湯 治產後惡露不盡除諸疾補不足

乾地黃陰乾 芍藥 桂心 黃耆 當歸各參兩 細辛 人參 茯苓 防風 芍藥

甘草炙

右壹拾壹味咀以水壹斗煮取叁升分為三服日再夜一

桃仁湯 主產後往來寒熱惡血不盡方

桃仁海桐皮 吳茱萸黃芩 當歸 芍藥各參兩 杏仁去皮 柴胡去苗 百鍊蘇各捌兩

右捌味咀以四物以酒壹斗水貳升合煮取叁升絞去滓

適寒溫先食服一升日三服

厚朴湯 主產後腹中滿痛惡露不盡方

厚朴 乾薑 桂心各參兩 黃芩 芍藥 乾地黃 茯苓 太黃各參兩 桃仁去皮 蘇蘇各參兩

甘草炙 芒消壹兩 枳實參兩 白朮參兩

右壹拾肆味咀以水壹斗清酒叁升合煮取叁升絞去

滓下芒消令烊適寒溫服壹升日三服初服

澤蘭湯 主婦人產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛引腰

皆少氣力方 澤蘭 生地黃 當歸各參兩 生薑 芍藥各參兩 大棗參兩 甘草壹兩半

右柒味咀以水玖升煮取叁升分為叁服隨身欲死者服之亦瘥

甘草湯 治產後餘血不盡此按之胃手足冷有乾腹脹短氣

右伍味咀咀以東流水壹斗煮取叁升絞去滓內阿膠令烊分為三服一服入腹面即有顏色一日一夜盡此三服即下惡血將養如新產婦也

大黃湯 治產後惡露不盡

大黃 當歸 生薑 牡丹去心 芍藥 甘草炙 吳茱萸 壹升

右柒味咀咀以水壹斗煮取肆升分為肆服一日三服極

佳加人參貳兩名人參大黃湯

當歸湯 治產後血留下焦不去

當歸 桂心 甘草炙 芍藥 芍藥各參兩 乾地黃參兩

右陸味咀咀以水壹斗煮取伍升分為五服

柴胡湯 治產後往來寒熱惡露不盡

柴胡去苗 生薑 芍藥 桃仁去皮 當歸 芍藥 黃耆 吳茱萸黃芩 當歸

右柒味咀咀以酒壹斗水叁升合煮取叁升先食服壹升日

三服千金以水煮

大黃湯 主產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食上衝

心胃時時煩憤逆滿手足煩疼胃中結熱 大黃 黃芩 甘草炙 蒲黃半兩 大棗參兩

右伍味咀咀以水叁升煮取壹升清朝服至日中當利若下不止進冷粥半升即止若不下與少熱飲自下人羸者

半之肝金 治產後兒生處空留血不盡小腹絞痛

施子參拾枚以水壹斗。煮取陸升內當歸芍藥各參兩
蜜伍合生薑伍兩半脂壹兩於施子汁中煎取貳升分
爲三服

治產後血不流方

大黃 黃芩 當歸 芍藥 芒消

甘草壹兩 桃仁 杏仁 各壹兩

右剉味咬咀以水壹斗。煮取參升去滓內芒消令烱分爲
三服。下利利若不止作白粥飲一盃煖服去一炊久
乃再服

治產後二日或四五日腹中餘血未盡絞痛發熱
氣息不通

生地黃 生薑 太黃 細辛 甘草

桂心 黃芩 茯苓 芍藥 當歸

大黃

右壹拾壹味咬咀以水捌升。煮取貳升伍合分爲三服禁
生冷等良

治新產後有血腹中切痛

大黃 乾姜 乾地黃 乾薑 桂心

右伍味咬咀以水清酒各五升。煮取參升去滓溫服壹升
血當下。若不明日更服壹升滿三服病無不瘥

治產後血不去

麻子伍升。以酒壹斗漬一宿。明日去滓服壹升先食
服不瘥復服壹升不吐下不得與男子交通一月將養
如初產法

升麻湯

治產後惡物不盡或經一月半歲一歲
升麻參兩以酒伍升煮取貳升分再服當吐下惡物莫

治之極良

治產後子血不盡

大黃 芍藥 以苦酒貳升合。煮取壹升。適寒溫服之。即
血下甚良

心痛第五 方四首

治產後虛冷心痛方

羊肉 參 桂心 當歸 乾薑 甘草

右玖味咬咀以水壹斗。煮取參升。取汁伍升。去肉內藥。煮取貳
升。分爲參服。一方有桂枝參兩

治產後心痛此大寒冷所爲方

蜀椒 附子 當歸 半夏 桂心

甘草 茯苓 人參 芍藥 當歸

生薑汁

右壹拾味咬咀以水玖升。煮取參升。然後內藥。煮取貳升
半。去滓內薑汁及蜜。復煎取壹升。半。一服。伍合。漸加至陸
合。盡勿喫冷食佳

治產後心痛方

乾地黃 當歸 獨活 芍藥 細辛

右壹拾味咬咀以水玖升。煮取參升。分二服。當歸 芍藥 細辛

治產後心痛此大寒冷所爲方

芍藥 桂心 當歸 半夏 茯苓 芍藥

蜀椒 附子 生薑汁

右捌味咬咀以水柒升。煮取貳升。去滓內薑汁及蜜。復煎
取貳升。伍合。壹服。五合。漸加至陸合。其服藥毋相去一炊

久再服忌食

腹痛第六 方一十六首

乾地黃湯 主產後兩脅滿痛兼除百病

乾地黃 芍藥 生薑 當歸 蒲黃 各參兩

桂心 陸兩 大棗 十枚 甘草 四兩

右捌味咬咀以水壹斗煮取貳升半分叁服

芍藥湯 主產後腹痛

芍藥 四兩 茯苓 參兩 人參 乾地黃 甘草 各貳兩

右伍味咬咀以清酒兼水各陸升煮取叁升分服日二

猪腎湯 治產後腰痛

猪腎 宣枚 茱萸 黃耆 當歸 芍藥

人參 茯苓 乾地黃 各貳兩 生薑 七

厚朴 炙 甘草 各貳兩 桂心 肆兩 半夏 伍兩 洗

右壹拾叁味咬咀以水貳斗煮猪腎八熟取壹斗吹去肥

膩又以清酒貳升煮取叁升分爲肆服日三夜一服

又方 羊肉 精 葱白 壹斤 乾薑 當歸 桂心 各參兩

芍藥 芫薺 乾地黃 甘草 各貳兩

右玖味咬咀先以水貳斗煮肉取壹斗去肉內藥煎取三

升分爲肆服一日令盡

赤白帶下湯 主婦人先有寒今曾滿痛或心腹刺痛或嘔吐或

食少或腫生後益劇或寒或下更劇氣急綿綿欲絕皆主之

芍藥 更兩 防風 桔梗 乾薑 乾地黃

當歸 細辛 甘草 各半兩

右捌味咬咀以水肆升煮取壹升伍合分爲三服

蔥白 當歸 人參 半夏 洗 細辛 洗

天門冬 洗 芍藥 乾薑 甘草 洗 生地黃 取汁

吳茱萸 洗

右壹拾壹味咬咀以水柒升煮取貳升壹服壹升日夜服

之今盡

白帶湯 主產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若中

風之氣力

羊肉 參 附子 當歸 黃芩 各壹兩 芍藥 各壹兩

防風 洗 人參 上薑 洗 芍藥 甘草 洗

右捌味咬咀以水貳斗煮取壹斗出肉內諸藥煎取叁

升分爲三服

補氣湯 主產後餘瘀胃中少氣腹痛頭眩餘血未盡除腹中

脹滿欲絕

蒲黃 生薑 生地黃 各伍兩 芒消 貳兩

桃仁 洗 桂心 各壹兩 大棗 洗

右捌味咬咀以水玖升煮取貳升伍合去滓內芒消分爲

三服良驗

敗毒湯 主產後疾痛引腰腹如錐刀刺方

右壹味切以水肆升酒貳升微火煎取貳升適寒溫服七

合日三食前服之大良

當歸湯 主產後腹痛

芍藥 內兩 女萎 仙分 黃芩 前胡 桃仁 洗

桂心 各壹兩 芍藥 大黃 洗 蒲黃 洗 生地黃 洗

右壹拾貳味咬咀以水壹升酒叁升合煮取叁升分爲肆

服日三夜一服千金方黃芩

主產後腹痛引腰脊拘急方

獨活

當歸

芍藥

生薑

桂心各二兩

大棗桴枲甘草炙

右柒味咬咀以水捌升煮取叁升分叁服相去如十里久

連之

治產後心腹痛方

芍藥分黃芩叁兩

白芷

桂心

生薑

甘草各二兩

大棗拾枚

右柒味咬咀以酒并水各伍升合煮取叁升空腹服壹升

日叁服千金方人參當歸芍藥

治產後疾痛方

桃仁半升去

芍藥叁兩

當歸

乾漆熬

桂心

甘草各二兩

右柒味咬咀以水捌升煮取叁升分爲叁服服別相去一

炊久再服

治產後腹內疾痛方

豆豉壹升

以酒叁升漬壹宿煎取半升頓服之亦可

再服之

主產後疾痛乃卒心腹痛方

桂心

叁兩切以酒叁升煮取貳升分爲叁服

主產後腹中其痛方

生牛膝根伍兩切

以酒伍升煮取貳升分爲貳服若用

乾牛膝須以酒漬之然後可煮

虛損第七

方一十七首

主產後虛多當補益方

千金翼方 卷六 婦人二

羊肉叁斤黃芩

乾地黄

麥門冬拾叁兩

大棗叁拾枚

甘草炙

當歸

芍藥

桂心

右壹拾味咬咀以水貳斗煮肉取壹斗去肉內藥煎取叁

升分爲叁服大良

主產後虛弱勞損補之方

鹿肉肆斤

乾地黄

扶苓

黃芩

麥門冬法甘草

芍藥

當歸

人參各叁兩

右壹拾叁味咬咀以水叁斗煮肉取貳斗去肉內藥煎取

叁升分爲肆服日三夜一服

治產後虛乏五勞七傷虛損不足藏腑冷熱不調方

麋骨煨具遠志

黃芩

芍藥

橘皮

茯苓

厚朴炙

芍藥

當歸

乾薑

防風

獨活各二兩

生薑切

桂心各肆

右壹拾伍味咬咀以水叁斗煮薑骨取壹斗去滓內藥煮

取叁升分爲肆服

主產後及傷身太虛上氣腹痛兼微風方

羊肉用鹽炙

麥門冬去心

生地黄

伍兩

大棗桴枲

黃芩

人參

獨活

桂心

茯苓

甘草炙

芍藥

當歸

右壹拾味咬咀以水貳斗煮肉取壹斗去肉內藥煎取叁

升半分爲肆服日三夜一服千金方乾薑

主產後三日補中理氣強氣力消化血方

羊肉壹斤

芍藥

生地黄

當歸

芍藥

桂心

甘草炙

當歸

右捌味咬咀以水貳斗煮肉取壹斗去肉內藥煎取叁升分爲肆服日三夜一服

羊肉桂仲湯治產後腰痛欬嗽方

羊肉肆斤 杜仲炙

紫苑

桂心

當歸

白朮

細辛

五味子

款冬花

厚朴炙

附子炮去單韓

人參

芍藥

黃耆

甘草

生薑

大棗

乾薑

右壹拾捌味咬咀以水貳斗煮肉取壹斗去肉內藥煎取叁升分爲三服

當歸建中湯治產後虛羸不足腹中疼痛不止吸吸少氣或若小腹拘急攀痛引腰背不能飲食產後一月日得服四五劑爲善令人強壯內補方

當歸

桂心

甘草

芍藥

生薑

大棗

乾薑

右陸味咬咀以水壹斗煮取叁升分爲叁服一日合盡苦

大虛內飽

陸兩

湯成內之於火上煖令飽糖消若無

生薑則以乾薑叁兩代之若其人去血過多崩傷內衄不止加地黃陸兩阿膠貳兩合捌種作湯成去滓內阿膠若無當歸以芍藥代之

內補

土婦人產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中疼痛

芍藥

乾地黃

各肆兩

芍藥

桂心

大棗

乾薑

右柒味咬咀以水壹斗煮取叁升分爲叁服若不差更作至叁劑若有寒苦微下加附子叁兩炮主婦人虛羸

少氣七傷損絕腹中拘急痛崩傷虛竭面目無色及唾血甚良

甚良

大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急或溺血小腹苦痛或從高墜下犯內及金瘡血多內傷男子亦宜服之

當歸

乾薑

續斷

桂心

乾地黃

生薑

芍藥

麥門冬

白芷

甘草

大棗

右壹拾貳味咬咀以酒壹斗漬藥一宿明旦以水捌升合

煮取伍升去滓分溫伍服日三夜二服有黃耆人參兩爲佳

當歸建中湯主婦人產後腹中拘急及虛滿少氣產後諸虛不足寬中補寒

吳茱萸

乾薑

當歸

白芷

人參

甘草

麥門冬

半夏

芍藥

細辛

右壹拾壹味咬咀以水壹斗煮取三升去滓內地黃汁更

上火合煎三兩沸溫服壹升日三服若無當歸以芍藥肆

兩代之

大補湯治產後虛不足少氣乏力腹中拘急痛及諸疾痛內崩傷絕虛竭裏急腰及小腹痛

當歸

乾地黃

半夏

桂心

吳茱萸

人參

麥門冬

芍藥

乾薑

白芷

右壹拾壹味咬咀以水壹斗煮取三升分三服

當歸

芍藥

人參

桂心

生薑

甘草

麥門冬

半夏

芍藥

乾地黃

右捌味咬咀以水壹斗煮取三升分爲三服

當歸

芍藥

人參

桂心

生薑

甘草

麥門冬

半夏

芍藥

乾地黃

右捌味咬咀以水壹斗煮取三升分爲三服

當歸

芍藥

人參

桂心

生薑

甘草

麥門冬

半夏

芍藥

乾地黃

當歸湯主產後腹中虛極水道閉絕逆脹咽喉短氣方

鮑魚精片麻子仁 細辛 茯苓 生薑切

五味子 各壹兩 地黃 伍兩

右柒味咬咀以水壹斗煮鮑魚如食法取汁柒升內藥煎取叁升分爲叁服大有神驗

厚朴湯主產後四日之中血氣口乾噓吸方

厚朴炙 枳實炙 生薑兩 芍藥 五味子 茯苓 前胡兩 人參半兩 大棗貳拾枚

右玖味咬咀以水陸升煮取貳升伍合分爲叁服適寒溫服禁冷物

生地黃湯主產後虛損少氣方

生地黃 人參 知母 桂心 厚朴炙

甘草兩 赤小豆升

右柒味咬咀以水貳斗伍升煮地黃取壹斗去滓內藥煎取叁升分爲叁服

氣血湯主婦人育脈氣積勞藏氣不足胃中煩燥關元以下如懷五千錢狀方

厚朴炙 當歸 細辛 芍藥 桔梗

石膏碎 桂心兩 大黃伍兩 乾地黃兩 乾薑

澤瀉 黃芩 甘草各伍兩

右壹拾叁味咬咀以水壹斗煮取叁升分溫叁服服叁劑

治產後虛氣方

杏仁去皮 蘇葉炙 半夏洗 生薑切

桂心兩 人參 橘皮 麥門冬洗 白朮各壹兩

右玖味咬咀以水玖升煮取貳升伍合分叁服

千金翼方卷第六

千金翼方卷第七

婦人三

虛之第一

和子人圓主婦人五勞七傷羸弱瘦削面無顏色飲食減少貌失光澤及產後半身枯悍傷陰斷絕無子令人肥白能久服夫婦不相識神方

柏子人 白石英 鍾乳 乾薑 黃耆

澤蘭 薑本 燕美 芍藥 防風

蜀椒 人參 紫石英 石斛

赤石脂 乾地黃 芍藥 五味子 秦龜

肉苁蓉 厚朴 龍骨 防葵 細辛

獨活 杜仲 白芷 茯苓 桔梗

白朮 桂心 當歸 甘草 枳實

右參拾叁味搗篩為末練蜜和圓如梧子空肚煖酒服十

圓不知稍增至參拾圓以知為度禁食生魚肥猪肉生冷

尤龍腎虛寒者

小澤蘭圓治婦人產後虛損補益方

澤蘭 薑本 厚朴 細辛

人參 柏子人 白朮 蜀椒 石骨

白芷 乾薑 食茱萸 防風 石膏

桂心 當歸 芍藥 甘草 枳實

一方有芍藥壹兩

右壹拾捌味搗篩為末練蜜和圓梧子大溫酒服貳拾圓

漸加參拾圓日叁服忌食生魚肥猪肉

大五石澤蘭圓主婦人產後虛損寒中腹中雷鳴緩急風頭

痛寒熱月經不調繞臍側側痛或心下石堅常飲食手足

常冷多夢紛紜身體痠痛榮衛不和虛弱不能動搖方

澤蘭 石膏 乾薑 白石英 陽起石

芍藥 當歸 人參 石斛 烏頭

白朮 續斷 遠志 防風 紫石英

禹餘糧 厚朴 柏子人 乾地黃 五味子

細辛 蜀椒 龍骨 桂心

茯苓 薑本 山茱萸 白芷

澤蘭 燕美 鍾乳 黃耆 甘草

右參拾叁味搗篩為末練蜜和圓如梧子酒服貳拾圓

漸加至參拾圓

小五石澤蘭圓主婦人勞心過度飲食減少面失光色腹中

冷痛月候不調呼吸少氣無力補益溫中

澤蘭 薑本 柏子人 厚朴 白朮

芍藥 蜀椒 山茱萸 人參

紫石英 鍾乳 白石英 肉苁蓉 鑿石

龍骨 桂心 當歸 乾薑 陽起石

燕美 赤石脂 當歸 甘草

右貳拾叁味搗篩為末練蜜和圓如梧子酒服貳拾圓加

至參拾圓日叁服

大補益當歸圓治產後虛羸不足胃中少氣腹中拘急疼痛

或引腰痛或產後所下過多不止虛竭乏氣腹中痛晝夜

不得眠及崩中面目失色唇口乾燥亦主男子傷絕或從高

墮下內有所傷之處或損血吐下及金瘡等方

當歸 芍藥 續斷 乾薑

阿膠 甘草 附子 白芷

吳茱萸 白朮 乾地黃 桂心

赤芍藥

右壹拾叁味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓日

參夜壹漸加至伍拾圓若有真蒲黃可加壹升為善

白芷 續斷 乾薑 當歸 附子 桂心 壹兩

右壹拾味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓日四五

服無當歸用芎藭代之亦可加蒲黃壹兩為善無續斷用

大商根代之

田草圓 主婦人產後心虛不足虛悸少氣心神不安或若恍

恍惚不自覺方

甘草 參 人參 澤瀉 桂心 各壹 大棗 伍枚

遠志 去心 茯苓 麥門冬 法薑 蒲 乾薑 各貳

右壹拾味搗篩為末鍊蜜和圓如大旦許酒服貳拾圓日

四五服夜貳服不知稍增若無澤瀉用木代之若胃中冷

增乾薑

大遠志圓 主婦人產後心虛不足心下虛悸忘意不安時復

千金翼方 卷七 婦人三

夜不得眠虛煩少氣方

人參 茯苓 麥門冬 法薑 蒲 澤瀉 署預

右壹拾味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大空腹酒下

貳拾圓日參夜壹服不知稍增至參拾圓若有遠志得貳

兩內之為善氣絕內當歸獨活各參兩更善此方亦治男

子虛心悸不定至良

生地黃 治婦人產後虛羸短氣骨節逆滿風寒方

甘草 參 人參 麥門冬 法薑 蒲 桂心 紫苑 各貳

右玖味合搗篩以生地黃汁捌升淳清酒捌升合調銅器

中炭火上內糜用膠壹斤數攪之得壹升次內飴參升白

蜜參升於銅器中釜湯上煎令調藥成先食服如彈丸壹

枚日參不知稍加至貳圓

地黃羊脂圓 治產後諸病羸瘦欲令肥白食飲平調方

生地黃汁 鹽生薑汁 白蜜 各伍 羊脂 貳斤

右肆味先煎地黃汁令得伍升次內羊脂煎令減半內薑

汁復煎令減內蜜著銅器中重湯煎如飴狀取煎如雞子

生飲白草汁 治產後勞復及腎勞方

白草壹把

右壹味搗絞取汁頓服差勞復生蟲去浮取汁洗眼中蟲

出又屋漏水洗赤蟲出

鯉魚湯 主婦人體虛流汗不止或眠中盜汗方

盜汗第二 方四首

八二

鯉魚鱗片^升 葱白^升 枳殼^升 乾薑^升 桂心^兩

右五味先以水壹斗煮魚取六升去魚肉諸藥微火煮取

貳升分再服取微汗即愈

皮湯 治婦人汗血吐血尿血下血

竹皮^{參升} 乾地黃^兩 人參^{半兩} 芍藥^兩 當歸^兩

桔梗^兩 桂心^兩 芩藭^兩 甘草^兩

右五味咬咀以水柒升煮取叁升分叁服

桑葉湯 治婦人產後虛羸盜汗時瀉惡寒

吳茱萸^兩 桑葉^兩 右壹味以清酒叁升漬之半日所煮令蟻鼻沸減得貳升

分服壹升日再間日飲

豬膏 治婦人產後體虛寒熱自汗出

豬膏^斤 生薑汁^斤 白蜜^兩 清酒^合

右肆味合煎令調和五上五下膏成隨意以酒服差當用

炭火上煎

下乳第三方

鍾乳 治婦人乳無汁

鍾乳^斤 白石脂^斤 消石^兩 通草^兩 生桔梗^兩

右伍味咬咀以水伍升煮三上三下餘壹升去滓內消石

令烺絞服無多少若小兒不能乳大人哺之

通草 治婦人乳無汁

通草^兩 鍾乳^{壹兩} 黍米^握

右肆味以咀黍米宿漬指撻取汁叁升煮藥參沸去滓飲

之日叁服

鯉魚 治婦人下乳汁

鯉魚^斤 豬肪^{半斤} 漏蘆^兩 鍾乳^兩

右肆味咬咀藥切猪脂魚不須洗清酒壹斗貳升合煮魚

熟藥成去滓適寒溫分五服即乳下良飲其間相去須臾

一飲令藥力相及

又方 通草^兩 鍾乳^兩 桔梗實^兩 漏蘆^兩

右肆味咬咀以水壹斗煮取叁升去滓飲壹升日叁服

又方

通草^兩 鍾乳^兩

右貳味切以酒五升漬一宿明日煮沸去滓服壹升日叁

服夏冷服冬溫服之

又方

石膏肆兩碎以水貳升煮參沸稍稍服一日令盡

又方

桔梗實壹枚青色大者無大者用小者兩枚無青色者

黃色者亦好

又方

右一味熟搗以白酒壹斗煮取肆升去滓服壹升日叁服

又方

鼠箭^{伍兩}

又方

右一味切以水陸升煮取肆升壹服捌合日叁服亦可燒

灰水服方寸匕

又方

鼠肉^{五兩} 羊肉^兩 麝肉^兩

又方

右叁味作腫勿令疾者知之

又方

鮑魚肉^兩 麻子^兩 右貳味與鹽鼓葱作羹任意食之

又方

通草 鍾乳

右貳味等分搗篩作麴餅服方寸匕日三服百日後可兼養兩兒通草橫心白者是勿取羊桃根已黃者無益

又方

麥門冬法鍾乳 通草 理石

又方

漏蘆參分 鍾乳 枯樓根合伍分 蟾蜍參分

又方

右肆味搗篩先食糖水方寸匕日參服

又方

枯樓根參分 鍾乳 漏蘆 滑石 通草各貳

白頭翁壹分

又方

右陸味搗篩為散酒服方寸匕日再服

鍾乳

通草 路王 雲母貳兩 屋上敗草貳把燒

甘草壹兩

又方

右五味搗篩為散食後以溫酒蘆水服方寸匕日參服乳下為度

又方

麥門冬法鍾乳 通草 理石 乾地黄

土瓜根 蟾蜍壹分

右柒味搗篩為散食後酒服方寸匕日參服

中風第四方

又方

甘草 乾地黄 麥門冬法前胡 黃芩

麻黃去節 枯樓根各貳

芎藭壹兩 葛根半斤

杏仁五十枚法

右壹拾味咬咀以水壹斗酒五升合煮葛根取捌升去滓內諸藥煮取貳升分再服一劑不差更作之大良前胡

治產後中風身痺疼痛

羌活 防風 烏頭炮去 桂心 芍藥

乾地黄各參兩 防己 女萎 麻黃去節各

葛根半斤 生薑各伍兩 甘草貳兩

右壹拾貳味咬咀以水玖升清酒參升合煮取參升服五合日三夜壹服極佳

治產後中風時煩方

知母 石膏碎 芍藥 甘草各參兩 半夏壹兩

生薑切 防風 白朮各參兩 獨活肆兩 桂心肆兩

右壹拾味咬咀以水壹斗清酒五升合煮取參升分參服

治產後中風口噤不得言

獨活五兩 防風 秦艽 桂心 當歸

附子炮去 白朮 甘草各參兩 木防己兩

葛根 生薑各參兩

右壹拾壹味咬咀以水壹斗貳升煮取參升分參服

治產後中風發熱面正赤氣煩痛

淡竹葉 葛根各參兩 人參壹兩 防風貳兩 大附子壹枚炮

生薑五兩 大棗拾伍枚 桔梗 桂心 甘草各參兩

右壹拾味咬咀以水壹斗煮取貳升半分貳服溫覆使汗出頭項強用大附子煎藥湯去沫苦嘔者加半夏半升洗

治產後中風裏急短氣

防風 葛根 當歸 芍藥 人參

乾薑

甘草各兩獨活兩

右剉味咀咀以水玖升煮取參升分爲參服

治產後覺言鬼語由內虛未定外客風邪所干方

羊心貳

遠志去心芍藥 黃芩 牡蠣各兩

防風

甘草各兩乾地黃 人參各兩

右玖味咀咀以水壹斗煮羊心取五升去心內諸藥前取

參升分爲參服

鹿肉各斤

半夏各兩乾地黃 阿膠各兩 芍藥各兩

芍藥

獨活 生薑切 黃耆 黃芩

人參

甘草各兩桂心 秦芩五兩 茯苓各兩

右壹拾伍味咀咀以水貳斗煮肉得壹斗貳升去肉下藥

煎取參升內膠令烊分肆服日叁夜壹服

防風

獨活各兩 女萎 桂心各兩

茵芋壹兩

石斛各兩

右陸味咀咀以清酒貳斗漬參宿初服壹合稍加至叁肆

合日叁服

木防己半斤

茵芋五兩

右貳味切以苦酒玖升漬壹宿猪膏肆升煎三上三下膏

成炙手摩之千遍佳

獨活壹斤

桂心叁兩 秦芩伍兩

右壹味咀咀以酒壹斗伍升漬參日飲伍合稍加至壹升

不能飲隨性多少

心悸等五方

治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍惚惚言語錯謬心

虛所致方

人參

茯苓各兩 扶神各兩 大棗各兩 生薑各兩

芍藥

當歸 桂心 甘草各兩

右玖味咀咀以水壹斗煮取參升分服日叁

治產後忽苦心中衝悸不定志意不安言語錯謬恍惚

不自覺方

遠志去心 人參

麥門冬各兩 當歸 桂心

甘草各兩 茯苓各兩 芍藥各兩 生薑各兩 大棗各兩

右壹拾伍味咀咀以水壹斗煮取參升分參服日叁服

肆服產後得此是心虛所致無當歸用言窮若其人心骨

中逆氣則加半夏叁兩洗去滑

治產後暴苦心悸不定言語謬誤恍惚惚心中憤憤此是

心虛所致方

茯苓五兩 芍藥

桂心 當歸 甘草各兩

生薑陸兩 大棗叁兩 麥門冬各兩

右捌味咀咀以水壹斗煮取參升分參服無當歸用芍藥

代若苦心不定加人參遠志各貳兩若苦煩悶短氣加生

竹葉壹升先以水壹斗煮參升煮竹葉取壹斗內藥若有微

風加獨活叁兩麻黃貳兩桂心貳兩用水壹斗五升若頭

項苦急背脊中強者加獨活爲根麻黃桂心各叁兩生薑捌

兩以水壹斗五升煮取參升半分四服日叁夜壹服

治產後心衝恐悸不定恍惚惚不自知覺言謬錯誤虛煩

短氣志意不定此是心虛所致方

遠志去心 人參 茯苓 當歸 芍藥

甘草各兩 大棗各兩 麥門冬各兩 桂心

藍青熟 鬼臼附子 蜀椒附子 黃連五兩

龍骨 當歸附子 黃蘗 人參 茯苓附子

厚朴炙 阿膠炙 艾 甘草各

一方用赤石脂肆兩

右壹拾肆味搗篩為末 鍊蜜和九如梧子 生度以飲服

拾圓

赤石脂附子 治產後下痢

赤石脂附子 當歸 黃連 乾薑 秦皮

白朮 甘草附子 蜀椒附子 附子附子

右玖味搗末 鍊蜜和圓如梧子 大飲服貳拾圓 日參服

治產後下痢赤散方

赤石脂附子 桂心附子 代赭附子

右叁味搗篩為散 酒服方寸匕 日叁夜壹服 拾日當愈

治產後下痢黑散方

麻黃附子 貫眾 桂心附子 乾漆附子

細辛附子 甘草附子

右陸味搗篩為散 麥粥服伍指撮 日再 五日當愈

治產後下痢黃散方

黃連 大黃附子 黃芩 麻黃附子 乾地黃附子

右伍味搗篩為散 酒服方寸匕 日叁服 拾日愈

治妊婦方產後寒熱下痢方

黃蘗附子 黃連附子 梔子附子

右叁味以水五升 漬一宿 煮三沸 服壹升 壹日壹夜

令盡 溫者加橘皮壹把 生薑貳兩

治婦人痢欲痢輒先心痛 腹脹滿 日夜五六十行方

神麴附子 石榴皮附子 黃蘗附子 黃連附子

烏梅肉 艾葉附子 防己附子 附子附子 乾薑

阿膠附子

右壹拾味搗篩為末 鍊蜜和九如梧子 大飲服貳拾圓

日叁斷加至叁拾肆拾圓

淋渴第七方

治產後小便數

桑螵蛸附子 鹿茸附子 黃耆附子 生薑附子

人參 牡蠣附子 甘草附子

右柒味以水陸升 煮取貳升半 分叁服

治產後小便數兼渴

枯樓根 黃連 麥門冬附子 桑螵蛸附子

人參 生薑附子 甘草附子 大棗附子

右捌味以水柒升 煮取貳升半 分叁服

治產後小便數

雞臍附子 雞腸附子 厚朴附子 人參附子 生薑附子

麻黃附子 大棗附子 當歸 乾地黃附子 甘草附子

右壹拾味以水壹斗 煮雞臍雞腸臍 柒升去滓內

藥煎取叁升半 分叁服

治婦人結氣成淋 小便引痛 上至少腹 或時溺血 或如豆汁

或如膠 每發欲死 食不生肌 面目萎黃 師所不能療方

貝母附子 葵子附子 滑石附子 石膏附子

右肆味以水柒升 煮取貳升 去滓內猪肪 合重煎

三沸 適寒溫 分叁服 病不差 更合服

治產後卒淋血淋氣淋

石草附子 黃芩 通草附子 榆皮附子 大棗附子

葵子附子 生薑附子 白朮附子 甘草附子

右取味咬咀以水捌升煮取貳升半分參服。

葵根湯治產後淋瀝。

葵根切壹升一云車前子亂髮燒大黃

桂心滑石各壹兩通草三兩生薑切兩

右捌味咬咀以水柒升煮取貳升半分爲叁服千檢有冬

白茅根湯治產後淋瀝。

白茅根切壹升桃膠各壹兩甘草炙兩鯉魚齒各壹兩

生薑切兩人參地麥各壹兩瞿麥各壹兩茯苓各壹兩

右玖味咬咀以水一斗煮取貳升半分參服。

鼠婦散治產後小便不利。

鼠婦七枚熬黃酒服之。

滑石散治產後淋瀝。

滑石五兩通草車前子葵子略壹

右肆味擣篩爲散以醋漿水服方寸匕稍加至貳匕。

竹葉湯治產後虛弱少氣力。

竹葉人參茯苓各壹兩甘草炙兩大棗拾枚擘

麥門冬五兩去心小麥五兩生薑切半夏各壹兩

右玖味咬咀以水玖升煮竹葉小麥取柒升去滓內藥更

煮取貳升半服五合日叁夜壹服。

枳實湯治產後滿不止。

枳實切壹升人參麥門冬各壹兩大棗拾枚擘

土瓜根切壹升乾地黄甘草各壹兩

右柒味咬咀以水捌升煮取貳升半分參服。

千金翼方卷第八

婦人四

崩中第一方三十六首

治婦人五崩身體羸瘦發逆煩滿少氣心下痛面生瘡腰大痛不可俯仰陰中腫如有瘡之狀毛中癢時痛與子藏相通小便不利常頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急煩不得臥腹中急痛食不下吞酢噎苦腸鳴瀉下赤白黃黑汁大臭如膠活衣狀熱即下赤寒即下白多飲即下黑多食即下黃多藥即下青喜怒心中常恐一身不可動搖大惡風寒

龍甲散方

龍甲炙

乾薑各五分

雲母

代赭各壹

烏賊魚骨

龍骨

伏龍肝

白堊

蝦皮各生鯉魚頭

桂心

白朮各半

白蠟蠶半斤

右壹拾肆味搗篩為散以淳酒內少蜜服方寸匕日三夜貳服久病者十日差新病者五日差若頭風小腹痛急加芍

藥桂心各壹兩佳忘生冷猪雞魚肉

治婦人崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至於心兩脅腫脹令人倚坐氣息之少食不生肌膚腰背疼痛痛連兩脚不能久立但欲得卧神驗大慎火草散方

慎火草

白石脂

龍甲炙

黃連

細辛

石斛

芍藥

乾薑

芍藥

當歸

熟艾

牡蠣炙

禹餘糧各壹

桂心壹兩

薔薇根皮

乾地黄各肆

右壹拾陸味搗篩為散空腹酒服方寸匕日叁服稍增至

貳匕若寒多加附子及椒用椒當注去目閉口者熱多加知母黃芩加石斛兩倍白多加乾薑白石脂亦多

加桂心代赭各貳兩

治婦人崩中及漏一日夜數十起大命欲死多取諸根煎丸得入腹即法若諸根難悉得者第一取薔薇根令多多乃合之遇有酒以酒服無酒以飲服其種種根當得貳斛為佳

薔薇根方

薔薇根

附根

艾葉

懸鉤根各壹兩

右肆味皆剉入豆豉中以水淹使上餘肆伍寸水煮使參分壹壹去滓取大釜煎黃如初法都畢會汁煎如飴可為丸如梧桐子大服拾九日叁服

治婦人崩中去赤白或如豆汁伏龍肝湯方

伏龍肝如雞卵

赤石脂

桂心

艾

甘草鰕卵生地黄切昇

右柒味咬咀以水壹斗煮取叁升分肆服日叁夜壹服

治婦人崩中血出不息逆氣虛煩數艾湯方

熟艾壹

蟹爪壹

淡竹茹壹

伏龍肝半

蒲黃炙

當歸壹

乾地黄

芍藥

桂心

阿膠

右壹拾貳味咬咀以水壹斗煮取叁升去滓內藥煮取肆升內膠令烱盡壹服壹升日叁服人以意消

息之可減伍陸合

治婦人崩中漏血不絕地榆湯方

地榆根

柏葉各捌

蟹爪

竹茹各壹

漏蘆叁兩

茯苓壹

蒲黃合

伏龍肝半

乾薑

芍藥

當歸

桂心

甘草鰕卵

右壹拾柒味以水壹斗伍升煮取汁伍升分再服相去一炊頃

治婦人產後崩中去血不止更宜心胃生瘡煩熱甘草若藥湯方

甘草炙 芍藥 當歸 人參 白朮 略壹

右柒味以水肆斗煮取汁伍升分再服相去一炊頃

治婦人崩中下血瘕瘕湯方

橡柳葉 麥門冬 乾薑 芍藥 甘草 略壹

右伍味以水壹斗煮取汁伍升分再服相去一炊頃

治婦人暴崩中去血不止薊根酒方

大小薊根 略壹

右二味以酒壹斗漬五宿服之隨意多少

治婦人崩中赤白不絕困為禹餘糧圓方

禹餘糧 烏賊魚骨 參兩 白馬蹄 略壹

右伍味搗篩錄蜜和九如梧子酒服貳拾九日貳服不知

稍加至參拾九

治婦人積冷崩中去血不止腰背痛四肢沈重虛極太牛角

中人散方

牛角中人 乾薑 防風 乾地黃 桑耳

蒲黃 乾薑 赤石脂 禹餘糧 續斷

附子 炮去 白朮 龍骨 礬石 當歸 略壹

右壹拾伍味搗篩為散酒服方寸七日參服不知漸加之

治婦人崩中下血虛羸少力調中補虛止血方

千金翼方 卷八 婦人四

澤蘭 熟艾 蜀椒 祛風 細辛 乾薑 防風 略壹 乾地黃

壯陽 兩半 桂子仁 厚朴 各壹兩 當歸

右壹拾柒味搗篩為末饒蜜和九如梧子空腹酒服拾九

日參服漸加至貳拾九神效

治婦人崩中下血切痛不止方

桑耳 牡蠣 牡蠣 略壹 龍骨 黃芩

右陸味搗篩為散酒服方寸七日參服稍增以知為度

治婦人傷中崩中絕陰使人怠惰不能動作背脊心腹四肢

滿而身寒熱甚弱血桑根煎方

桑根 白皮 細切壹斗麻子仁 冬升 淳清酒 冬升 煮得壹

斗絞去滓大棗百枚去皮核銑伍升阿膠伍兩白蜜參

升復煎得玖升下乾薑末厚朴貳寸長貳尺末蜀椒

末參味各壹升桂心長壹尺貳寸甘草捌兩鹽米末壹

升乾地黃肆兩芍藥陸兩玄參伍兩九如彈丸日參枚

又方

小薊根 葉 剉 祥母 略壹

右壹味以水伍斗合釜中煮爛熱去滓內銅器中煎餘肆

升分肆服壹日令盡

治婦人崩中方

白茅根 剉 小薊根 剉

右貳味切以水伍斗合煎取肆升分稍稍服之

治婦人崩中去血及產後餘病丹參酒方

丹參 地黃 忍冬 地榆 艾絛

右五味先煉熟春之以水漬三宿去滓煮取汁以桑葉煮
酢釀如酒法熟初服肆合稍增之神良

治婦人崩中赤白方

取符死竹蛭燒末飲服半方寸匕神良

治婦人崩中漏下方

取梧桐木長壹尺燒作灰搗篩為散以溫酒服方寸匕
日參服

治婦人白崩中方

芎藭 乾地黄 阿膠 赤石脂 桂心

小薊根 阿膠

右陸味咬咀以酒洗升水四升合煮取參升去滓內膠令
烱盡絞去滓分參服如雞子大雞卵

治婦人白崩中馬通汁方

白馬通汁 乾地黄 芎藭

阿膠 小薊根 白石脂 桂心 阿膠 伏龍肝 大薊根

右捌味咬咀以酒洗升合馬通汁煮取參升去滓內膠令
烱盡分參服

治婦人帶下五黃一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰月經
未斷為房室即漏血四曰經來重傷姓脈下血五曰產後

藏開經利五黃之病外實內虛小牛角膠散方

小牛角 龍骨 龍骨 禹餘糧 乾薑

當歸 阿膠 續斷 阿膠 續斷 阿膠

右柒味搗篩為散空腹酒服方寸匕日參服肝肺肺肺肺

治婦人緩下十二病絕產一曰白帶二曰赤帶三曰經水不
利四曰陰胎五曰子藏堅六曰子藏僻七曰陰陽虛痛八曰

腹強九曰腹寒十曰五藏閉十一曰五藏酸痛十二曰
夢與鬼為夫婦龍骨散方

龍骨 白僵蠶 烏賊魚骨

半夏 桂心 伏龍肝 乾薑 代赭石 黃蘗

石韋 滑石 阿膠

右壹拾壹味搗篩為散溫酒服方寸匕日三服多白加烏
賊魚骨白僵蠶各貳兩多赤加代赭石兩小腹寒加黃蘗

貳兩子藏堅加薑桂各貳兩各隨疾增之服藥二月有子
住藥藥太過多生兩子當審方取藥寒熱量女不可妄服

治產後下血不止方

葛蒲 阿膠

右壹味以清酒伍升煮取貳升分貳服

治婦人下血阿膠散方

阿膠 烏賊魚骨 芍藥 當歸 當歸 當歸

右肆味搗篩為散以蜜搜如麥飯先食以葱羹汁服方寸
匕日參夜壹服

治諸去血藥方

鹿茸 當歸 當歸 當歸 當歸 當歸

右肆味搗篩為散酒服方寸匕日參服不知稍增

治婦人漏血崩中鮑魚湯方

鮑魚 當歸 阿膠 阿膠 阿膠 阿膠

右肆味以酒參升水貳升合煮取貳升伍合去滓內膠烱
今壹壹服捌合日參服

治婦人參拾陸疾胞中病漏下日不絕白聖丸方

耶耶白聖 牡蠣 禹餘糧 白芷 烏賊魚骨 乾薑 龍骨 白石脂

桂心 瞿麥 大黃 石韋 白斂

細辛 芍藥 黃連 附子 鍾乳

茯苓 當歸 蜀椒 黃芩

甘草 按略

右貳拾參味膏節為末鍊蜜和丸如梧桐子大酒服伍九日或不知漸加至拾九

治婦人漏血不止太煎中方

龍骨 芎藭 附子 芍藥 禹餘糧

乾薑 赤石脂 當歸 桂心 甘草 分

右壹拾味膏節為散以溫酒服方寸匕日叁服稍加至貳

已白多更加赤石脂壹兩

治婦人漏血積月不止馬通湯方

赤馬通汁 楳子 乾薑 生艾 當歸

阿膠 乾薑 生艾 書墨 煇輝

右陸味以咀以水捌升清酒貳升合煮取叁升去滓內馬

通汁及膠微火煎取貳升適寒溫分再服相去壹分頓飲之

治婦人白漏不絕馬蹄湯方

白馬蹄 赤石脂 禹餘糧

烏賊魚骨 龍骨 牡蠣 乾地黃

當歸 附子 白蠟 甘草 分

右壹拾壹味以咀以水壹斗陸升煮取叁升半分再服日

叁夜壹服

治婦人漏血不止方

乾地黃 太黃 阿膠 人參

當歸 甘草 按略

右柒味以咀以酒壹斗水伍升合煮取陸升去滓內膠烱

今盡壹服壹升日叁夜壹服

治婦人白漏不絕馬蹄丸方

白馬蹄 烏賊魚骨 白蠟

赤石脂 禹餘糧 龍骨 分

右陸味膏節為末鍊蜜和丸如梧子酒服拾九不為漸加

至貳拾九

治婦人漏下慎火草散方

慎火草 當歸 鹿茸 鹿角

右伍味膏節為散先食酒服方寸匕日叁服

治婦人漏下不止蒲黃散方

蒲黃 鹿茸 當歸 分

右叁味膏節為散酒服半方寸匕日叁服不知漸加至壹

方寸匕

治婦人胞落不安血漏下相連月水過處往來或多或少小

腹急痛上搶心脅脹食不生肌方

蟬甲 乾地黃 防風 烏賊魚骨

蛇皮 桑螵蛸 甘草 分

右壹拾貳味膏節為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹酒服

拾九日叁服漸加至貳拾九

月水不利第一方

治婦人月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有子

金城太守白薇丸方

白薇 細辛 人參 杜蘅 半夏 沙參

厚朴 白蠟 牡蠣 牛膝

乾薑兩半附子兩壹秦元附 當歸參

蜀椒兩半附子兩壹秦元附 防風兩

右壹拾柒味博節饒蜜和為丸如梧桐子先食酒服參九
不知稍增至肆伍九此藥不用長服覺有身則止續經有

參分

治經年月水不利胞中有風冷故須下之大黃補消湯方

大黃 牛膝兩伍代赭 乾薑 細辛兩壹

水蛭熬 蠱蟲足熱 芒消兩 桃仁參伍 甘草兩壹

麻子仁伍 壯丹皮 紫葳各參兩 甘草兩壹

朴消兩

右壹拾肆味咬咀以水壹斗煮取參升去滓內消烱令盡
分參服五更即服相去壹炊頃自下之後將息勿見風

治婦人月水不利小腹堅急大便不通時時見有物下如鼻

涕或如雞子白皆胞中風冷也方

大黃兩 吳茱萸兩 芍藥兩 當歸 乾地黃

黃芩 乾薑 芫翳 桂心 牡丹皮

芒消 人參 細辛 甘草兩壹 水蛭熬

蠱蟲各伍兩 桃仁伍拾 黃雌雞壹隻 雞子壹

右壹拾捌味咬咀以清酒伍升漬藥壹炊久又別以水貳

斗煮雞取壹斗去雞下藥合煮取參升絞去滓內芒消烱

令盡攪調適寒溫服壹升日參服

治月水不利小腹痛方

牡丹皮 當歸 芫翳 黃芩 大黃

乾薑 人參 細辛 消石 芍藥

桂心 甘草兩壹 水蛭熬 蠱蟲足熱 桃仁參伍

薤白兩壹 乾地黃兩壹 雞子壹

右壹拾捌味咬咀以清酒伍升漬藥壹炊久別以水貳斗煮雞

取壹斗伍升去雞下藥煮取參升去滓內消石烱令盡通

寒溫壹服壹升日參服

治久寒月水不利或多或少方

吳茱萸兩 生薑兩 桂心兩 大棗兩 桃仁伍

人參 芍藥兩 小麥 半夏兩 牡丹皮兩

牛膝兩 水蛭熬 蠱蟲足熱 甘草兩壹

右壹拾伍味咬咀以清酒參升水壹斗煮取參升去滓通

寒溫服壹升日參服不能飲酒者以水代之湯腹欲成乃

內諸蟲病人不耐藥者則飲藥合

治婦人月水不利腹中滿時自減并男子膀胱滿急抵覺湯

大黃兩 桃仁參伍 水蛭熬 虎骨兩壹

右肆味咬咀以水參升煮取壹升頓服之當即下血

又方

當歸 桂心 乾漆熬 大棗兩 蠱蟲足熱

水蛭熬 芍藥 細辛 黃芩 芒消

甘草兩壹 吳茱萸 桃仁伍拾 雞子壹

右壹拾參味咬咀以酒壹斗漬壹宿明日煮之取參升分

參服

治婦人月水不利方

當歸 芍藥 乾薑 芒消 吳茱萸兩

大黃兩 桂心兩 甘草兩壹 桃仁參伍

右玖味咬咀以水玖升煮取參升去滓內芒消烱令盡分

參服

治婦人曾帶滿月水不利時繞臍苦痛手足煩熱兩脚酸

經丸方

乾薑 吳茱萸 附子炮去 大黃 芍藥各

黃芩 乾地黃 當歸 桂心 白朮各

人參 石韋各 蜀椒各 附子炮去 桃仁各 黃芩各

薏苡仁各

右壹拾伍味 搗篩為末 鍊蜜和丸 如梧桐子 先食酒服壹

九日 參服 不知稍加之 以知為度

治婦人月水不利 手足煩熱 腹滿不飲 寐心煩 寒熱九方

大黃各 前胡 芒消各 乾薑各 茯苓各

杏仁各 蜀椒各 水蛭各 黃芩各 芍藥各

右壹拾壹味 搗篩為末 鍊蜜和丸 如梧桐子 飲服柒九日

參服 漸加至拾九 治寒先食服之 藥分

治婦人帶下 寒氣血積 腰腹痛 月水時復不調 手足厥逆 氣

上瀝 心害飲食方

茯苓 枳實各 乾薑各 芍藥 黃芩

桂心 甘草各

右柒味 咬咀 以水肆升 煮取貳升 分貳服 服別相去壹炊

頃諸月水不調 皆悉主之

治婦人月水不調 或月前或月後 或如豆汁 腰痛如折 兩脚

疼痛 中風冷 牡丹大黃湯方

牡丹皮各 大黃 朴消各 桃仁各 水蛭各 黃芩各

陽起石 人參 茯苓 水蛭 黃芩 芍藥

右壹拾味 咬咀 以水玖升 煮取叁升 去滓 內朴消 令烺盡

分叁服 服別相去如壹炊頃

治婦人月水不調 或在月前 或在月後 或多或少 或赤白

陽起石湯方

陽起石各 附子炮去 樟兩炮 伏龍肝各 生地黄各 切壹

乾薑 桂心 人參 甘草各 續斷

赤石脂各

右壹拾味 咬咀 以水壹斗 煮取叁升 貳合 分肆服 日叁夜

壹服

治月水不調 或一月再來 或兩月三月一來 或月前或月後

閉塞不通 宜服杏仁湯方

杏仁各 桃仁各 大黃各 黃芩各 芍藥各

右伍味 咬咀 以水陸升 煮取貳升 伍合 分為叁服 壹服其

病當隨大小便有所下 若下多者 止勿服 若下少者 則盡貳服

治婦人產後餘疾 月水時來 腹中絞痛方

朴消 當歸 薏苡仁 桂心各 大黃各

代赭 牛膝 桃仁各 黃芩各 芍藥各

右捌味 搗篩為末 鍊蜜和丸 如梧桐子 先食酒服伍九日

參服 不知稍增之

治婦人經水來 繞臍痛 上搶心 骨往來寒熱 如瘧狀方

薏苡仁 代赭 牛膝各 黃芩各 芍藥各 大黃各

陽起石 桃仁各 桂心各

右捌味 搗篩為散 宿不食 明朝空腹溫酒服壹錢匕

治婦人月事往來 腰腹痛方

廣蟲各 女青 芎藭各 蜀椒各 附子炮去

右柒味 搗篩為散 先食酒服壹刀圭 服之拾日 微去下 善

養之佳

治婦人月事不通小腹堅痛不得近乾漆湯方

乾漆熬 大黃 黃芩 當歸 芒消

桂心略 附子續 吳茱萸去 升

葶藶 芍藥 細辛 甘草略

右壹拾貳味咀咀以清酒壹斗漬壹宿煮取參升絞去滓內芒消烱烱分參服服別相去壹炊頃

又方

大黃醃 桃仁燼 芒消 土瓜根

當歸 芍藥 丹砂研

右柒味咀咀以水玖升煮取參升去滓內丹砂末及芒消烱烱為參服服別相去壹炊頃治月水不通心腹絞痛欲死通血上痛嚴蜜湯方

吳茱萸 大黃 當歸 乾薑 蘇合去

水蛭熬 乾地黃 芍藥略 枳子仁去

桃仁燼 牛膝略 細辛 甘草略

桂心略 牛膝略 麻仁略

右壹拾陸味咀咀以水玖升煮取貳升半分參服日參服服相去壹炊頃

治瘕月水瘀血不通下病散方

大黃 細辛 朴消略 消石 附子燼

蘇合去 黃芩 乾薑略 芍藥

土瓜根 代豬 丹砂略 牛膝略 壹斤

桃仁燼 牛膝略 蟪蟪略

右壹拾伍味咀咀水酒各伍升漬藥壹宿明日乃煮取肆外去滓內朴消消石烱烱分肆服服別相去如壹炊頃

去病後宜食黃鴨羹

又方

水蛭熬 土瓜根 芒消 當歸略 桃仁燼

大黃 桂心 麻子 牛膝略

右玖味咀咀以水玖升煮取參升去滓內芒消烱烱分參服服別相去壹炊頃

治月水不通結成癥堅如石腹大骨立宜破血下瘕物方

大黃 消石略 芒消 蜀椒去 乾薑

代豬 乾漆略 芍藥 茯苓

蘇合去 巴豆燼 升

右壹拾味搗篩為末別治巴豆令如大酒服參九漸加至伍九空腹為始

治產後月水往來乍多乍少仍不復通裏急下引腰身重牛

膝丸方

牛膝 桂心 大黃 芍藥略 當歸

芍藥 人參 牡丹皮名黃 水蛭略

蘇合去 蟪蟪略 蟪蟪略 蟪蟪略

右壹拾貳味搗篩為末別治巴豆令如下伍九日參服不知漸增至拾九

治月水閉不通酒往來寒熱方

蘇合去 桃仁燼 桑螵蛸略

代豬 水蛭略 蟪蟪略 大黃略

右柒味搗篩為末別治巴豆令如梧桐子大酒服伍九日貳服

治月水不通手足煩熱腹滿默不欲寐心煩方

芍藥略 芒消 柴胡略 茯苓略 杏仁燼

大黃

蜀椒法相開

水蛭熬

海蟲去翅足熬

桃仁壹白枚去皮

蜜蠶熬

牡丹皮略炙

乾薑

葶藶子伍合熬

右壹拾肆味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為九

如梧桐子大空腹酒服九日參服不知稍增之前此方與

治腰腹痛月水不通利方

當歸

芎藭

人參

牡蠣熬

土瓜根

水蛭

丹砂研

烏頭炮去

乾漆壹兩

桃仁

右壹拾壹味搗篩為末鍊蜜和九如梧桐子大空腹酒服

參九日參服

治月閉不通不欲食方

大黃

芒消

牡蠣熬

壹

葶藶子

芒消

乾薑

芒消

蜀椒

茯苓

杏仁

芒消

右壹拾壹味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為九

和為九如梧桐子大飲服七九日再服此方數有神

治月水不通六七年或腫滿氣逆腹脹癥瘕服此方數有神

效大

右壹拾壹味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為九

右壹拾壹味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為九

右壹拾壹味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為九

右壹拾壹味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為九

右壹拾壹味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為九

右壹拾壹味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為九

右壹拾壹味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為九

如梧桐子大酒服九日參服漸愈

治月水不通閉塞方

牛膝

麻子仁

土瓜根

桃仁

右肆味以酒壹斗伍升漬伍日壹服伍合漸增至壹升日

壹服多飲益佳

治婦人產後風冷留血不去停結月水閉塞方

蒼朮

桃仁

麻子仁

右叁味以酒壹斗合煮至貳斗壹服伍合日參服稍加至

壹升佳

治月水閉不通結瘕腹大如瓠短氣欲死虎杖煎方

虎杖

牛膝

土瓜根

右叁味以水壹斛漬虎杖壹宿明旦煎餘貳斗內土瓜牛

膝汁攪令調於湯器中煎使如飴糖酒服壹合日貳夜壹

服當下若病去但令服盡

治帶下月經閉不通方

大黃

朴消

桃仁

芒消

右肆味搗篩為末別搗桃仁如膏以淳苦酒肆升以銅鑊

著火上煎減壹升內藥參校之又減壹升內朴消煎如飴

可止九如雞子投壹升美酒中當宿不食服之至日西下

或如豆汁或如雞肝凝血蝦蟇子或如薏此是病下也

治月水不通陰中腫痛芎藭湯方

芎藭

當歸

白芍

阿膠

右伍味以水玖升煮取叁升內膠烊令盡分為叁服

治婦人因其夫陰陽過度玉門疼痛小便不通白濁湯方

白王蠟

白木

澤瀉

肉蓯蓉

當歸

右伍味咬咀先以水壹斗煮至伍拾沸去王內藥煎取貳升分參服每服相去壹枚頃

治婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔心悶桑白皮湯方

桑白皮皮解乾薑壹斤桂心伍斤太棗貳斤

右肆味咬咀以水貳大升煮取捌合分貳服千金云以酒

治婦人嫁痛單行方

右壹味切以好酒壹斗煮下沸頓服

治婦人小戶嫁痛連日方

芍藥捌斤生薑切甘草炙桂心壹斤

右肆味咬咀以酒貳斗煮參沸去滓適寒溫分服

治婦人小戶嫁痛單行方

牛膝伍斤

右壹味切以酒叁斗煮再沸去滓分參服

治婦人小戶嫁痛方

烏賊魚骨炙

右壹味燒成屑以酒服方寸匕日叁服立差

治婦人姓身爲夫所動欲死單行竹瀝汁方

取淡竹斷兩頭節留中節以火燒中央以器承兩頭得汁飲之立差

千金翼方卷第八

千金翼方卷第九

論曰傷寒熱病自古有之。名賢濟世。多所防禦。至於仲景特
有神功。尋思有起。莫測其致。所以醫人未能鑽仰。嘗見太醫
藥。雖行。自無一效。傷其如此。遂披傷寒大論。鳩集要妙。以為
其方行之以來。未有不驗。舊法方證。意義幽隱。乃令近智所
迷。賢之者造次難悟。中庸之士。絕而不思。故使閭里之中。歲
致天枉之痛。遠想令人慨然。無已。今以方證同條。比類相附。
須有檢討。名卒易知。夫尋方之大意。不過三種。一則桂枝。二
則麻黃。三則青龍。此之三方。凡療傷寒不出之也。其柴胡等
諸方。皆是吐下發汗後不解之事。非是正對之法。術數未深。
而天下名賢止而不學。誠可悲夫。又有僕隸卑下。冒犯風寒。
天行疫癘。先被其毒。憫之酸心。聊述慈意。為之救法。方雖是
舊弘之惟救好古君子。嘉其博濟之利。無咎誦焉。

太陽病用桂枝湯法第一伍拾柒證

論曰傷寒與症病濕病及熱病相濫故叙而論之

太陽病發熱無汗而反惡寒是為剛症

太陽病發熱汗出而不惡寒是為柔症惡寒

太陽病發熱其脈沈細是為瘧

太陽病發其汗因致瘧

病者身熱足寒頸項強惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖

是為瘧

右件瘧狀

太陽病而關節疼痛其脈沈緩為中濕

病者一身盡疼煩日晡即劇此為風濕汗出所致也

濕家之為病一身盡疼發熱而身色似黃也

濕家之為病其人但頭汗出而背強欲得破履若下之早即

噦或背滿小便不利舌上如胎此為丹田有熱胃上有寒渴

欲飲則不能飲而口燥也

濕家下之額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦死

問曰病風濕相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨溜下

不止師云此可發汗而其病不愈者何故答曰發其汗汗

大出者但風氣去濕氣續在是故不愈若治風濕者發其

汗微微似欲出汗者則風濕俱去也

病人喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中獨和無病病

在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中即愈

右件濕狀

太陽中熱暈是也其人汗出惡寒身熱而渴也

太陽中暈身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮膚

中也

太陽中暈發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細乳遲小便已洗

然手足逆冷小有勞熱口前開板齒燥若發其汗惡寒則

其加溫針發熱益其數下之淋復甚

右件暈狀

太陽之為病頭項強痛而惡寒

太陽病其脈浮

太陽病發熱汗出而惡風其脈緩為中風

太陽中風發熱而惡寒

太陽病三四日不吐下見乳乃汗之

夫病有發熱而惡寒者發於陽也不熱而惡寒者發於陰也

發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

太陽病。頭痛至七日以上。自愈者。其經竟故也。若欲作再經者。針足陽明。使經不傳。則愈。

太陽病。欲解時。從巳至未。

風家表解而不了了者。十二日愈。

太陽中風。陽浮而陰濡弱。汗者。熱自發。濡弱者。汗自出。漉漉惡寒。漸漸惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。

太陽病。發熱汗出。此為榮弱衛強。故使汗出。以救邪風。桂枝湯主之。

太陽病。頭痛發熱。汗出惡風。桂枝湯主之。

太陽病。項背強几几。而反汗出惡風。桂枝湯主之。

太陽病。下之其氣上衝。可與桂枝湯。不衝不可與之。

太陽病。二日已發汗。吐下溫針。而不解。此為壞病。桂枝湯復不中與也。觀其脈證。知犯何逆。隨證而治之。

桂枝湯本為解肌。其人脈浮緊發熱無汗。不可與也。當識此勿令誤也。

酒客不可與桂枝湯。得之則嘔。酒客不喜甘故也。

喘家作桂枝湯。加厚朴杏仁佳。

服桂枝湯。吐者。其後必吐膿血。

太陽病。初服桂枝湯。而反煩不解者。當先刺風池。風府。乃却與桂枝湯。則愈。

太陽病。外證未解。其脈浮弱。當以汗解。宜桂枝湯。

太陽病。下之微喘者。表未解故也。宜桂枝湯。

太陽病。有外證未解。不可下之。下之為逆。解外宜桂枝湯。

太陽病。先發汗。未解而下之。其脈浮。不愈。浮為在外。而反下之。故令不愈。今脈浮。故在外。當解其外。則愈。宜桂枝湯。

病常自汗出。此為榮氣和衛氣不和故也。榮行脈中。衛行脈外。復發其汗。衛和則愈。宜桂枝湯。

外復發其汗。衛和則愈。宜桂枝湯。

病人藏無他病。時發熱。自汗出而不愈。此衛氣不和也。先其時發汗。愈。宜桂枝湯。

傷寒不大便六七日。頭痛有熱。與承氣湯。其大便反青。此為

不在裏。故在表也。當發其汗。頭痛者。必衄。宜桂枝湯。

傷寒發汗已解。半日許復煩。其脈浮數。可復發其汗。宜服桂枝湯。

枝湯。

傷寒醫下之後。身體疼痛。清便自調。急當救表。宜桂枝湯。

太陽病未解。其脈陰陽俱停。必先振汗出而解。但陽微者。先

汗之。而解。宜桂枝湯。

太陽病未解。熱結膀胱。其人如狂。其血必自下。下者即愈。其

外未解。尚未可攻。當先解其外。宜桂枝湯。

傷寒大下後復發汗。心下痞惡寒者。不可攻痞。當先解表。宜

桂枝湯。

桂枝湯方

桂枝 芍藥 生薑 炙甘草 大棗 枳實

右五味。以水漬升。微火煮取。去滓。溫服。壹

升。須臾飲熱粥壹升。餘以助藥力。溫覆令汗出。壹時許。益

善。若牙汗。再服。如前。復不汗。後服小促。其間令半日許。益

服。病重者。壹日壹夜。乃差。當啐時。觀之。服壹劑。湯病證猶

在。當復作服之。至有不汗。出。當服參朮乃解。

太陽病發其汗。遂漏而不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難

以屈伸。桂枝加附子湯主之。桂枝中加附子壹枚。炮。即是

太陽病下之。其脈促。促者。滿者。桂枝去芍藥湯主之。若微寒者

桂枝去芍藥加附子湯主之。桂枝去芍藥中加附子壹枚。即是

太陽病得之八九日如瘧發熱而惡寒熱多而寒少其人不可與清便欲自可一日再三發其脈微緩者為欲愈脈微而惡寒者此為陰陽俱虛不可復吐下發汗也面色反有熱者為未欲解以其不能得汗出身必當躁桂枝麻黃各半湯主之

桂枝湯兩指

芍藥

生薑切

甘草炙

麻黃湯兩指

大棗

杏仁

桂枝湯

右藥味以水伍升先煮麻黃湯壹分去沫內諸藥煮取壹升別合去滓溫服陸合本云桂枝湯參合麻黃湯參合併為陸合頓服

服桂枝湯大汗出若脉洪大與桂枝湯其形如瘧壹日再發汗出便解宜桂枝麻黃湯

桂枝湯兩指

大棗

杏仁

桂枝湯

甘草湯兩指

大棗

杏仁

桂枝湯

右藥味以水柒升煮麻黃湯壹分去沫內諸藥煮取壹分去滓溫服壹升日再服本云桂枝湯參合麻黃湯壹分合為貳升分貳服今合為一方

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱則無陽也不可發汗桂枝二越婢一湯主之方

桂枝

芍藥

甘草炙

麻黃湯

生薑

石膏

大棗

桂枝湯

右藥味以水伍升先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮取貳升去滓溫服壹升本云當更煮為越婢湯桂枝合之飲壹升今合為壹方桂枝湯貳分

服桂枝湯下之頸項強痛翁翁發熱無汗心下滿微痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯主之方

茯苓 白朮略參

右於桂枝湯中惟除去桂枝壹兩加此貳味為湯服壹升小便即利本云桂枝湯今去桂枝加茯苓白朮

太陽病用麻黃湯法第二方略參

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊為傷寒

傷寒一日太陽脉弱至四日太陽脉大

傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳煩欲嘔若躁煩脉數急者乃為傳

傷寒其二陽證不見此為不傳

太陽病頭痛發熱身重肢痠骨節疼痛惡風無汗而喘麻黃湯主之

太陽與陽明合病喘而胃滿不可下也宜麻黃湯

病十日已去其脉浮細嗜臥此為外解設胃滿痛與小柴胡湯浮者麻黃湯主之

太陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表證仍在此當發其汗服藥後除其人發煩自腹增劇者必與

衄乃解所以然者陽氣重故也宜麻黃湯

脉浮而數者可發其汗宜麻黃湯

傷寒脉浮緊不發其汗因致衄宜麻黃湯

脉浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病下之微喘者外未解故也宜麻黃湯

麻黃湯

右藥味以水玖升先煮麻黃湯壹分去沫內諸藥煮取貳升去滓溫服壹升日再服本云桂枝湯參合麻黃湯參合併為陸合頓服

升半去滓溫服捌合微似汗不須啜粥餘如桂枝法
太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之方

葛根剉 麻黃去節 桂枝 芍藥 甘草炙
生薑切 大棗擘

右柴味以水壹斗煮取壹斗去上沫內諸藥煮

取壹升去滓分溫叁服不須啜粥成微汗
太陽病陽明合病而自利葛根湯主之上方一云用後
不下利但嘔葛根加半夏湯主之葛根湯中加半夏半升洗

即是
太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脈促表未解喘而汗

出宜葛根湯加黃連湯方
葛根半斤 甘草炙 黃連二兩

右肆味以水捌升先煮葛根減貳升內諸藥煮取貳升去
滓分溫再服

太陽病用青龍湯法第三方證首

太陽中風脉浮發熱惡寒身體疼痛不汗出而喘大青龍
湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服之服之則厥筋惕肉

瞤此爲逆也
麻黃去節 桂枝二兩 甘草二兩 杏仁半升 石膏如雞子大

右柴味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取
叁升去滓溫服壹升取微似汗汗出多者溫粉粉之壹服

汗者勿再服若復服汗出多者土陽逆虛惡風不得眠
傷寒脉浮其人不汗但重下有輕時無少陰證者可與大

青龍湯發之方上
傷寒表不解心下水氣欬而發熱或渴或利或嘔或小便

不利少腹滿或喘者小青龍湯主之方

麻黃去節 芍藥 細辛 乾薑 甘草炙
桂枝剉 五味子 半夏各半

右捌味以水壹斗先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取
叁升去滓溫服壹升渴則去半夏加桂枝根參兩微利者

去麻黃加養花壹雞子大熬令赤色噎者去麻黃加附子
壹枚炮小便不利少腹滿去麻黃加茯苓肆兩喘者去麻

黃加杏仁半升去皮
傷寒心下水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴者此爲
寒去爲欲解小青龍湯主之方上

太陽病用柴胡湯法第四方證首

血弱氣盡虛理開邪氣因入與正氣相搏在於脅下正邪分
爭往來寒熱休作有時嘿嘿不欲食飲藏腑相連其痛必

下邪高痛下故傳其嘔小柴胡湯主之服柴胡而渴者此
爲屬陽明以法治之

得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫醫再三下之不能食
其人脅下滿痛面目及身黃頸項強小便難與柴胡湯後

必下重本渴飲水而嘔柴胡後不中與也食穀者嘔
傷寒四五日身體熱惡風頸項強脅下滿手足溫而渴小柴

胡湯主之
傷寒陽脉證金脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差與

小柴胡湯中湯見
傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具也凡柴胡湯

證而下之柴胡證不罷後與柴胡湯解者必蒸蒸而振却
發熱汗出而解傷寒五六日中風往來寒熱胸脅苦滿嘿

嘿不欲飲食心煩喜嘔或胃中煩而不嘔或渴或腹中痛

或脅下痞堅或心下悸小便不利或不渴外有微熱或欬
小柴胡湯主之

柴胡 黃芩 人參 甘草 生薑 芍藥

半夏 枳實 大棗 牡蠣

右柴胡以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎溫服壹升日
參若宵中煩不嘔者去半夏人參加枳實壹枚芍藥三
兩夏加人參合煎成四兩半腹中痛者去黃芩加芍藥三
兩脅下痞堅者去大棗加牡蠣陸兩心下悸小便不利者
去黃芩加茯苓肆兩不渴外有微熱者去人參加桂枝兩
溫覆微發其汗欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾
薑貳兩

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便
堅其脈細此為陽微結必有表復有裏沈則為病在裏汗出
亦為陽微假令純陰結不得有外證悉入在裏此為半在
外半在裏麻雖沈緊不得為少陰所以然者陰不得有汗今
頭大汗出故知非少陰也可與柴胡湯設不了了者得屎而
解

傷寒十三日不解脅脅滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本
當柴胡下之不得利今反利者故知醫以丸藥下之非其治
也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒
消湯主之方

柴胡 黃芩 人參 甘草 生薑 芍藥

半夏 枳實 大棗 牡蠣

右柴胡以水肆升煮取貳升去滓溫分再服以解其外不
解更作

柴胡加大黃芒消桑螵蛸湯方

右以前柴胡以水柒升下芒消參合大黃肆分桑螵蛸伍
枚煮取壹升半去滓溫服伍合微下即愈本云柴胡湯再
服以解其外餘貳升加芒消大黃桑螵蛸也

傷寒八九日下之實滿煩驚小便不利譫語一身不可轉側

柴胡加龍骨牡蠣湯主之方

柴胡 黃芩 人參 生薑 芍藥 龍骨

牡蠣 桂枝 茯苓 鈆丹 枳實 大黃 芍藥

半夏 枳實 大棗 牡蠣

右壹拾貳味以水捌升煮取肆升內大黃切如棊子大更
煮壹兩沸去滓溫服壹升本云柴胡湯今加龍骨等
傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未
去者宜柴胡桂枝湯

發汗多亡陽狂語者不可下以為可與柴胡桂枝湯和其榮
衛以通津液後自愈方

柴胡 黃芩 人參 生薑 芍藥 桂枝

芍藥 枳實 半夏 枳實 甘草 大棗 牡蠣

右玖味以水陸升煮取貳升去滓溫服壹升本云人參湯
作如桂枝法加柴胡黃芩後如柴胡法今用人參作半劑
傷寒五六日其人已發汗而後下之實滿微結小便不利
渴而不嘔但頭汗出往來寒熱而煩此為未解柴胡桂枝乾
薑湯主之方

柴胡 黃芩 人參 生薑 芍藥 桂枝 乾薑 枳實 大黃 芍藥

牡蠣 桂枝 芍藥 甘草 枳實

右柴胡以水壹斗貳升煮取陸升去滓更煎溫服壹升日
貳服初服微煩汗出愈

太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴胡證續在

與小柴胡湯嘔止小安其人轉微煩者為未解與大柴胡湯下者止

傷寒十餘日。和氣結在裏。欲得往來寒熱。當與大柴胡湯。

傷寒發熱汗出不解。心中痞堅。嘔吐下利者。大柴胡湯主之。

病人表裏無證。發熱七八日。雖脈浮數。不可下之。宜大柴胡湯。

柴胡湯 枳實 芍藥 黃芩 芍藥 芍藥

半夏 芍藥 大棗 枳實

右藥味以水壹斗。煮取升。去滓。更煎。溫服。壹升。日

參服壹方。加大黃貳兩。若不加。恐不名大柴胡湯。

太陽病用承氣湯法第五 發汗後惡寒者。虛故也。不惡寒。但熱者。實也。當和其胃氣。宜

小承氣湯

太陽病未解。其脈陰陽俱停。必先振汗出而解。但陽微者。先

汗出而解。陰微者。先下之而解。宜承氣湯。

傷寒十三日。過經而瘥。語內有熱也。當以湯下之。小便利者。

大便當堅。而反利其脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。

自利者。其脈當微。微者。今反和者。此為內實。宜承氣湯。

太陽病。過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胃中痛。大便反溼。其

腹微滿。經微煩。先時自極。此下者。宜承氣湯。

二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足絳。繫汗出。大便難。語

者下之。愈宜承氣湯。

太陽病。三日發其汗不解。蒸熱者。調胃承氣湯主之。

傷寒吐後腹滿者。承氣湯主之。

太陽病。吐下發汗後微煩。小便數。大便固。堅可與小承氣湯

和之則愈。

承氣湯方

大黃 厚朴 枳實 芍藥

右藥味以水壹斗。先煮大黃。取壹升。內大黃。更煮。取壹升。

去滓。內芒消。更煎。宜沸。分再服。得下者止。

又方

大黃 厚朴 枳實 芍藥

右藥味以水壹斗。煮取壹升。去滓。更煎。溫分再服。初服語

語即上服湯。當更衣。不爾。盡服之。

又方

大黃 芒消 枳實 芍藥

右藥味以水壹斗。煮取壹升。去滓。內芒消。更煎。溫頓服。

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者即愈。其外不

解。尚未可攻。當先解其外。外解少腹急結者。乃可攻之。宜桃

核承氣湯方

桃仁 桂枝 大黃 芒消

右伍味以水壹斗。煮取壹升。去滓。內芒消。更煎。溫頓服。

溫服

太陽病用陷胃湯法第六

問曰。病有結實。有藏結。其狀何如。答曰。按之痛。其脈寸口

關上自沈。為結實。何謂藏結。曰。如結實。狀飲食如故。時下利。

陽脈浮。關上細沈。而脈不實。為藏結。舌上白胎。滑者為難治。藏

結者。無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。

夫病發於陽。而反下之。熱入。因作結實。發於陰。而反汗之。因

作痞。結實者。下之。易故。令結實。結實者。其項亦強。如柔瘕狀。

下之。即和。宜大陷胃丸。

結實證其脈浮大。不可下。下之即死。

結背證悉具煩躁者死

太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒其表未解實下之動數則遲頭痛即眩胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因堅則為結背太陽病湯主之若不結背但頭汗出其餘無汗齊頸而還小便不利身必發黃傷寒六七日而身黃發熱心下滿按之如石堅大陷胃湯主之

但結背無大熱此為水結在背脊頭微汗出大陷胃湯主之太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡如小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近大陷胃湯主之若心下滿而堅痛者此為結背大陷胃湯主之

大黃 兩 芒 壹斤 煮杏仁 兩 芒 兩 半

右捰味和搗取如彈丸壹枚其逐末壹錢已白蜜壹兩水貳升合煮取壹升溫頓服壹宿乃下

大黃 兩 甘遂 兩 芒 兩 半

右捰味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒消煎壹兩沸內甘遂末分再服壹服得快利止後服

小結背者正在心下按之即痛其脈浮滑小陷胃湯主之

右捰味以水陸升先煮枯樓取壹升去滓內諸藥煮取貳升去滓分溫參服

太陽病氣鬱日不能卧但欲起者心下必結其脈微弱者此本寒也而反下之利止者必結宜未止者四五日復重下之

此為挾熱利

太陽少陽併病而反下之結背心下堅下利不復止水漿不肯下其人必心煩

病在陽當以汗解而反以水漬之其熱却不得去益煩皮粟起意欲飲水反不渴宜服大陷胃湯

文蛤 伍兩

右壹味搗為散以沸湯伍合和服壹方寸匕若不差與五苓散

五苓散方

猪苓 兩 白朮 兩 澤瀉 兩 桂枝 兩 半

右伍味各為散更於臼中治之白朮和服方寸匕日叁服多飲暖水汗出愈

寒實結背無熱證者與三物小白散方

桔梗 兩 剉 巴豆 兩 半 貝母 兩 半

右叁味搗為散內巴豆更於臼中治之白飲和服壹人半錢匕贏者減之病在上則吐在下則利不利者再服一杯利不止進冷粥一杯水一升身熱皮粟不得出當汗而不汗即煩

若以水喫之洗之更益令熱却不得出當汗而不汗即煩假令汗出已腹中痛與芍藥參兩如上法

太陽與少陽併病頭痛或眩冒如結背心下痞而緊當刺肺俞肝俞大椎第一閒慎不可發汗發汗即譫語譫語則脈弦五日譫語不止當刺期門

心下但滿而不痛者此為痞半夏瀉心湯主之

半夏 兩 黃芩 兩 乾薑 兩 人參 兩 甘草 兩 半

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓溫服壹升日叁服

脉浮緊而下之。緊反入裏。則作痞。按之自滿。但氣痞耳。
太陽中風。吐下。嘔逆。表解。乃可攻之。其人熱。熱汗出。發作有
時。頭痛。心下痞堅。滿引脅下。嘔。即短氣。此為表解裏未和。十
棗湯主之。

芫花蘇 甘遂 大戟 各等分

右三味。搗為散。以水壹升。伍合。先煮大棗。拾枚。取捌合。去
棗。強人內藥。末壹錢。已。羸人半錢。已。溫服。平旦服。若下少
不利者。明日更服。加半錢。得快下。糜粥自養。
太陽病。發其汗。遂發熱。惡寒。復下之。則心下痞。此表裏俱虛。
陰陽氣併竭。無陽則陰獨。復加燒針。胃煩。面色青黃。膚瞶。此
為難治。今色微黃。手足溫者。愈。

心下痞。按之自濡。關上脉浮者。大黃黃連瀉心湯主之。

大黃 黃連 黃連

右三味。以麻沸湯煮。須臾。去滓。分溫再服。此方。必
心下痞。而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。

附子 大黃 黃連 黃連

右三味。以麻沸湯煮。須臾。去滓。分溫再服。此方。必
本以下之。故心下痞。與之瀉心。其痞不解。其人渴。而口燥煩。
小便不利者。五苓散主之。一方言。忍之一日。乃愈。上
傷寒。汗出解之後。胃中不和。心下痞。堅。噯噯。食臭。脅下有水。
氣腹中雷鳴。而利生薑瀉心湯主之。

生薑 黃連 黃連 人參

右三味。以水壹斗。煮取陸升。去滓。溫服。壹升。日叁服。
傷寒中風。醫反下之。其人下利。日數拾行。穀不化。腹中雷鳴。
心下痞。堅。而滿。乾嘔。而煩。不能得安。醫見心下痞。為病不盡。

復重下之。其痞益甚。此非結熱。但胃中虛。客氣上逆。故使之
堅。甘草瀉心湯主之。

甘草 黃連 黃連 人參

右三味。以水壹斗。煮取陸升。去滓。溫服。壹升。日叁服。

傷寒。服湯藥。下利不止。心下痞。堅。服瀉心湯。復以他藥下之。
利不止。醫以理中與之。而利益甚。理中。治中焦。此利在下焦。
赤石脂禹餘糧湯主之。

赤石脂 禹餘糧 太一禹餘糧

右二味。以水陸升。煮取貳升。去滓。分溫叁服。若不止。當利
小便。

傷寒。吐下。發汗。虛煩。脉甚微。八九日。心下痞。堅。脅下痛。氣上
衝。喉咽眩。冒。經脉動。惕者。久而成瘕。

傷寒。發汗。吐下。解後。心下痞。堅。噯噯。氣不除者。旋復代赭湯主
之。

旋復花 人參 生薑 代赭石 甘草

右三味。以水壹斗。煮取陸升。去滓。溫服。壹升。日叁服。

太陽病。外證未除。而數下之。遂挾熱。而利不止。心下痞。堅。表
裏不解。桂枝人參湯主之。

桂枝 人參 白朮 人參 乾薑

右五味。以水玖升。先煮桂枝。取伍升。去滓。內桂。更煮。取叁
升。去滓。溫服。壹升。日再服。壹服。

傷寒。大下後。復發。其汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻其
痞。當先解表。表解。乃攻其痞。宜大黃黃連瀉心湯。上
病如桂枝證。頭項不強。痛脈微浮。胃中痞。堅。氣上衝。喉咽不

得息此為有寒當吐之宜瓜蒂散方

瓜蒂散 赤小豆

右貳味搗為散取半錢匕以香豉湯分三服之須臾去滓內散湯中和頓服之若不吐稍加之得快吐止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

太陽病維繫法第七

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入而吐此為水逆五苓散主之

桂枝湯 甘草 芍藥 生薑 大棗

右陸味以水柒升煮取叁升去滓內飴溫服壹升嚕家不可服以甘故也

傷寒脈浮而醫以火迫劫之亡陽驚狂臥起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

桂枝 生薑 蜀漆 牡蠣 龍骨 大棗 甘草

右柒味以水捌升先煮蜀漆減貳升內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝者灸其核上一壯與桂枝加桂湯方

桂枝湯 芍藥 生薑 大棗 甘草

右伍味以水柒升煮取叁升去滓溫服壹升本云桂枝湯今加桂滿伍兩所以加桂者以能溫奔豚氣也

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之方

桂枝湯 甘草 龍骨 牡蠣

右肆味以水伍升煮取貳升去滓溫服捌合日叁服傷寒加溫針必驚

太陽病六七日出表證續在脈微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹堅滿小便不利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也宜下之以抵當湯

太陽病身黃脈沈結少腹堅小便不利者為無血小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當須下之不可餘藥宜抵當丸

抵當湯方

大黃 蟅蟲 桃仁 水蛭

右肆味以水伍升煮取叁升去滓溫服壹升不下更服

抵當丸方

大黃 桃仁 蟅蟲 水蛭

右肆味搗分為肆丸以水壹升煮壹丸取柒合服時當下不下更服

婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除而脈遲身涼肯覺下滿如結胸狀謔語此為熱入血室當刺期門隨其虛實而取之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

婦人傷寒發熱經水適來晝日了了暮則謔語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必當自愈

傷寒無大熱口燥渴而煩其背微惡寒白虎湯主之

傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證白虎湯主之

傷寒脉浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之方

知母兩 石膏半斤 甘草二兩 粳米一升

右肆味以水壹斗煮米熟湯成去滓溫服壹升日叁服

又方

知母兩 石膏半斤 甘草二兩 人參二兩 粳米一升

右伍味以水壹斗煮米熟湯成去滓溫服壹升日叁服立夏後至立秋前得用之立秋後不可服春三月病常苦裏

冷白虎湯亦不可與之與之即嘔利而腹痛諸亡血及虛家亦不可與白虎湯得之則腹痛而利但當溫之

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者與黃芩加半

夏生薑湯

黃芩湯方

黃芩兩 芍藥兩 甘草二兩 大棗拾枚

右肆味以水壹斗煮取叁升去滓溫服壹升日再夜壹服

黃芩加半夏生薑湯方

半夏半升 生薑半斤

右貳味加入前方中即是

傷寒胃中有熱胃中有和氣腹中痛欲嘔吐黃連湯主之方

黃連二兩 甘草二兩 乾薑二兩 桂枝二兩 人參二兩

半夏半升 大棗拾枚

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓溫分伍服晝夜貳服

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴下

已脉浮而緊桂枝附子湯主之若其人大便堅小便自利木

附子湯主之

桂枝兩 附子壹枚 生薑半斤 大棗拾枚 甘草二兩

右伍味以水陸升煮取貳升去滓分溫叁服

木附子湯方於前方中去桂加白朮肆兩即是壹服覺身痺

半日許復服之盡其人如冒狀勿怪即是附子木併走皮

中逐水氣未得除故使之耳法當加桂肆兩以大便堅小

便自利故不加桂也

風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣

小便不利惡風不欲去衣或身微腫甘草附子湯主之方

甘草二兩 附子壹枚 白朮四兩 桂枝兩

右肆味以水陸升煮取叁升去滓溫服壹升日叁服初服

得微汗即止能食汗止復煩者將服伍合恐壹升多者

後服陸合愈

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之方

甘草四兩 桂枝兩 生薑半斤 麥門冬半斤

右玖味以清酒柒升水捌升煮取叁升去滓內膠酒烱盡

溫服壹升日叁服

陽明病狀第八方

陽明之為病胃中寒是也

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有微陽陽明何謂也答曰

太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也微陽陽明

者發其汗若利其小便胃中燥便難是也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病發其汗若下之亡其津液

胃中乾燥因為陽明不更衣而便難復為陽明病也

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗出而不惡寒但反惡熱

問曰病有得之一日發熱惡寒者何答曰然雖二日惡寒自

罷即汗出惡熱也。曰惡寒何故？自罷合曰陽明病中主土萬物所歸無所復傳故始雖惡寒二日自止是為陽明病。

太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明。

病發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然者為轉在陽明。

傷寒三日陽明脈大。

病脈浮而緩手足溫是為裏在太陰太陰當發黃小便自利者不能發黃至七八日而堅為屬陽明。

傷寒傳經陽明者其人微然後汗出。

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮若堅下之則腹滿小便難也。

陽明病能食為中風不能食為中寒。

陽明病中寒不能食而小便利手足濇然汗出此為欲作堅瘕也必頭堅後濇所以然者胃中冷水穀不別故也。

陽明病初為欲食之小便反不數大便自調其人骨節疼痛翕翕如有熱狀奄然發狂濇然汗出而解此為水不勝穀氣與汗共奔堅者即愈。

陽明病欲解時從申至戌。

陽明病不能食下之不解其人不能食攻其熱必嘔所以然者胃中虛冷故也。其人本虛攻其熱必嘔。

陽明病眩暈食難用飽飽即微煩頭眩者必小便利此欲作瘕瘕難下之其腹必滿如故耳所以然者脈遲故也。

陽明病久而堅者陽明病當多汗而反無汗其身如蟲行皮中之狀此為大虛故也。

冬陽明病反無汗但小便利二三日嘔而效手足若厥者其人頭必痛若不嘔手足不厥者頭不痛。

冬陽明病但頭眩不惡寒故能食而效者其人咽必痛若不

效者咽不痛。

陽明病脈浮而緊其熱必潮發作有時但浮者必盜汗出。

陽明病無汗小便利不利心中懊憹必發黃。

陽明病被火額上微汗出而小便利必發黃。

陽明病口燥但欲漱水不欲咽者必衄。

陽明病本自汗出醫復重發其汗病已差其人微煩不了了此大便堅也必亡津液胃中燥故令其堅當問小便日幾行若本日三四行今日再行者必知大便不久出今為小便數少津液當還入胃中故知必當大便也。

大病陽多者熱下之則堅汗出多極發其汗亦堅。

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也。

陽明病當心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者利止者愈。

陽明病合色赤亦不可攻之必發熱色黃者小便不利也。

陽明病不吐下而煩者可與承氣湯。

陽明病其脈遲雖汗出不惡寒其體必重短氣腹滿而喘有潮熱如此者其外為解可攻其裏手足濇然汗出此為已堅承氣湯主之。

若汗出多而微惡寒外為未解其熱不潮勿與承氣湯若腹大滿而不大便者可與小承氣湯微和其胃氣勿令至大下。

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之。

若不大便六十日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉失氣者此為有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但頭取後溲不可攻之攻之必腹脹滿不能食欲飲水者即嘔其後發熱者必復堅以小承氣湯和之若不轉失氣者慎不可攻之。

大實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語是也直視譫語而滿者

死下利者亦死

陽明病其人多汗津液外出胃中燥大便必堅堅者則譫語承氣湯主之

陽明病譫語妄言發潮熱其脈滑疾如此者承氣湯主之因與承氣湯壹升腹中轉氣者復與壹升如不轉氣者勿與之明日又不大便脈反微澀此為裏虛為難治不得復與承氣湯

陽明病譫語有潮熱反不能食者必有燥屎五六枚若能食者但堅耳承氣湯主之

陽明病下血而譫語者此為熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而寫之譫然汗出者則愈

汗出而譫語者有燥屎在胃中此風也過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實下之則愈宜承氣湯

傷寒四五日脈沈而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實又則譫語

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微滿頭堅後溲者不可下之有燥屎者宜承氣湯

病者五六日不大便繞臍痛躁煩發作有時此為有燥屎故使不大便也

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發者屬陽明脈實者當下之脈浮虛者當發其汗下之宜承氣湯發汗宜桂枝湯

方親桂枝湯門

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎所以然者本有宿食故也宜承氣湯

病者小便不利大便下難下易時有微熱憊鬱不能卧有燥屎故也宜承氣湯

得病二三日脈弱無太陽柴胡證而煩心下堅至四日雖能食以小承氣湯少與微和之令小安至六日與承氣湯壹升

不大便六七日小便少者雖不大便但頭堅後溲未定成其堅攻之必瀉當須小便利定堅乃可攻之宜承氣湯

傷寒七八日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者此為實急下之宜承氣湯

陽明病發熱汗多者急下之宜承氣湯

發汗不解腹滿痛者急下之宜承氣湯

腹滿不減減不足言當下之宜承氣湯

陽明與少陽合病而利脈不負者為順滑而數者有宿食宜承氣湯方並見承

陽明病脈浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反偏惡熱其身體重發汗即躁心中憤憤而反譫語加溫針必怵

惕又煩躁不得眠下之胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子湯主之

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹若飢不能食但頭汗出梔子湯主之方

右貳味以水肆升先煮梔子取貳升半內豉煮取壹升半去滓分再服溫進壹服得快吐止後服

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁言語重經譫語發汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷白虎湯主之

若渴飲飲水口乾舌燥者白虎湯主之

若脈浮發熱渴飲飲水小便不利猪苓湯主之方

猪苓

澤瀉

阿膠

滑石

右伍味以水肆升先煮肆味取貳升去滓內膠烱消溫服
柒合日叁服

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓
湯復利其小便故也

胃中虛冷其人不能食者飲水即噦

脉浮發熱口乾鼻燥能食者即衄

若脉浮遲表熱裏寒下利清穀四逆湯主之方

甘草瀉心湯 乾薑 黃芩 附子 煨 牡蠣 枳實

右叁味以水叁升煮取壹升貳合去滓分溫再服強人可
大附子壹枚乾薑叁兩

陽明病發潮熱大便澀小便自可而胃脘滿不去小柴胡湯
主之

陽明病膈下堅滿不大便而嘔古上胎者可以小柴胡湯上
焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣
不通鼻乾不得汗其人嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱

時時噦耳前後臍刺之小差外不解病過十日脉續浮與小
柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不溺腹滿加噦不治助陽

陽明病其脉遲汗出多而微惡寒者未解可發汗且桂枝
湯

陽明病脉浮無汗其人必喘發汗即愈宜麻黃湯助陽並
陽明病汗出若發其汗小便自利此為內竭雖堅不可攻當
須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根猪膽汁皆可以導

方 蜜煎法

右壹味內銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦著
欲可丸捻如指許長貳寸當熱時急作令頭銳以內穀道

千金翼方 卷九 傷寒上

中以手急抱欲大便時乃去之

又方 大猪膽壹枚瀉汁和少法醋以灌穀道中如一食頃當大
便出宿食惡物已試甚良

陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出其身
無有齊頸而還小便不利渴引水漿此為痰熱在裏身必發
黃茵陳湯主之

傷寒七八日身黃如橘小便不利其腹微滿茵陳湯主之方

茵陳 蒿 梔子 枳實 大黃 黃芩

右叁味以水壹斗貳升先煮茵陳蒿陳減陸升內貳味煮取三
升去滓分溫叁服小便當利溺如早莢沫狀色正赤壹宿
黃從小便去

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜
忘雖堅大便必黑抵當湯主之

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之假令下已脉
數不解而合熱消數喜飢至六七日不大便者有瘀血抵當
湯主之若數不解而下不止必挾熱便膿血瘀熱難

食穀而喘者屬陽明榮氣湯主之方

右叁味以水壹升煮取貳升去滓溫服柒合日叁服得湯
反劇者屬上焦也

陽明病寸口緩關上小浮尺中弱其人發熱而汗出復惡寒
不嘔但心下痞此為醫下之也若不下其人復不惡寒而渴
者為轉屬陽明小便數者大便即堅不更衣十日無所苦也

若為轉屬陽明小便數者大便即堅不更衣十日無所苦也

渴欲飲水者但與之當以法救渴宜五苓散散助陽

脉陽微而汗出少者為自和汗出多者為太過太過者陽絕

脈微而汗出少者為自和汗出多者為太過太過者陽絕

脈微而汗出少者為自和汗出多者為太過太過者陽絕

於內亡津液大便因堅

脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣則生熱其陽則絕跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便即堅其脾為約麻子仁丸主之方

麻子仁丸麻子仁丸藥 枳實 大黃 厚朴 芍藥 杏仁 枳殼 炙甘草 附子

右陸味蜜和丸如梧桐子大飲服拾圓日參服漸加以知為度

傷寒發其汗則身目為黃所以然者寒濕相搏在裏不解故也傷寒其人發黃梔子蘘皮湯主之方

梔子蘘皮湯 甘草 黃蘗 梔子 蘘皮

右炙味以水肆升煮取貳升去滓分溫再服傷寒發熱在裏身體必黃麻黃連翹赤小豆湯主之方

麻黃 連翹 赤小豆 杏仁 甘草 石膏 枳實 芍藥 大棗 生梓白皮 枳實 甘草 芍藥

一方生薑 枳實 芍藥 甘草 芍藥

右柒味以水壹斗煮麻黃壹斗去上沫內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

少陽病狀第九 玃鑿

少陽之為病口苦咽乾目眩也

少陽中風兩耳無所聞目赤背中滿而煩不可吐下吐下則悸而驚

傷寒病脈弦細頭痛而發熱此為鬱少陽少陽不可發汗發汗則譫語為驚胃不和即愈不和煩而悸

太陽病不解轉入少陽脅下堅滿乾嘔不能食飲往來寒熱而未吐下其脈沈緊可與小柴胡湯若已吐下發汗溫針

譫語柴胡證罷此為壞病知犯何逆以法治之

三陽脈浮大上關上但欲寐目合則汗

傷寒六七日無大熱其人躁煩此為陽去入陰故也傷寒三日三陽為盡三陰當受其邪其人反能食而不嘔此為三陰不受其邪

傷寒三日少陽脈小欲已

少陽病欲解時從寅盡辰

千金翼方卷第十

傷寒

太陰病狀第一

太陰之為病腹滿吐食不下之益其時腹自痛胃下堅結

太陰病脈浮可發其汗

太陰中風四肢煩疼陽微陰澀而長為欲愈

太陰病欲解時從多盡丑

自利不渴者為太陰其藏有寒故也當溫之宜四逆輩

傷寒脈浮而緩手足溫是為繫在太陰太陰當發黃小便自利利者不能發黃至七八日雖煩暴利十餘行必自止所以

自止者脾家實發黃去故也

本太陽病醫反下之因腹滿時痛為屬太陰桂枝加芍藥湯

主之其實痛加大黃湯主之方

桂枝湯 芍藥 生薑 甘草 大棗 枳實

右五味以水柒升煮取叁升去滓分溫叁服

加大黃湯方

大黃

右於前方中加此大黃貳兩即是

人無陽證脈弱其人續自便利設當行大黃方藥有減之其人

人胃氣弱易動故也

少陰病狀第二

少陰之為病脈微細但欲寐

少陰病欲吐而不煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰虛

故引水自救小便白者少陰病形悉具其人大小便白者下

焦虛寒不能制溲故白也夫病其脈陰陽俱緊而反汗出

為陽屬少陰法當咽痛而復吐利

少陰病欲下利而不利謹語是為被火氣劫故也小便必難為強

貴少陰汗也

少陰病脈細沈數病在裏不可發其汗

少陰病脈微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱遲者復

不可下之

少陰病脈緊者至七八日下利之脈微手足反溫其脈緊

反去此為欲解雖煩下利必自愈

少陰病下利若利止惡寒而手足溫者可治

少陰病惡寒而踰時自煩欲去其衣被不可治

少陰中風其脈陽微陰浮為欲愈

少陰病欲解時從子盡寅

少陰病八九日而一身手足盡熱熱在膀胱必便血

少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死脈不足者灸其少

陰七壯

少陰病但厥無汗強發之必動血未知從何道出或從口鼻

目出是為下厥上竭為難治

少陰病惡寒踰時而利手足逆者不治

少陰病下利止而取時時自冒者死

少陰病其人吐利躁逆者死

少陰病四逆惡寒而踰其脈不至其人煩而躁者死

少陰病六七日其息高者死

少陰病脈微細沈但欲吐汗出不煩自欲吐至五六日自利

復煩燥不得臥寐者死

少陰病始得之反發熱脈反沈者麻黃細辛附子湯主之

三升去滓溫服一升

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗方

麻黃去心

附子一枚炮去皮破八片甘草二兩

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧者黃連阿膠湯主之方

黃連四兩

黃芩一兩

芍藥二兩

雞子黃一枚

阿膠三挺

右五味以水六升先煮三味取二升去滓內膠烺盡內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

少陰病身重手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之方

附子二枚炮去皮破八片茯苓三兩

白朮四兩

芍藥三兩

人參二兩

右五味以水八升煮取三升去滓分溫三服

少陰病下利便膿血桃花湯主之

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利而便膿血者以桃花湯主之方

赤石脂一斤

乾薑一兩

粳米一升

右三味以水七升煮赤石脂湯成去滓溫取七合內赤石脂末一方寸匕一服止餘勿服

少陰病下利便膿血者可刺

少陰病吐利手足逆煩躁欲死者赤石脂湯主之方

少陰病下利咽痛口滿心煩猪膽湯主之方

猪膚一斤

右壹味以水壹斗煮取五升去滓內白蜜壹升白粉五合熬香和令相得溫分六服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯方

甘草

右壹味以水參升煮取壹升半去滓溫服七合日再服

桔梗湯方

桔梗一大枚甘草二兩

右貳味以水參升煮取壹升去滓分溫再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出苦酒湯主之方

雞子黃一枚

黃連一兩

半夏一兩

白蜜一升

右貳味內半夏者苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑愈

少陰病咽中痛半夏散及湯方

半夏洗

桂枝

甘草炙

右叁味等分各異擣合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸匕更煮三沸下火令小冷少少含嚥之半夏有毒不當散服

少陰病下利白通湯主之方

附子壹枚生去皮破八片

乾薑一兩

葱白四莖

右叁味以水參升煮取壹升去滓分溫再服

少陰病下利脈微服白通湯利不止厥逆無脈乾煩者白通加猪膽汁湯主之方

猪膽汁一合

人尿五合

右貳味內前湯中和令相得溫分再服若無膽亦可服用

湯脈暴出者死微續者生

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重

痛而利此為有水氣其人或數或小便不利或下利或嘔玄武湯主之

茯苓 芍藥 生薑 瀉心白朮 附子 乾薑 甘草

右伍味以水捌分。煮取參升。去滓。溫服。分四次。若下利者。去芍藥。加乾薑。乾薑二兩。嘔者。去附子。加生薑。生薑半斤。利不止。便膿血者。宜桃花湯。

少陰病下利。清穀裏急後重。手足厥逆。脈微欲絕。身反惡寒。其人面赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止而脈不出。通脈四逆湯主之。

甘草 附子 乾薑 芍藥 人參

右參味以水參升。煮取壹升。分四次。溫再服。其脈即出者。愈。面赤者。加葱白九莖。腹痛者。去芍藥。加芍藥。兩兩。嘔者。加生薑。兩兩。嘔痛者。去芍藥。加桔梗。壹兩。利止。脈不出者。去桔梗。加人參。兩兩。兩病皆與方相應者。乃加減服之。少陰病四逆。其人或數或悸。或小便不利。或腹中痛。或洩利。下重。四逆散主之。

枳實 芍藥 柴胡 甘草

右肆味。搗為散。白飲和服。方寸匕。日三服。服後。若加五味子。乾薑。各伍分。兼主利。悸者。加桂。伍分。小便不利者。加茯苓。伍分。腹中痛者。加附子。壹枚。炮。洩利。下重者。先以水伍升。煮薤白。三升。取三升。去滓。以散三方寸匕。內湯中。煮取一升。半分。溫再服。

少陰病不利。六七日。欬而嘔。渴。心煩。不得眠。猪苓湯主之。

猪苓 茯苓 白朮 澤瀉 滑石

千金翼方 卷十 傷寒下

少陰病利清水。色青者。心下必痛。口乾燥者。可下之。宜承氣湯。

少陰病六七日。腹滿不大便者。急下之。宜承氣湯。

少陰病其脈沈者。當溫之。宜四逆湯。

少陰病其人飲食入則吐。心中溫。欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脈弦。遲。此胃中實。不可下也。當逐之。若膈上有

寒飲。乾嘔者。不可吐。當溫之。宜四逆湯。

少陰病下利。脈微。澀者。即嘔。汗者。必數更衣。反必當溫。其上

灸之。

厥陰病狀第三

厥陰之為病。消渴。氣上撞心。中疼。熱飢而不欲食。甚者則欲

吐。蛇下之不肯止。

厥陰中風。其脈微。浮為欲愈。不浮為未愈。

厥陰病欲解時。從丑盡卯。

厥陰病渴欲飲水者。與水飲之。即愈。

諸四逆散者。不可下之。虛家亦然。

傷寒先厥後發熱而利者。必止。見厥復利。

傷寒始發熱六日。厥反九日。而下利。厥利當不能食。今反能

食。恐為除中。食之黍餅。不發熱者。知胃氣尚在。必愈。恐暴

熱來出而復去也。後日脈之其熱續在。期之旦日夜半愈。

所以然者。本發熱六日。厥反九日。復發熱三日。并前六日

亦為九日。與厥相應。故期之旦日夜半愈。後三日脈之數

其熱不能止。此為熱氣有餘。必發癰膿。

傷寒脈遲六七日。而反與黃芩湯。微其熱。脈遲為寒。與黃芩

湯。復除其熱。腹中冷。當不能食。今反能食。此為除中。必死。

傷寒先厥發熱下利。必自止。而反汗出。咽中強。痛其喉為痺。

發熱無汗而利必自止便膿血便膿血者其喉不痺

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥深熱

亦深厥微熱亦微厥應下之而發其汗者口傷爛赤

凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆者是

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥不

過五日以熱五日故知自愈

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無安時此為藏寒虵

上入其膈虵厥者其人當吐虵令病者靜而復時煩此為

藏寒虵上入其膈故煩須更復止得食而嘔又煩者虵聞

食莫必出其人常自吐虵虵厥者烏梅丸主之方又附

烏梅丸百 細辛 乾薑 黃連 附子 人參 黃蘗

右壹拾味異擣合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之伍

斗米下擣成泥和諸藥令相得臼中與蜜杵千下丸如梧

桐子太先食飲服拾九日參服少少加至貳拾九禁生冷

滑物臭食等

傷寒熱少微厥稍頭寒嘿嘿不欲食煩躁數日小便利色白

若熱除也得食其病為愈若厥而嘔胃膈煩滿其後必便

血指頭病者手足厥冷言我不結胃少腹滿按之痛此冷結在膀胱

關元也

傷寒發熱四日厥反三日復發熱四日厥少熱多其病當愈

四日至六七日不除必便膿血

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣

退故為進

傷寒六七日其脈數手足厥煩躁陰厥不還者死

傷寒下利厥逆躁不能卧者死

傷寒發熱下利至厥不止者死

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無

陽故也

傷寒五六日不結胃腹濡脈虛復厥者不可下之下之亡血死

傷寒發熱而厥七下利者為難治

傷寒脈促手足厥逆者可灸之

傷寒脈滑而厥者其表有熱白虎湯主之表熱里方

手足厥寒脈為之細絕當歸四逆湯主之表熱里方

當歸 桂心 細辛 芍藥 甘草

通草 大棗 枳實 附子

右柒味以水捌升煮取叁升去滓溫服壹升日叁服

若其人有寒當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

吳茱萸 生薑 芍藥 甘草 附子 大棗 枳實 通草

右前方中加此貳味以水肆升清酒肆升和煮取叁升去

滓分溫肆服

大汗出熱不去拘急四肢疼若下利厥而惡寒四逆湯主之

大汗出若火下利而厥四逆湯主之陽明

病者手足逆冷脈乍緊者邪結在胃中心下滿而煩飢不能

食病在胃中當吐之宜瓜蒂散散之

傷寒厥而心下悸先治其水當與茯苓甘草湯却治其厥不

爾其水入胃必利茯苓甘草湯主之

茯苓 芍藥 甘草 附子 桂枝 生薑 大棗 枳實 通草

右肆味以水肆升煮取貳升去滓分溫叁服

傷寒六七日其人大下後脈沈遲手足厥逆下部脈不至咽

喉不利唾膿血渴利不止為難治麻黃升麻湯主之

林家忌發其汗。發其汗必便血。

瘡家雖身疼痛忌攻其表。汗出則瘡。

冬時忌發其汗。發其汗必吐利。口中爛生瘡。而小便利。若

失小便忌攻其表。汗則厥逆冷。

太陽病發其汗因致瘧。

宜發汗第一

大法春夏宜發汗。

凡發汗欲令手足皆周。熱發一時間益佳。不欲流離。若病不

解。當重發汗。汗多則亡陽。陽虛不得重發汗也。

凡云宜發汗而無湯者。九散亦可用。然不如湯藥也。

凡脈浮者。病在外。宜發其汗。

太陽病脈浮而數者。宜發其汗。

陽明病脈浮虛者。宜發其汗。

陽明病其脈遲。汗出多而微。惡寒者。表為未解。宜發其汗。

太陰病脈浮宜發其汗。

太陽中風。陽浮而陰濡弱。汗者。熱自發。濡弱者。汗自出。漉漉

惡寒。漸欲惡風。身發熱。鼻鳴。乾嘔。桂枝湯主之。

太陽頭痛發熱。身體疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘。麻黃

湯主之。

太陽中風。脈浮。發熱惡寒。身體疼痛。不汗出而煩躁。大青

龍湯主之。

少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。

忌吐第二

太陽病惡寒而發熱。今自汗出。反不惡寒。而發熱。關上脈細

而數。此吐之過也。

少陰病其人欲飲。良入則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。

手足其脈弦。此逆也。若脈上有寒。飲乾乾。吐止。當溫之。

諸四逆病。欲吐。吐家亦然。

宜吐第四

大法春夏宜吐。

凡服吐湯中病便止。不必盡劑也。

病如桂枝證。其頭項不強。痛寸口脈浮。胃中痞堅。上膈咽。喉

不得息。此為有寒。宜吐之。

病者上膈。實胃中鬱鬱而痛。不能食。欲使人按之。而反有涎

唾下利。日十餘行。其脈反遲。寸口微滑。此宜吐之。利即止。

少陰病其人飲食入則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。宜吐之。

病者手足逆冷。脈下緊。邪結在胃中。心下滿而煩。飢不能食。

病在胃中宜吐之。

宿食在上宜吐之

咽中閉塞。忌下下之。則上輕下重。水漿不下。諸外實忌下下

之。皆發微熱。上脈則厥。

諸虛忌下下之。則渴引水。易愈。惡水者。劇

脈數者。忌下下之。必煩利不止。

尺中弱。澀者。復忌下。

脈浮大。醫反下之。此為大逆。

太陽證不能忌下下之。為逆。

結實證其脈浮大。忌下下之。即死。

太陽與陽明合病。喘而骨滿者。忌下。

太陽與少陽合病。心下痞堅。頭項強而眩。忌下。

凡四逆病。欲者。忌下。虛家亦然。

病欲吐者忌下。

病有外證未解忌下下之為逆

少陰病食入即吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒

脈弦遲此胃中實忌下

傷寒五六日不結胃腹濡脈虛復厥者忌下下之亡血則死

宜下第六

大法秋宜下

凡宜下以湯勝丸散

凡服湯下中病則止不必盡參服

陽明病發熱汗多者急下之

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之

少陰病五六日腹滿不大便者急下之

少陰病下利清水色青者心下必痛口乾者宜下之

下利三部脈皆浮按其心下堅者宜下之

下利脈遲而滑者實也利未欲止宜下之

陽明與少陽合病利而脈不負者為順脈數而滑者有宿食

宜下之

問曰人病有宿食何以別之答曰寸口脈浮大按之反濡尺

中亦微而澀故知有宿食宜下之

下利不欲食者有宿食宜下之

下利差至其時復發此為病不盡宜復下之

凡病腹中滿痛者為寒宜下之

腹痛不減減不足言宜下之

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者

此為實急下之

脈雙弦而遲心下堅脈大而緊者陽中有陰宜下之

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利此為血宜下之
病者煩熱汗出即解後如瘧日晡所發者屬陽明脈實者當
下之

宜溫第七

大法冬宜服溫熱藥

師曰病發熱頭痛脈反沈若不差身軀更疼痛當救其裏宜

溫藥四逆湯

下利腹脹滿身軀疼痛先溫其裏且四逆湯

下利脈遲緊為痛未欲止宜溫之

下利脈浮大者此為虛以強下之故也宜溫之與水必噤

少陰病下利脈微澀者宜溫之

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也宜溫之

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之

手足寒脈弦遲若膈上有寒飲乾嘔宜溫之

少陰病脈沈者宜急溫之

下利欲食者宜就溫之

忌火第八

傷寒加火針必驚

傷寒脈浮而醫以火迫劫之亡陽必驚狂卧起不安

傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火必謬語

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必清血

陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃

少陰病發而下利證語是為被火氣劫故也小便必難為強

責少陰汗也

宜火第九

凡下利穀道中痛宜灸枳實若熱鹽等熨之

忌灸第十

微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆

脈浮當以汗解而反灸之邪無從去因火而盛病從重以下必重而痺此為火逆

脈浮熱甚而反灸之此為實實以虛治因火而動咽燥必唾血

宜灸第十一

少陰病一二日口中和其背惡寒宜灸之

少陰病吐利手足逆而脈不足灸其少陰七壯

少陰病下利脈微澀者即嘔汗者必數更衣反少者宜溫其上灸之陰虛者

下利手足厥無脈灸之主厥厥陰是也灸不溫反微喘者死傷寒六七日其脈微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還者死

脈促手足厥者宜灸之

忌刺第十二

大怒無刺

新內無刺

大勞無刺

大醉無刺

大飽無刺

大渴無刺

大驚無刺

無刺燭燭之

熱無刺渌渌之汗無刺渾渾之脈無刺病與脈相逆者

上工刺未生其次刺未盛其次刺其衰工逆此者是謂伐形

宜刺第十三

太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲作再經者宜

刺足陽明使經不傳則愈

太陽病初服桂枝湯而反煩不解宜先刺風池風府乃却與桂枝湯則愈

傷寒腹滿而譫語寸口脈浮而緊者此為肝乘脾名曰縱宜

刺期門

傷寒發熱滿者惡寒其人大渴欲飲飲數漿者其腹必滿而自汗出小便利其病欲解此為肝乘肺名曰橫宜刺期門

陽明病下血而譫語此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而寫之

太陽與少陽合病心下痞堅頸項強而眩宜刺大椎肺俞肝俞勿下之

婦人傷寒懷身腹滿不得小便加從重以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實宜刺寫勞宮及關元

小便利則愈

傷寒嘔痺刺手少陰穴在腕當小指後動脈是也針入參分補之

少陰病下利便膿血者宜刺

忌水第十四

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

下利其脈浮大此為虛以強下之故也設脈浮革因爾腸鳴當溫之與水必噦

太陽病小便不利者為水多心下必悸

宜水第十五

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃氣和則愈

厥陰渴欲飲水與水飲之即愈

嘔而吐膈上者必思養解急思水者與安食最飲之水亦得也

發汗後水藥不得入口為逆

未持脈時病人手叉自冒心師因數試令動而不即動者此必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故也

發汗後身熱又重發其汗胃中虛冷必反吐也

大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便利必自愈

病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者以醫發其汗陽氣微

微脈氣虛則為數數為客熱不能消穀胃中虛冷故吐也

病者有寒復發其汗胃中冷必吐衄

發汗後重發其汗亡陽證諸其脈反和者不死服桂枝湯汗

出大煩渴不解若脈洪大與白虎湯

發汗後身軀疼痛其脈沈遲桂枝加芍藥生薑人參湯主之

桂枝湯芍藥生薑人參湯主之

右陸味以水壹斗貳升煮取參升去滓溫服壹升本云桂

枝湯令加芍藥生薑人參

太陽病發其汗而不解其人發熱心下悸頭眩身瞤而動振

振欲擗地者玄武湯主之

發汗後其人齊下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

茯苓桂枝甘草大棗湯主之

右陸味以水壹斗煮取參升去滓溫服壹升

發汗過多以後其人又手自冒心心下悸而欲得按之桂枝

甘草湯主之

桂枝湯甘草湯主之

右貳味以水參升煮取壹升去滓頓服即愈

發汗脈浮而數後煩者五苓散主之

發汗後腹脹滿厚朴生薑半夏甘草人參湯主之

厚朴生薑半夏甘草人參湯主之

厚朴生薑半夏甘草人參湯

右伍味以水壹斗煮取參升去滓溫服壹升日參服

發其汗不解而反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

芍藥甘草附子湯主之

右參味以水參升煮取壹升貳人參湯主之

不惡寒但熱者實也當和其胃氣且小承氣湯

傷寒脈浮自汗出小便數煩後微惡寒而脚攣急反與桂枝

欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾薑湯以

復其陽厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚即伸而胃

氣不和可與承氣湯重發汗復加燒針者四逆湯主之甘

草乾薑湯

甘草乾薑湯

右貳味以水參升煮取壹升去滓分溫再服

芍藥甘草湯

右貳味以水參升煮取壹升生去滓分溫再服

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者必自

愈

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞膈起即頭眩其脈沈緊

發汗即動經身為振搖茯苓桂枝白朮甘草湯主之

茯苓桂枝白朮甘草湯主之

右肆味以水陸升煮取參升去滓分溫再服

發汗吐下以後不解煩躁茯苓四逆湯主之

茯苓四逆湯主之

右伍味以水伍升煮取貳升去滓溫服柒合日參服

發汗吐下後虛煩不得眠刻者反覆顛倒心中懊憹梔子湯主之若少氣梔子甘草湯主之若嘔者梔子生薑湯主之

梔子湯方

於梔子湯中加甘草兩即是

梔子生薑湯方

於梔子湯中加生薑伍兩即是

傷寒下後煩而腹滿臥起不安梔子厚朴湯主之

梔子厚朴湯方

厚朴 枳實 梔子

右參味以水參升半煮取壹升半去滓分貳服溫進壹服

快吐止後服

下以後發其汗必振寒又其脈微細所以然者內外俱虛故也

發汗若下之煩熱皆中空者屬梔子湯證

下以後發其汗者則晝日煩躁不眠夜而安靜不嘔不渴

而無表證其脈沈微身無大熱屬附子乾薑湯方

附子乾薑湯方

乾薑 附子

右貳味以水參升煮取壹升去滓頓服即安

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因冒冒家

當汗出自愈所以然者汗出表和故也表和故下之

傷寒醫以丸藥大下後身熱不去微煩梔子乾薑湯主之方

梔子乾薑湯方

乾薑 梔子

右貳味以水參升半煮取壹升半去滓分貳服溫進壹服

得快吐止後服

脈浮數法當汗出而愈而下之則身體重心悸者不可發其

汗當自汗出而解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實

津液自和自汗出愈

發汗以後不可行桂枝湯汗出而喘無大熱與麻黃杏仁石

膏甘草湯

麻黃 杏仁 甘草 石膏

石 膏 碎 升 甘 草 湯 方

右肆味以水參升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取

參升去滓溫服壹升本云黃耳杯

傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大

渴舌上乾燥而煩欲飲水數升白虎湯主之

傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日晡所發

潮熱不惡寒猶如見鬼神之狀劇者發則不識人循衣妄

語與承氣湯若下者勿復服

大下後口燥者裏虛故也

霍亂病狀第六 續論

問曰病有霍亂者何也答曰嘔吐而利此為霍亂

問曰病者發熱頭痛身體疼痛惡寒而復吐利當屬何病答

曰當為霍亂霍亂吐下利止復更發熱也

傷寒其脈微瀼本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉

入陰當利本素嘔下利者不治若其人即欲大便但反失

氣而不利者是為屬陽明必堅十二日愈所以然者經竟

故也

下利後當堅堅能食者愈今反不能食到後經中頗能食復

一經能食過之一日當愈若不愈不屬陽明也惡寒脈微

而復利利止必亡血四逆加人參湯主之

四逆湯中加人參壹兩即是

霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水五苓散主之寒多

不用水者理中湯主之

人參 乾薑 甘草 白朮

右肆味以水捌升，煮取叁升，去滓，溫服壹升，日叁服，齊上。藥者為腎氣動，去木加桂，肆兩，吐多者去木，加生薑叁兩，下利多者復用木，悸者加茯苓貳兩，渴者加木至肆兩，半腹中痛者加人參至肆兩，半寒者加乾薑至肆兩，半腹滿者去木，加附子壹枚，服後如食，須飲熱粥壹升，微自溫，暖勿發揭衣被。壹方蜜和九，如雞黃許大，以沸湯數合和，壹丸，研碎，溫服，日叁夜貳，腹中未熱，益至叁肆丸，然不多湯，吐利止而身體痛不休，當消息和解其外，宜桂枝湯小和之。吐利汗出發熱惡寒，四肢拘急，手足厥逆，湯主之。既吐且利，小便復利而大汗出，下利清穀，裏寒外熱，脈微欲絕，四逆湯主之。

吐已下斷，汗出而厥，四肢不解，脈微欲絕，通脈四逆加猪膽湯主之。

於通脈四逆湯中加猪膽汁半合，即是服之，其脈即出，無猪膽以羊膽代之。

吐利發汗其人脈平而小，煩此新虛不勝穀氣故也。

陰易病，已後發復，第七附，豬膽汁四音。

傷寒陰易之為病，身熱重，少氣，少腹裏急，或引陰中拘攣，熱上衝，胃頭重，不欲舉，眼中生花，加胞赤，膝脛拘急，燒裨散主之。

婦人裏禪近隱處燒灰。

右壹味水和服方寸匕，日叁，小便即利，陰頭微腫，此為愈。大病已後勞復，枳實梔子湯主之。

千金翼方 卷十 傷寒下

敗羹五六沸，去滓，分溫再服，若有宿食，內大黃如博棗子，大五六枚，服之愈。

傷寒差已後更發熱，小柴胡湯主之。脈浮者以汗解之，脈沈實者以瀉解之。

大病已後腰以下有水氣，牡蠣澤瀉散主之。

右柒味搗為散，飲服方寸匕，日叁服，小便即利。

傷寒解後虛羸，少氣，氣逆欲吐，竹葉石膏湯主之。

右柒味以水壹斗，煮取陸升，去滓，內粳米熟，湯成溫服壹升，日叁服。

大病已後其人喜睡，久久不語，背上有寒，當溫之，宜理中丸。

病人脈已解而日暮微煩者，以病新差，人強與穀，脾胃氣尚弱，不能消穀，故令微煩，損穀即愈。

華佗曰：時病差後七日内，酒肉五辛，油麵生，冷醋滑房室，皆斷之，求差。

書生丁季受殺鬼丸方。

虎頭骨 炙丹砂 真珠 雄黃 雌黃 鬼臼 曾青 女青 皂莢 法破桔梗 蕪荑 白芷 芎藭 白朮 鬼箭 鬼督郵 藜蘆 昌蒲 劉寄奴 右壹拾捌味，搗篩蜜和如彈丸，大帶之，男左女右。

劉次卿彈鬼丸方。

雄黃 丹砂 石膏 烏頭 鼠黃 附子

右伍味以正月建除日執厭日亦得擣為散白蠟伍兩銅器中火上消之下藥攪令凝丸如櫻實以赤蠟裹壹丸男左女右肘後帶之

度虛散方

麻黃 附子 白木 細辛

防己 防風 桂心 烏頭

蜀椒 附子 白木 細辛

右伍味以正月建除日執厭日亦得擣為散白蠟伍兩銅器中火上消之下藥攪令凝丸如櫻實以赤蠟裹壹丸男左女右肘後帶之

度虛散方

白木 附子 細辛 指梗 細辛 附子

烏頭 附子 細辛 指梗 細辛 附子

右伍味以正月建除日執厭日亦得擣為散白蠟伍兩銅器中火上消之下藥攪令凝丸如櫻實以赤蠟裹壹丸男左女右肘後帶之

太一流金散方

雄黃 附子 細辛 指梗 細辛 附子

磐石 附子 細辛 指梗 細辛 附子

右伍味以正月建除日執厭日亦得擣為散白蠟伍兩銅器中火上消之下藥攪令凝丸如櫻實以赤蠟裹壹丸男左女右肘後帶之

度虛散方

得此方以求平十二年於北界與虜戰賊績士卒略盡子南

被圍矢下如雨未至子南馬數足矢無遺地遂以為神人乃解圍而去子南以方教子友弟兄然家皆有皆主客務集世秘之漢末青牛道士得之以傳安定皇甫嵩以傳武帝乃稍有人得之故一名冠軍丸一名武氣丸方

螢火

附子 細辛 指梗 細辛 附子

鐵石 附子 細辛 指梗 細辛 附子

右伍味以正月建除日執厭日亦得擣為散白蠟伍兩銅器中火上消之下藥攪令凝丸如櫻實以赤蠟裹壹丸男左女右肘後帶之

小兒

養小兒第一 治法二十九條 方二十首

凡兒在胎一月胎二月胎三月有血脈四月形體成五月能動六月諸骨具七月毛髮生八月藏腑具九月穀入胃十月百神備則生矣生後六十日瞳子成能咳笑應和入百五十日任脈成能自反覆百八十日髓骨成能獨坐二百一十日掌骨成能扶伏三百日臍骨成能立三百六十日膝腹成能行也若不能依期者必有不平之處

兒初生落地口中有血即當去之不去者兒若吞之成瘡病死治兒生落地不作聲法取暖水一盆灌治之須臾即作聲

小兒始生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹中雷鳴先治之然後乃斷臍斷臍當令長至足趺短則中寒令腹中不調當下痢若先斷臍後治之則令臍中水水則發熱

水及中冷則腹絞痛天乳啼呼面目青黑此是中水也過當而灸粉絮以尉之不時治護臍至腫者當隨輕重治之使之乃可至八九十壯輕者臍不大腫但出汁時時啼呼者但將當歸末粉傳之灸粉絮日日灸之至百日乃愈以啼呼止為

候若兒生清冷者水同凡初生斷臍當令長六寸臍大則為難治則臍不

裹臍法

推治帛令柔軟方四寸新綿厚半寸

急則令兒吐明兒生二十日乃解視

衣中有刺者此或臍燥還刺其腹當解之易衣更裹臍

開戶下帳然火左右令帳中溫暖換衣亦然仍以溫粉粉之

此謂冬之時寒也若臍不愈燥綿帛末作灰粉之若過一月臍有汁不愈燥綿帛末治末粉臍中日三四度若臍未愈乳兒太飽令兒風臍也

兒新生不可令衣過厚熱令兒傷皮膚肌肉

凡小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則

見風日若不見風日則令肌膚脆軟便易中傷皆當以故絮衣之勿用新綿也天和暖無風之時令母將兒於日中嬉戲數令見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏在幃帳中重衣溫暖譬猶陰地草不見風日軟脆不堪當風寒也

兒生十日始得哺如晝夜二十日倍之五十日如彈丸大百日如棗大若乳汁少不從此法當用意少少增之若三十日乃哺者令兒無疾兒若早哺之及多者令兒頭面身體喜生瘰癧而復發亦令兒疳弱難食

小兒生滿三十日乃當哺之若早哺之兒不勝穀氣令兒病則多肉耗三十日後哺之勿多若

復成疾病哺乳不進者當以四物紫丸微下之節哺乳數日使自愈也

小兒寒熱亦皆當爾要當下之然後乃差

凡乳母乳兒當先以手極按散其熱勿令乳汁奔出令兒咽輒奪其乳令得氣息已復乳之如是十及五反視兒飽飽即度知一日之中幾乳而足以為常又常捉去宿乳

兒若臥乳母當臂枕之令乳與兒頭平乃乳之如此令兒不噎母欲寐則奪其乳忍填口鼻又不知飢飽也

兒生有胎寒則當腹痛痛者偃啼時時吐乳或腹中如雞子黃者按之如水聲便沒沒已復出此無所苦爾耳早服當歸

圓黃者散即愈中黃散

凡乳兒不欲大飽飽則令吐凡候兒吐者是乳太飽也當以空乳乳之即消夏若不去熱乳令兒嘔逆冬若不去寒乳令

兒致痢母新房以乳兒令兒羸瘦交腰不能行

母患熱以乳兒令兒驚發氣病又令兒上氣癰狂母新吐下

以乳兒令兒虛羸

母醉以乳兒令兒身熱腹滿

凡小兒不能哺乳當服紫丸下之

凡浴小兒湯極頭令冷熱調和冷熱失所令兒驚亦致五藏疾

凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱

凡兒又不當數浴背冷則令發癰若不浴又令兒毛落

小兒生轉死治之法當候視兒口中懸離前上脣上有赤胞者以指擗取決令潰以少綿拭去勿令血入咽入咽殺兒急

急慎之

凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三

變百二十八日四變變且蒸百六十日五變百九十二日六

變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸

二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百二十

日小蒸單後六十四日大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後百

二十八日復大蒸積五百七十六日大小蒸畢

凡蒸者上氣蒸者體熱凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰

先變蒸五日後五日為十日之中熱乃除爾

兒生三十二日一變二十九日先期而熱便治之如法至三

十六七日蒸乃畢爾恐不解了故重說之審計變蒸之日當

其時有熱微驚不得炙刺也得服藥及變且蒸之時不欲驚動勿令傍多人兒變蒸時或早或晚不如法者多兒變蒸時壯熱不欲食食輒止咽苦有寒加之即寒熱交爭腹脹天紅帝不止服之當愈也

凡小兒身熱脈亂汗出者蒸之候也

兒變蒸時目白者重赤黑者微變蒸畢目精明矣

兒上脣頭小白疱起如死魚目珠子者蒸候也初變蒸時有熱者服黑散發汗熱不止服紫丸熱差便止勿復與丸自當

有餘熱變蒸盡乃除爾

兒身壯熱而耳冷體亦冷者即是蒸候慎勿治之兒身熱體

耳亦熱者病也乃須治之

治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後熱不歇及腹中有痰澀嘔乳不進乳則吐咽食積先寒熱方

代諸石 赤石脂各巴豆 杏仁各

右肆味末之巴豆杏仁別擣為膏和更擣二千杵當自相得若硬入少蜜同擣密器中收之三十日兒服如麻子一

圓與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至日中午當小下

熱除若未全除明日更與一丸百日兒服如小豆一丸以

此準量增減夏月多數喜令發疹二十三日輒一服佳此

丸無所不治雖下不虛人

治小兒變蒸中挾時行溫病或非變蒸時而得時行方

麻黃去節杏仁 石膏各 大黃壹分

右叁味擣為散一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令

得汗汗出溫粉粉之勿使見風百日兒服如粟粒大壹之

相兒命長短法

兒生枕骨不成者能言而死

膝骨不成者能倨而死

掌骨不成者能扶伏而死

踵骨不成者能行而死

膕骨不成者能立而死

生身不收者死

魚口者死

股間無生肉者死

頤下破者死

陰不起者死

囊下白者死赤者死

相法甚博略述十數條而已

兒初生額上有旋毛者早貴妨父母

兒初生陰大而與身色同者成人

兒初生汗血者多厄不壽

兒初生目視不正數動者大非佳人

兒初生自開目者不成人

兒初生通身軟弱如無骨者不成人

兒初生髮稀少者強不聽人

兒初生臍小者不壽

兒初生早坐早行早語早齒生皆惡性非佳人

兒初生頭四破者不成人

兒初生頭毛不周匝者不成人

啼聲散不成人

啼聲添不成人

汗不流不成人

小便凝如脂膏不成人

常搖手足者不成人

無此狀候者皆成人也

兒初生臍中無血者好

卵下縫通達而黑者壽

鮮白長大者壽

論曰兒三歲以上十歲以下觀其性氣高下即可知其大壽

大略兒小時識悟通敏過人者多夭則項託顏回之流是也

小兒胃法成就威儀迴轉遲舒稍貴人精神雕瑋者壽其預

知人意迴旋敏速者亦夭則楊脩孔融之流是也由此觀之

大壽大略可知也亦由梅花早發不觀歲寒甘菊晚榮終於

年事是知晚成者壽之兆也

凡小兒之癩有三種有風癩有驚癩有食癩然風癩驚癩時

時有兩十人之中未有一二食癩者凡是先寒後熱發癩

者皆是食癩也驚癩當按圖灸之風癩當與豚心湯下之食

癩當下乃愈紫丸注

凡小兒所以得風者緣衣暖汗出風因而入也風癩者初得

之時先屈指如數乃發作此風癩也驚癩者起於驚怖先啼

乃發作此驚癩也驚癩微者急持之勿復更驚之或自止也

其先不啼乳吐而變熱後發癩此食癩也早下之則差四味

紫丸逐癩飲最良去病速而不虛人亦九差駛病重者當用

之小兒衣甚寒薄則腹中乳食不消其大便皆酸臭此欲為

癩之漸也便將紫丸以微消之服法先從少起常令大便稀

勿使大下也稀後便漸減之矢不酢臭乃止藥驚癩但灸及

摩生膏不可下也驚癩心氣不定下之內虛益令其驚驚癩

甚者特為難治故養小兒常當慎驚勿令聞大聲抱持之閒

當安徐勿令怖也又天雷時須塞其口但作餘小聲以驚之
凡小兒微驚者以長血脈但不欲大驚大驚乃驚脈
小兒有熱不欲哺乳臥不安又數驚此痢之初也服紫丸便
愈不差更服之兒立夏後有痢治之慎勿妄灸不欲吐下但
以除熱湯治之除熱散粉之除熱赤膏摩之又臍中以膏塗
之令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之兒眠時小驚者一
月輒一以紫丸下之減其盛氣令兒不病痢也
小兒氣盛有病但下之必無所損若不時下則將成病固難
治矣

凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾爾若四味紫丸
不時下者當以赤丸下之赤丸不下當更倍之若已下而餘
熱不盡當按方作龍膽湯稍稍服之并摩赤膏

凡小兒冬月下無所畏夏月下難差然有病者不可不下下
後腹中當小脹滿故當節哺乳數日不可妄下又乳哺小兒
常令多少有常制兒漸大當稍稍增之若減少者此腹中已
有小不調也便微服藥停哺但與乳其甚者十許日微者五六
日止哺自當如常若不肯哺而欲乳者此是有病為疾重要
當下之無不差者不下則致寒熱或反吐而發痢或更致下
利此皆病重不早下之所為也為難治但先治其輕時兒不
耗損而病速愈

凡小兒屎黃而臭者此腹中有伏熱宜微將服龍膽湯若白
而酢者此按寒不消也當服紫圓微者少與藥令內消甚有小
增令小下皆須節乳哺數日令胃氣平和不節乳哺則病易
復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再下之尚可過此傷矣
凡小兒有癰其脈大必發癰此為食癰下之便愈當依掌中
與三指脈不可令起而不時下致於發癰則難治也若早下

之此脈終不起也脈在掌中尚可早治若至指則病增也
凡小兒腹中有疾生則身寒熱寒熱則血脈動血脈動則心
不定心不定則易驚驚則驚悸連也

龍膽湯治小兒出腹血脈盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大
吐喘者若能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客入
鬼氣并諸驚癇方悉主之十歲以下小兒皆服之小兒龍膽
湯第一此是出腹嬰兒方若日月長大者以次依此為例若
必知客忤及疳氣者可加人參當歸各如龍膽多少也二百
日兒加半分二百日加一分一歲兒加半兩餘藥皆準兩

龍膽 鈞藤 柴胡 黃芩 桔梗

芍藥 茯苓 甘草 蛇蛻 蜈蚣 大黃 蜜酒

右壹拾味以水貳升煮取五合為一劑也取之如後
節度藥有虛實虛藥宜足數合水也兒生一日至七日分

一合為三服兒生八日至十五日分一合半為三服兒生
十六日至二十日分二合為三服兒生二十日至三十日
分三合為三服兒生三十日至四十日盡以五合為三服
十歲亦準此皆準下即止勿復服也

治少小腹痛熱除熱丹參赤膏方

丹參 雷丸 芒消 戎鹽 大黃 各壹兩

右伍味切以苦酒半升浸四種一宿以成鍊猪脂一斤煎
三上三下去滓內芒消膏成以摩心下冬夏可用一方但

丹參雷丸

治少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中大風
手足驚掣五物甘草生麻膏方

甘草 炙 防風 白木 蠶絲 雷丸 桂枝 各壹兩

右伍味切以不中水猪脂壹斤微火煎為膏去滓取彈丸

過二七壯并勤服此藥若喜失子者產訖兒墮落地聲未
便即以手指刮舌上當得所銜血如非藥者便以藥二
丸如粟米大服之作七日乃止無不痊也若無赤頭蜈蚣
赤足者亦得三枚皆斷取前兩節其後分不可用也

小兒雜治第二 計五十一首

主五六歲兒溫壯腹中急滿氣息不利或有微腫亦
主極重不下飲食手足逆冷方

竹葉 小麥 半升 甘草 炙 黃芩 桔梗根
澤瀉 知母 人參 茯苓 白朮

大黃 兩 生薑 兩 麥門冬 兩 桂心 兩

右壹拾陸味以水柒升煮取四升去滓內諸
藥煮取一升六分分四服

治小兒連壯熱實滿不去寒熱往來微驚方

大黃 黃芩 兩 枳椇根 分 甘草 炙 牡蠣 熬
人參 兩 桂心 兩 龍骨 凝水石 白石脂 兩

右壹拾貳味以水柒升煮取四升去滓內諸
藥煮取一升六分分四服

治小兒寒熱致逆膈中有積乳若吐不欲食方

乾地黃 兩 麥門冬 兩 五味子 兩 大黃 兩

右陸味以水三升煮取一升去滓內消石蜜更煮令
沸服二合日三宵中當有宿乳一升許出兒大者服五合

射干 兩 麻黃 兩 紫苑 兩 甘草 兩 桂心 兩

半夏 兩 枝洗去

生薑 兩 大棗 兩

右捌味以水柒升煮取一升半去滓內蜜半斤更煮
一沸飲三合日三服

又方

半夏 兩 桂心 兩 生薑 兩 紫苑 兩 細辛 兩

右玖味以水一斗煮半夏取六升去滓內諸藥更煮
取壹升伍合伍歲兒飲一升貳歲兒服六合量小加減之

治小兒欬逆短氣胃中吸吸呵出涕唾數出臭膿亦治大人
燒後竹瀝煮二十沸小兒一服一合日五服大人服一
亦日五服不妨食息乳哺

杏仁 兩 小兒大人欬逆上氣方

右一味熬搗如膏蜜一升為三分以一分內杏仁搗令強
更內一分搗之如膏又內一分搗熟止先食已含之咽汁
多少自在量之

治小兒火灼瘡一身皆有如麻子小豆藪膿生痛痒癢方

甘草 生用 芍藥 白飲 黃芩 各五分

右六味搗篩以白蜜和塗上日再亦可作湯浴之

治小兒火瘡方

又方 以蜜塗之日十遍

苦參 兩 大黃 兩 蛇牀子 兩 芍藥 兩 黃芩 兩

右捌味切以水參斗煮取壹斗半洗之日三度大良

又方

大黃 黃芩 黃蘗 澤蘭 礬石

石南 附子 戎鹽 蛇牀子 桑白皮

右捌味切以水參斗煮取三升以絮內湯中洗之

又方

熬散令黃末之以傳瘡不過三度愈

治二百日小兒頭面瘡起身體大熱方

黃芩 參 分 外麻 當歸 柴胡 石膏 甘草

又方

治小兒身體頭面瘡生瘡方

取榆白皮灼令燥下篩散和塗綿覆上蟲出自差

治小兒手足身體腫方

以小便溫煖漬之良

又方并治瘰癧

巴豆 五 治瘰癧

右壹味以水三升煮取一升以綿內湯中拭病上隨手滅

神良

治小兒風瘡癰瘡方

朝糧 壹兩 防風 壹兩 羊桃根 壹兩 石南 壹兩 茵芋 壹兩

荒蔚 壹兩 礬石 壹兩 葵藜 壹兩

右捌味切以酢漿水壹斗煮取伍升去滓內礬石煎令小

沸溫浴之

治小兒丹數十種皆主之

大黃 壹兩 甘草 壹兩 當歸 壹兩 苦參 壹兩 白芷 壹兩

獨活 壹兩 黃芩 壹兩 芍藥 壹兩 外麻 壹兩 沈香 壹兩

青木香 壹兩 芒消 壹兩 大蘭皮 壹兩

右壹拾參味切以水壹斗貳升煮取四升去滓內芒消令

煖以綿搗湯中適寒溫搗之乾則易取差止

治小兒丹發方

生慎火草擣絞取汁以拭丹上日十遍夜三四

棗根 升麻 白敏 黃蘗 黃連

大黃 枳子 甘草 生用 各 生地黃汁 壹升

右玖味切以水壹斗肆升煮取柒升去滓內地黃汁煎三

沸以故帛兩重內湯中以搗丹上小煖即易常令溫

治小兒丹入腹殺兒方

澤蘭 芎藭 附子 薤草 藜蘆

細辛 茵芋 各半

右柒味切以水參升煮取壹升半分四服服此湯然後

作餘湯洗之

治小兒半身皆紅赤漸漸長引者方

牛膝 甘草 生用

右貳味細剉各得伍升以水貳斗煮取參伍沸去滓和麴

下黃土塗之

治小兒頭髮不生方

取楸葉中心擣絞取汁塗之生

治小兒皮膚無髮苦痒方

野葛 壹兩 猪脂 羊脂 略壹

治小兒禿瘡方

取雄雞矢陳醬清和洗瘡。傳之三兩遍差。

治小兒白禿方

取荒花末臘月豬脂肪和如泥。先以灰汁洗拭塗之。日一遍。

治小兒頭瘡方

胡粉壹兩黃連貳兩

右貳味搗為末。洗瘡去垢。拭乾。傳之即愈。後即如前再傳。亦治陰瘡。

又方

胡粉貳兩水銀壹兩白松脂貳兩豬脂肪肆兩

右肆味合煎去滓。內水銀胡粉攪令勻。調塗之。大人亦同。

治小兒頭無髮方

燒鮑魚作末。醬汁和傳之。即生。

治小兒顫開不合方

防風貳兩白及半兩柏子仁半兩

右叁味搗為散。乳汁和。以塗顫上。日一度。十日知。二十日合。

治小兒臍瘡方

燒餅帶灰傳之。愈。

治小兒臍塞不通有滲出方

杏仁半兩去椒壹分附子壹分細辛壹分

右肆味切以酢。伍大豆漬一宿。明日以豬脂五兩煎之。附子

色黃膏成去滓。以塗臍導於臍中。日再又摩顫上。

治小兒口瘡不能取乳方

大青叁分黃連貳兩

右貳味咬咀。以水貳升。煮取一升二合。一服。合日再夜一。

又方

取礬石如雞子大。置酢中研塗兒足下。三七遍立愈。

治小兒重舌方

取三層家肉各如指許大。切摩舌。兒立能乳便啼。

又方

衣魚燒作灰。以傳舌上。

又方

重舌舌強不能收唾者。取鹿角末如大豆許。安舌上。日三即差。

又方

取蛇皮燒灰末。和大酢。以雞毛取之。以掠舌上。日三遍。

治小兒重舌舌生瘡涎出方。

以蒲黃傳舌上。不過三度愈。

又方 取田中蜂房燒之。以淳酒和。傳喉咽下。立愈。

治小兒咽痛不得息。若毒氣哽咽及毒攻咽喉方。

生薑貳兩橘皮壹兩外麻貳兩射干貳兩

右肆味咬咀。以水陸升。煮取貳升。分為三服。亦治大人。

治小兒喉痺咽腫方。

以魚膽二七枚和竈底黃土。以塗咽喉。立差。

治小兒數歲不行方。

取雀矢如麻子大九之。飲服即愈。大良。雞矢白亦良。

葬家未閉戶時盜取其飯以哺之。不過三日即行。勿令人

知之。

治小兒食土方

取肉壹斤

右壹味以繩繫肉曳地行數里。勿洗。炙炙噉之。不食土矣。

治小兒遺尿方

瞿麥 龍膽 石韋 皂莢 桂心 各半

人參 壹兩 雞腸草 兩 車前子 伍分

右捌味末之。鍊蜜和。先食服。如小豆五圓。日三。加至六七丸。

治小兒羸瘦有蛇蟲方

崔蘆 伍兩 黍米汁 貳升

右貳味切以內汁中。以水三升。五合。煮堅一升。五歲兒服。

五合。日三服。兒大者服一升。

治小兒三蟲方

雷丸 苦蘆

右貳味等分。為散服。一錢。日三服。

治小兒陰瘡膿水出方

黃狼牙汁洗之愈

治小兒氣癩方

土瓜根 壹兩 芍藥 壹兩 當歸 壹兩

右叁味。咀咀。以水貳升。煮取一升。服五合。日二服。

治小兒狐疝傷損生癩方

桂心 叁分 地膚子 貳兩 白朮 伍分

右叁味末之。鍊蜜和。白酒服。如小豆七丸。日三服。亦治大人。

又方

芍藥 叁分 茯苓 叁分 大黃 半兩 防葵 半兩

半夏 貳分 桂心 壹分 椒 壹分 乾薑 壹分

右捌味末之。鍊蜜和。如大豆。每服一丸。日五服。可加至三。

九千金無

治小兒核腫壯熱有實方

甘遂 叁分 麝香 壹錢 大黃 兩 胡 各壹

黃芩 半兩 甘草 半兩 青木香 叁分 石膏 貳分

千金翼方 卷十一 小兒

右捌味。咀咀。以水柒升。煮取壹升。致合。服三合。日四夜一服。

治小兒誤吞針方

吞礪石如棗核大針立下。

論曰。文王父母有胎教之法。此聖人之道。未及中。庸。是以中。

庸。養子十歲以下。依禮小學。而不得苦。精功。程必令兒失心。

驚懼。及不得苦。行。禁。罰。亦令兒得癡。癡。此。事。大。可。傷。恒。但。不。

得。大。散。大。漫。令。其。志。蕩。亦。不。得。稱。讚。聰。明。尤。不。得。誅。毀。小。兒。

十一以上。得漸加嚴教。此養子之大經也。不依此法。令兒損。

傷。父母之殺兒也。不得怨天尤人。

眼病第三合一百三十三節

主目瞤覆瞳睛不見物方

上光明朱砂 半兩 貝子 伍枚 炭火

乾薑 末半

右肆味。研之。如粉。以熟帛三篩。為散。仰臥。遣人以小指爪。

挑。少許。付眼中。差亦主白膚瞤。

主目瞤經年不愈方

琥珀 壹分 白真珠 壹分 珊瑚 壹分 紫貝 壹分 馬珂 壹分

朱砂 貳分 麝香 半兩 決明子 壹分 石膽 壹分

右玖味。下篩。極細。付目中。如小豆。日三。大昆。

主目瞤及努肉方

礪石 上上白者。末內如黍米。大於瞤上及努肉上。即令淚。

出。以綿拭之。令得惡汁盡。日。其病遂惡。汁出盡。日。漸。

自薄。便差。好上上礪石。無過綠礪。色明淨者。慎如療眼當。

法也

去瞤方

貝子 拾枚 燒末

右壹味搗篩取如胡豆著腎上日再正仰臥令人傳之如炊一石米久乃拭之息肉者加珍珠如貝子等分研如粉治眼漠漠無所見決明洗眼方

決明子宣州者佳拾伍分 麤仁 秦皮

黃連宣州者佳拾伍分 螢火蟲桑枝

右伍味以水捌合微火煎取叁合冷以綿注洗目日叁度治五藏客熱上熏一作眼外受風寒令眼病不明方

地膚子半兩 柏子仁壹分 大黃貳兩 決明子伍分

藍子 瓜子仁 麤仁 羌蔚子 青柏子

蕤荊子各貳分 芡絲子壹分 黃連壹兩半

細辛伍分 桂心壹分 螢火蟲壹分

右壹拾伍味搗篩煉蜜和瓦梧子每服拾伍丸食後日叁服治肝膈上大熱目暗不明方

升麻 大青 黃蘗各壹兩 射干

生玄參肆兩 薔薇根白皮 蜜壹升

右柒味咬咀以水柒升煮取壹升半去滓下蜜兩沸細細含咽之

治眼暮無所見方

豬肝壹具

右細切以水壹斗煮取熟置小口器中及熟以目臨上大

開勿閉也冷復溫之取差為度

治熱病差後百日內食五辛目暗方

以鯽魚作臠熏之如前法良

兔肝散主失明方

兔肝炙 石膽 貝齒 芒硝

麤仁 黃連 礬石燒 松葉

螢火 菊花 地膚子 決明子各壹分

右壹十貳味食後為散服半錢匕不知稍加服藥不可廢若三日停則與不服等愈後仍可常服之

治風痰實滿眼赤闇方

決明子 竹葉千金 杏仁去皮尖 防風 黃芩

枳實各壹分 澤瀉各壹兩 芍藥 柴胡去苗

梔子仁各壹分 細辛 芒硝各壹兩

右壹拾貳味咬咀以水玖升煮取貳升半去滓分叁服

眼暗方

蔓菁子壹斗

右壹味淨淘以水肆斗煮自旦至午去汁易水又煮至晚去汁易水又煮至旦暴乾以布袋貯之一度搗三升以粥

汁服三方寸匕日叁服美酒等任性所便

補肝湯主肝氣不足方

甘草多 黃芩 人參 桂心各壹兩

右肆味咬咀以水陸升煮取貳升去滓分叁服

為肝主臟中痰實熱衝眼漠漠闇方

苦竹根兩半 乾薑 茯苓 枳實

白朮各壹兩 杏仁各壹兩 乾地黃各壹兩 細辛 甘草各壹兩

右壹拾貳味咬咀以水壹斗煮取貳升去滓分叁服

治眼主漠漠無所見或時痛赤腹有痰飲令人眼闇方

大黃 白朮各壹兩 甘草多 芍藥

當歸 茯苓 桂心 人參

黃芩 細辛各壹兩 生薑切 半夏洗 兩

右壹拾貳味咬咀以水壹斗煮取叁升分肆服

補肝氣不足而脅拘急痛寒熱目不明并婦人心痛
肝氣不足而脅拘急痛寒熱目不明并婦人心痛

甘草^{參兩} 柏子仁^兩 防風^{參兩} 大棗^{參兩} 烏頭^兩

細辛^兩 茯苓^兩 桂心^兩 黃連^兩

右取味咬咀以水捌升煮取三升分爲三服

燕青子主明目病益肌膚方

燕青子^{參升}

右壹味淘高著水煮二十沸出著水盆中淘之令水清接

取以別釜煮之水盡即添益時宜香香味美漚出暴乾擣篩

酒飲等任意和服三方寸匕日惟服七合飽食任性酒服

服無限時慎生冷百日身熱瘡出不久自差

治青盲方

長尾蝦淨洗暴乾作末內眼中差

主服風虛勞熱暗運內起方

石決明^兩 石膽^兩 光明砂^兩 芒消^兩 空青^兩

黃連^兩 青柏子^兩 明子^兩 以苦酒洗乾 藥仁

右壹拾貳味等分擣蜜餠篩石研令極細以魚膽和圓如

梧子暴乾研碎銅器貯之勿洩每取黃米粒大內背中日

一夜稍稍加以知爲度

主明目方

地膚子^兩 藍子^兩 薤白^兩 細辛^兩 伍合 桂心^{伍分}

車前子^兩 薤白^兩 瓜子^兩 螢火蟲^兩 黃連^兩

右壹拾肆味擣篩蜜和飲服如梧子十五丸可加至二

十九丸熱麪食生冷酢滑油蒜猪雞魚蒜麪黃米眼暗神

方也

治目赤痛方

雄黃^{壹兩} 細辛^{壹兩} 乾薑^{壹兩} 黃連^{壹兩}

右肆味細篩綿裹以唾濡頭注藥內大背必閉目中淚

出頭更自止勿手近勿用冷水洗

又方

雄黃^{壹分} 乾薑^{壹分} 黃連^{壹分} 礬石^{壹分}

治目赤口乾唇裂方

石膏^兩 生地黃汁^兩 赤蜜^{壹升} 淡竹葉^切

右肆味以水壹斗二升煮竹葉取柒升去滓澄清煮石膏

取壹升半去滓下地黃汁兩沸下蜜取三升細細服之

治赤眼方

取杏仁肆拾玖顆末之絹袋裏飯底蒸之熟絞取脂以銅

青胡粉各如大豆乾薑鹽各如半大斤熟研之以雞毛沾

取掠眼中皆頭目二不過三差

赤眼方

杏仁脂^{壹合} 鹽綠^{壹合} 印成鹽^{三顆}

右叁味取杏仁脂法先擣杏仁如脂布袋盛之熟絞取脂

置蜜器中內諸藥直坐著其中密蓋二七日夜間注目四

皆不過七度差止

治赤眼不閉久遠方

右壹味以酢漿烝中浸日中暴之三三三三三三三三三

者取如粟米大夜著兩皆頭不過三四度差并石鹽石

膽等尤佳

治眼赤運白膜醫方

麻燭一尺薄批猪脂裹使燃燭以銅器承取脂內凝仁
參拾枚研胡粉少許合和令熟夜內兩管中
又方 拘把汁洗目日五度良效用亦得

治赤眼方

石膽 凝仁 鹽綠 細辛 各生鹽脂膏合
右伍味為末以乳汁和夜點兩管

治眼目不明方

推羊鹿筋掌之如披筋法內筋口中熟嚼掌眼內著腫子
臉上以手當臉上輕按之若有眵者二七過按便出之視
眵當著筋出來即上未出者復為之此法常以平日旦日未
出時為之以差為度出時當以好蜜注四眵頭鯉魚膽亦
佳若數按目痛可間日按之

鼻病第四論八首

治鼻不利香膏方

當歸 黃草 方用水 通草 細辛
凝仁 各參 芍藥 白芷 各半 羊脂 兩

右捌味切合煎微火上三上三下以白芷為膏成去滓
取如小豆大內鼻中目三大熱鼻中赤爛者以黃各梔子

代當歸細辛

治鼻中室塞香膏方

白芷 芍藥 通草 黃草 當歸 細辛
黃草 各參 芍藥 辛夷仁 伍分

右柒味切以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上三
下以白芷色黃膏成去滓綿裹取梔子大內鼻中日三

加桂

治鼻翳方

通草 各分 細辛 各分 附子 各分
右叁味下篩蜜和綿裹內鼻中良

治鼻中息肉通草散方

通草 半兩 鑿石 兩 真珠 壹錢
右叁味下篩蜜和綿裹取藥如小豆內綿頭入鼻中日
三度細辛各壹兩

治鼻中息肉不得息方

鑿石 兩 藜蘆 兩 瓜蒂 貳条 附子 兩
右肆味各擣下篩合和以小竹管取藥如小豆大內鼻孔
中吹之以綿絮塞鼻中日再以愈為度

治鼻中息肉塞鼻不得喘息方

取細辛以口濕之使頭內鼻中傍內四畔多著日十易之
滿二十日外以葦蘆子壹兩於羅半兩二味擣篩以綿裹

薄如棗核大內鼻中日五六易之滿二十日外以吳白藜
上上者貳兩內瓦杯裏相合令密置密中燒之待熟取

擣篩以面脂和如棗核大內鼻中日五六易之更和不得
頻犯二十日外乃差慎行作勞及熱食并蒜薤百日

治鼻有息肉不聞香臭方

瓜蒂 細辛 各半
右貳味為散絮裹上大塞鼻中須臾即通

羊脂 一兩 白木 兩 荻容 兩 通草 兩
乾薑 兩 芍藥 兩

右陸味為散食後以粥汁服伍分日貳服加至方寸匕
論曰凡人往往有鼻中肉塞眠食皆不決利得鼻中出息而

俗方亦眾而用之皆無成效惟見本草云雄黃主瘡中惡肉此言不虛但時人不知用雄黃之法醫者生用故致有誤實有一人患鼻不得喘息余以成鍊雄黃日內一大匙許大過十日肉塞自出當時即得喘息更不重發其鍊雄黃法在仙丹方中具之宜尋求也斯有神驗。

口病第五篇

凡口瘡忌食鹹膩及熱乾薑等宜純食甜粥勿食鹽菜三日即愈

凡口中面上生惡肉瘡大以刀決去腐肉

治積年口瘡不差薑微湯方

右壹味以水柒升煮取三升去滓含之久久極即吐之定更含少少入咽亦佳夜未睡已前亦含之三日不差更令含之差為度驗秘不傳也

治口中瘡身熱有熱氣瘰癧薑微丸方

- 薑微根 壹兩 黃芩 壹兩 鼠李根 壹兩 當歸 壹兩
- 芎藭 壹兩 白斂 壹兩 枯樓根 貳兩 石龍芮 壹兩
- 黃蘗 壹兩 黃耆 壹兩 芍藥 壹兩 續斷 壹兩
- 黃連 壹兩

右壹拾叁味末之鍊蜜和服如梧子拾圓日三服

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸 壹兩 射干 壹兩 升麻 壹兩 附子 壹兩 白蜜 肆兩

右伍味切以猪膏肆兩先煎之令成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色黃藥成絞去滓內蜜復火上令相得盛器中令凝取如杏子大含之日四五輒咽之差治口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

猪膏 壹斤 白蜜 壹斤 黃連 壹兩

右叁味合煎去滓令相得含如半棗日四五夜二

治口吻生白瘡名曰驚口方

取新炊飯下飯訖以口兩吻銜飯脰乘熱往兩口吻二七下差

口傍惡瘡方

亂髮灰 故絮灰 黃連末 乾薑末

右肆味合和為散以粉瘡上不過三度

治口臭方

濃煮細辛含汁久乃吐却三日當愈

又方 井華水三升漱口吐廁中

又方 橘皮 伍分 木蘭皮 貳分 桂心 壹分 大棗 四枚 去核

右肆味末之以棗肉九如梧子服貳拾圓日貳服稍稍至三十九丸十八日愈

又方 桂心 甘草 炙等

右貳味細末三指撮酒服二十日愈

又方 蜀椒 汁 桂心 各壹

右貳味服如煎方

治口乾方

猪脂若羊脂如雞子大擘之苦酒半升中漬一宿絞取汁含之

又方 石膏 五合 碎蜜 貳升

右貳味以水參升煮石膏取貳升內蜜煮取壹升去滓含如粟核大咽汁盡即含之

又方 含一片梨即愈夜睡當時即定

又方

羊脂燻子 酒半升 大棗紫葢

右參味合漬七日取棗食之差

又方 禁夜勿食酸食及熱麪

治口卒緊不開方 搗附子末內管中開口吹口中是

唇病第六方以首

緊齋方

以亂髮蜂房及六畜毛燒作末傳齋上猪脂和亦佳

又方

緊卷故青布燒令然并上柱取并上熱汁塗之并治滿唇治唇黑腫痛痒不可忍方

取四文大錢於磨石上以臘月猪脂磨取汁塗之不過數遍即愈

又方 以竹弓彈之出其惡血立差

齒病第七方以首

合散湯主齒痛方

獨活參兩 黃芩參兩 苦參參兩 當歸參兩

細辛 畢撥各壹 丁香壹兩

右柒味咬咀水五升煮取貳升半含漱之食頃乃吐更含之一方有甘

又方 含白馬尿隨左右含之不過三日止

治裂齒痛方

腐蝕針二百枚

右壹味以水貳升煮取一升含漱之日四五差止

又方 取死曲蟾未傳痛處即止

治齒痛方

夜向北斗手拓地及指頭地呪曰蝸蟲所作斷木求風蟲所作多便休疼痛疼痛北斗收即差

又方

人定後向北斗呪曰北斗七星三入口尚書某甲患斷若是風斷閉門方若是蟲斷盡收取急急如律令再拜三夜作治牙疼方

蒼耳子伍升

右壹味以水壹斗煮取伍升熱含之疼則吐吐復含不過二劑愈無子莖葉皆得用之

又方

莽草伍兩

右壹味切以水壹斗煮水伍升含漱之一日令盡

又方

內藜蘆末於牙孔中勿咽汁神良

又方

取門上桃柳燒取滿汁少少內孔中以藥固之

針牙疼方

隨左右邊疼手大指次指掌間入一寸得氣絕補三九息

針牙疼方

取桑東南引枝長一尺餘大如匙柄齊兩頭口中拄著痛牙上以三姓火灸之呪曰南方赤帝子教我治蟲齒三姓炎氣條條斷蠲蟲死急急如律令大效

治蟲食齒痛方

閉氣細書曰南方赤頭蟲飛來入某姓名裂齒裏令得蠲

蟲孔安置耐居止急急如律令小紙紙內著星柱北邊蠅
蟲孔中取水一盃禹步如禁法還誦上文以水沃孔以淨
黃土泥之勿令洩氣求愈

治蟲食齒根肉黑方

燒腐棘取滿塗之十遍雄黃末傅即愈若齒黑者以松木
灰指之細末雄黃塗斷百日日再塗之七日慎勿食肉神效

治齒蟲方

以擔一枚令病人存坐橫擔於膝上引兩手尋使極住手
伸中指灸中指頭擔上三壯兩頭一時下少病人口誦呪
曰嗽牙蟲名字鵬莫嗽牙莫嗽骨灸人亦念之

齒根腫方

松葉壹握

鹽壹合

好酒叁升

右叁味煎取一升含之

齒根動痛方

生地黃叁兩

獨活叁兩

右貳味切以酒漬一宿含之

又方 常以白鹽末封齒斷上日三夜二。

又方 扣齒三百下日一夜二即終身不發至老不病齒

治齒牙根搖欲落方

生地黃大者一寸綿裹著牙上嚼咽汁汁盡去之日二

即愈可十日含之更不發也

治齒根空腫痛困弊無聊積方

獨活肆兩

酒叁升

右貳味於器中漬之燂火燂之令燂稍稍沸得半去滓熱
含之不過四五度

又方

取地黃如指大長一寸火炙令大熱著木椎之以綿裹著
齒上嚼之咽汁盡即三易差止

又方 燒松栢根枝令熟柱病齒孔須臾蟲緣枝出

治牙斷疼痛方

杏仁壹兩

鹽末方寸

右貳味以水壹升煮令沫出含之味盡吐却更含不過再
二差

治牙車急口眼相引舌不轉方

牡蠣熬

伏龍肝

附子炮去

礬石燒

右肆味等分末之以白酒和為泥傅其上乾則冷之取差止

治齒齲方

切白馬懸蹄可孔塞之不過三度

治齒血出不止方

刮生竹茹貳兩酢漬之令其人解衣坐乃別令一人含嚙
其背上三過并取竹茹濃煮取汁勿與鹽適寒溫含漱之

終日為度

治失欠頰車脫臼開張不合方

以一人捉頭者兩手指牽其頰以漸推之令復入口中安

竹筒如指許大不爾嚙傷人指

舌病方

治舌卒腫如吹胞滿口溢出氣息不得通須臾不治殺人方

急以指刮破漬去汁即愈亦可以鉞刀於前決破之下血不痛

又方

以苦酒壹升煮半夏二十枚令得八合稍稍含嗽吐之半

夏戟人咽須熟洗去滑盡用之勿咽汁也加生薑一兩佳

治舌上黑有數孔出血如涌泉此心藏病也方

戎鹽 伍兩 黃蘗 伍兩 大黃 伍兩 人參 壹兩

桂心 貳兩 甘草 壹兩

右采味末之。鍊蜜和圓。飲服拾圓如梧子。日三服。仍燒鐵烙之。

治舌卒腫起如吹胞狀。滿口塞。喉氣息。欲不復。更不治。殺人治之方。

以刀鋒決兩邊第一大脉。出血勿使刺著舌下中央脉。血出不止。殺人。血出數升。以燒鐵令赤。對金瘡數過。以絕血也。

又方 含甘草汁佳

喉病第九方十四首

治喉卒腫不下食方

韭一把。搗熬傳之。冷即易之。佳

又方 含荊瀝稍稍咽之

又方 含上好酢。只舌著亦佳

治喉痺嚥不得方

半夏

右管味細破。如棊子。拾肆枚。雞子一枚。扣其頭。如粟大。出却黃白。內半夏於中。內酢令滿。極微火上煎之。取半。小冷飲之。即愈。

喉痺方

取附子壹枚。去皮蜜塗火炙令乾。復塗蜜炙。須臾食之。咽

汁愈

又方 含蜀升麻壹片。立愈

治喉痺方

以繩纏手。大指刺出血。一大豆以上。差小指亦佳。

治馬喉痺方

燒馬蘭根灰一方寸匕。燒桑枝灑汁和服。

治咽痛不得息。若毒氣咽。咽毒攻咽。喉方

桂心 半兩 杏仁 貳兩 去尖

右貳味為散。以綿裹如棊大。含咽其汁。

又方 刺小指爪文中出血。即差。左右刺出血。神祕立愈。

治尸咽語聲不出方

酒壹升 乾薑 拾兩 酥壹升

右采味酒二合。煎一匙。薑末一匕。和服之。日三。食後服之。亦治肺病。

治尸咽中癢痛吐之不出。咽之不入。如中蠱毒方

含生薑五十日差。

治咽中腫垂肉不得食方

先以竹筒內口中。熱燒鐵從竹中柱之。不過數度。愈。

治懸癰垂下暴腫長方

乾薑半夏等分。末少著舌。本半夏洗之。如法用。

又方 鹽末筋頭張口柱之。日五自縮。

又方 壹病第十方二首

酥蜜生薑汁合一升。微火煎二沸。每服兩葉許。內酒溫服。以手巾布裹春。梓頭類拭齒。

耳病第十一方二十四首

治耳聾方

生地黃 伍兩 大者 杏仁 柒枚 燒

巴豆 柒枚 紫皮 頭髮 雞子大

右伍味搗作末。以髮薄裹內耳中。一日一夜。若少損。即却之。直以髮塞耳。耳中黃水及膿出。漸漸有效。不得更著。若未損。一宿後更內。一日一夜。還去藥。一依前法。

印成鹽 兩顆

治勞聲氣聲嘶聲嘶聲嘶聲嘶如此久聾耳中作聲補腎治五
聾方

山茱萸貳兩 乾薑 巴戟天 芍藥

澤瀉 桂心 菟絲子 黃耆

乾地黄 遠志去心 蛇牀子 茯苓

石斛 當歸 細辛 茯苓

牡丹皮 人參 甘草炙 附子炮去皮

防風續斷 昌蒲壹兩 羊腎貳枚

右貳拾叁味搗篩鍊蜜和為圓如梧子大服十五丸日三
加至三十四丸

又方

草麻伍分 杏仁壹兩去 桃仁肆分去 巴豆仁壹分去

石鹽叁分 附子炮 昌蒲壹兩 礞石壹兩

黃陸香壹分 松脂貳兩 蠟貳兩 通草半兩

右壹拾貳味先搗諸石等令細別搗諸物等加松脂及蠟
合搗數千杵令可丸乃止取如棗核大綿裹塞耳一日四

五度出之轉捻不過三四度日一易之

又湯方

礞石肆兩 牡荊子貳兩 石昌蒲叁兩

山茱萸貳兩 芎藭貳兩 茯苓貳兩 白芷貳兩

枳實貳兩 地骨皮叁兩 天門冬叁兩 甘草炙

橘皮貳兩 生薑貳兩 竹瀝貳升

右壹拾肆味咬咀以水捌升煮取貳半下竹瀝煮取貳升
半分為三服五日服一劑三劑後著散

又散方

石昌蒲貳兩 山茱萸貳兩 礞石肆兩 土瓜根貳兩

白斂貳兩 牡丹皮貳兩 牛膝貳兩

右柒味搗篩為散綿裹塞耳日一易仍服大三五七散劑

又方

硫黃 雌黃雄黃

右貳味等分末之綿裹塞耳數日聞聲

又方 以童子尿灌耳中三四度差

赤膏主耳聾齒痛方

丹參伍兩 蜀椒貳升 大黃壹兩 白朮壹兩

大附子貳枚 細辛壹兩 乾薑貳兩 巴豆拾枚

桂心肆分 芎藭壹兩

右壹拾味切以淳苦酒漬一宿內成煎諸膏三斤著火上
煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者綿裹膏內耳中

齒冷痛者齒間諸痛皆摩若腹中有病以酒和服如棗計

大咽喉痛吞如棗核一枚

治二十年聾方

成煎雞肪伍兩 桂心 野葛各半

右叁味切膏中銅器內微火煎三沸去滓密貯勿洩以韋

筒盛如棗核大炙令少熱仰傾耳灌之如此十日即聞

自出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裏膏深塞勿

使洩氣五日乃出之

又方 以器盛石鹽飯底蒸令消以灌耳中驗

治耳出膿汁方

礞石貳兩 龍骨壹兩 黃連壹兩 烏賊魚骨壹兩

右肆味下篩取如棗核大綿裹塞耳日三易方用亦石

治底耳方

礞石燒之 石鹽末之

右貳味先以紙繩維之展却汁令乾以鹽末粉耳中令通
次下礬石末粉上須臾卧勿起日再

治耳疼痛方

附子炮去 莖痛

右貳味等分裹塞之

治蟲入耳方

末蜀椒一撮內半升酢中灌之行二十步蟲出差

治百蟲入耳方

擣韭汁灌之耳中立出

又方 灌葱涕須臾蟲出差

又方 以木葉裹鹽炙令熟以掩耳冷即易之出

又方

薑汁滴耳中 又灌牛乳良 又挑葉塞耳

治蚰蜒入耳方

牛乳灌之蚰蜒自出若入腹者空腹服酢酪一升不出更

服仍以和麴燒餅乘熱坐須臾出

又方 以油灌之

又方 灌驢乳於耳中即變成水入腹飲之即差

又方 桃葉汁灌之

又方 打銅碗於耳邊

又方 炒胡麻以布袋盛枕頭

千金翼方卷第十二

養性

養性禁忌第一

論曰張湛稱養性篇寫經方在於代者甚衆結叔夜論之最精然辭旨遠不近余之所言在其義與事歸實錄以貽後代不違情性之歡而情性可從不棄耳目之好而顧盼可行使旨約而情性少而所以養性則易知簡則易從故其大要一曰養性二曰愛氣三曰養神四曰導引五曰言論六曰飲食七曰房室八曰及俗九曰醫藥十曰禁忌過此已往未之或知也

列子曰一體之盈虛消息皆通於天地應於物類故陰氣壯則夢涉大水而恐陽氣壯則夢涉大火而燔燭陰陽俱壯則夢生殺其飽則夢與甚飢則夢取是以浮虛為疾者則夢揚沈實為疾者則夢溺藉帶而寢者則夢蛇飛鳥銜屨者則夢飛心躁者夢火將病者夢飲酒歌舞將衰者夢哭是以和之於始治之於終靜神滅想此養生之道備也

彭祖曰每施寫訖輒導引以補其虛不爾血脈凝滯日損犯之者生疾病俗人不知補寫之義故也飲酒吐逆勞作汗出以當風則濕飽食大呼疾走舉重走馬引強語笑無度思慮太深皆損年壽是以為道者務思和理焉口目亂心聖人所以閉之名利敗身聖人所以去之故天老曰丈夫處其厚不處其薄當去禮去聖守愚以自養斯乃德之源也

彭祖曰上士別牀中士異被服藥百裏不如獨卧色使目盲聲使耳聾味使口爽苟能節宣其且通抑揚其通塞者可以增壽一日之忌者暮無飽食一月之忌者暮無大醉一歲之忌者暮須遠內終身之忌者暮常護氣夜飽損一日之壽夜

醉損一月之壽一接損一歲之壽慎清旦初以左右手摩交耳從頭上挽兩耳又引髮則面氣流通如此者令人頭不白耳不聾又摩掌令熱以摩面從上向下二七過去野氣令人面有光又令人勝風寒時氣寒熱頭痛百疾皆除真人曰欲求長生壽考服諸神藥者當須先斷房室肅清沐浴熏香不得至喪孝家及產乳處慎之慎之古之學道者所以山居者良以此也

老子曰人欲求道勿起五逆六不祥凶大小便向西一逆向北二逆向日三逆向月四逆仰視日月星辰五逆夜半裸形一不祥旦起腹心二不祥向竈罵詈三不祥以足內火四不祥夫妻晝合五不祥盜師父物六不祥旦起當言善事天與之福勿言奈何及禍事名謂禍慎勿將上仰卧大凶卧伏地大凶飽食伏地大凶以肥筋擊盤大凶太勞行房室露卧發

癩病醉勿食熱食畢摩腹能除百病熱食傷胃冷食傷肺熱無灼骨冷無水齒食畢行步踟躕則長生食勿大言大飽血脈閉卧欲得數轉側冬溫夏涼慎勿冒之大醉神散越犬樂氣飛揚大怒氣不通久坐傷筋久立傷骨九欲坐先解脫右靴履大吉用精令人氣多多睡令人目盲多唾令人心煩貪美食令人泄痢沐浴無常不吉沐浴浴同日內夫妻同日沐浴或說夢者凶

九日月飲救之吉活十人除地之毒天也功日月薄蝕大風大雨虹蜺地動皆當避人等四時節變不可交合陰陽慎之九夏至後丙丁日冬至後庚辛日皆不可合陰陽大凶九九月十七日小月十六日此名毀敗日不可交會犯之傷血脈

九月二日三日五日九日二十日此生日也交會令人無疾九新沐遠行及疲飽食醉酒大喜大悲男女熱病未差女子月血新產者皆不可合陰陽熱疾新差者死

老子曰凡人生多疾病者是風日之子生而早死者是晦日之子在胎而傷者是朔日之子生而母子俱死者是雷霹靂震日之子能行步有知而死者是下句之子兵血死者是月水盡之子又是月蝕之子雖胎不成者是弦望之子命不長者是大醉之子不癡必狂者是大勞之子生而不成者是平曉之子意多恐懼者是日出之子好為盜賊貪慾者是禺中之子性行不良者是日中之子命能不全者是日跌之子好詐反妄者是晡時之子不盲必瞽者是人定之子天地閉氣不通其子死夜半合陰陽生子壽賢明夜半後合會生子中壽聰明智慧難壽合會生子壽短父母此乃天地之常理也

天老曰人稟五常形兒而尊卑貴賤不等皆由父母合會稟氣壽也得合八星陰陽各得其時者上也即富貴之極得合八星陰陽不得其時者中也得中宮不合八星陰陽得其時者下也得下宮不合此宿不得其時者則為凡人矣合宿交會者非惟生子富貴亦利身大吉八星者室參井鬼柳張房心一二九宿也是月宿所在此星可以合陰陽

老子曰人生大限百年節護者可至千歲如膏用小灶之與大灶聚人大言而我小語聚人多繁而我小語聚人悖暴而我小語聚人不以不事東意不臨時俗之儀淡然無為神氣自滿以此為不死之藥天下莫我知也勿謂聞昧神見我形勿謂小語鬼聞我聲犯禁滿天地取人形人為陽善人自報之人為陰善鬼神報之人為陽惡人自治之人為陰惡鬼神治之

故天不欺人示之以影地不欺人示之以響人生天地氣中動作喘息皆應於天為善為惡天自鑒之人有修善積德而遭凶禍者先世之餘殃也為惡犯禁而遇吉祥者先世之餘福也故善人行不擇日以至凶中得凶中之吉入惡中得惡中之善惡人行動擇時日至吉中反得吉中之凶入善中反得善中之惡此皆自然之符也

老子曰謝天地父母法常以辰巳日黃昏時天晴日淨掃宅中甲士丙庚之地燒香北向稽首三過口勿語但心中言耳舉家皆利謝嘿云曾孫某乙數負黃天之氣蒙上帝之始願合家男女大小前後所犯罪過請為消除凶惡在後進善人其家大小身神安生氣還常以此道大吉利除禍殃

老子曰正月朔晚亦可於廷中向寅地再拜呪曰洪華洪華受大道之恩太清玄門願還某去歲之年男女皆三過自呪常行此道可以延年

論曰神仙之道難致養性之術易思故善攝生者當慎於忌謹勤於服食則百年之內不懼於天傷也所以具錄服餌方法以遺後嗣云

養性服餌第二方 參拾卷首

茯苓酥主除萬病久服延年方

取山之陽茯苓其味甘美山之陰茯苓其味苦惡得之勿去皮去皮刀薄切暴乾蒸令氣潤以湯淋之其色赤味苦淋之不已候汁味甜便止暴乾擣篩得茯苓三斗取好酒大斗一石蜜一斗和茯苓末令相得內置石臼斗寬中熟攪之百遍密封之勿令洩氣冬月五十日夏月二十一日酥浮於酒上接取酥其味甘美如天甘露可作餅大如手掌空屋中陰乾其色赤如棗肌食一餅終日不飢此仙

人產荒世藥取酒封閉以下藥各按全酌

杏仁酥主萬病除諸風喘冷方
取家杏仁其味甜香持忌用山杏仁山杏仁慎勿用大毒害人也

家杏仁賣石去尖皮兩人者城完全者若微有缺壞一頭不得用微火炒為作細末頭浸酒隔石研杏仁頭研渣石

右一味以蜜壹斗拌杏仁汁煎極令濃與乳相似內兩碩瓮中攪之密封泥勿令洩氣與上法參酥同法三十日省之酒上出酥也接取酥內空器中封之取酥下酒別封之團其藥如梨大置空屋中作閨女之皆如飴餚狀甚美服之令人斷穀

地黃酒酥令人髮白更黑落更生龍腦滿實還年却老走及奔馬父服有子方

龍肥地黃拾石切搗取汁參石麻子壹石搗作末以地黃汁研取汁貳石柒斗杏仁壹石去皮尖兩仁者搗作末以麻子汁研取汁貳石伍斗麴末參到

右四味以地黃等汁浸麴七日候沸以米參石分作參分投下釀一度以藥汁伍斗和釀酒如家醞酒法三日一投九日三投熟訖密封三七日酥在酒上其酥色如金以物接取可得大升致升酥然後下麴取酒封之其糟令服藥人食之令人肥悅百病除愈食糟盡乃服藥酒及酥一服酒壹升壹匙酥溫酒和服之惟得喫白飯無菁忌生冷酢滑諸雜魚蒜其地黃澤暴使乾更以酒參升和地黃澤搗之暴乾作餅服之

造草酥方

杏仁燈料去皮研碎兩仁者龍肥地黃拾石研碎搗碎

麻子體斗研碎以水

右三味汁九參斗著麴壹斤米參到釀如常酒味是正熟出以羹盛之即酥凝在上每服取熱酒和之令酥消盡服之

真人服杏子丹玄隱士學道斷穀以當米糧方
上搜米乾暴斗淨搗碎飯杏仁參斗去尖皮兩仁者研碎

右二味先煎杏仁汁令如稀麴糊置銅器中內粳米粉如稀粥以煑火煎自旦至夕攪勿停手候其中水氣盡則出之陰乾紙貯欲用以暖湯貳升內藥如雞子大置於湯中停一炊久取食任意取足服之

服天門冬丸方

九天門冬苗作蔓有鈎刺者是採得當以酢漿水煮之濕去心皮暴乾搗篩以水蜜中半和之仍更暴乾又搗末水蜜中半和之更暴乾每取一九含之有津液輒咽之常含勿絕行亦含之久久自可絕穀禁一切食惟得喫大麥

服黃精方

九株黃精須去苗下節去皮取一節隔二日增一節十日服四節二十日服八節空腹服之服訖不得喫口百日以上節食二百日病除二年四體調和忌食酒肉五辛酥油得食粳米糜粥淡食除此之外一物不得入口山居無人之地法服時臥食勿坐食坐服即入頭令人頭痛服訖經一食頃乃起即無所畏

九服烏麻忌薑栗胡桃得食淡麴餘悉忌行道持誦作勞遠行端坐三百日一切病除七日內宜數見穢惡於後即不畏穢服無青子主百疾方

無青子體斗

薤白拾兩

右二味煮無青子暴乾搗篩切薤白和蒸半日下搗一千

一百三十枚。捻作餅重八兩。欲絕穀先食。乃服。三日後食三餅。以為常。式盡更令食。勿使絕也。

草化雲母圓子三人九方

雲母粉 石鍾乳 白石英 肉苁蓉 石膏

天門冬 人參 續斷 昌蒲 茵桂

澤瀉 秦艽 紫芝 五加皮 鹿茸

地膚子 罌頤 石斛 杜仲 桑上寄生

細辛 乾地黃 荊花 柏葉 赤箭

酸棗仁 五味子 牛膝 菊花 遠志 上心

草解 黃根 巴戟天 赤石脂 地黃花

枸杞 桑螵蛸 菴蘭子 茯苓 天雄 炮去

山茱萸 白朮 菟絲子 松實 黃耆

麥門冬 柏子仁 薺子 冬瓜子 蛇牀子

決明子 荊實子 車前子

右伍拾參味。皆用真新好者。並等分。隨人多少。擣下細篩。鍊白蜜和為丸。如梧子。先食服十九。可至二十九。日三服。無所忌。當勤相續。不得廢闕。百日滿。愈疾。又服延年益壽。身體輕強。耳目聰明。流通榮衛。補養五臟。調和六腑。顏色充壯。不知衰老。若根當洗去土。陰乾。地黃。荊花。至時多採。暴乾。欲用時。相接取二石許。乃佳也。吾嘗服宜兩劑。大得力。皆家貧不濟。乃止。又時無藥。足闕十五味。仍得服之。此藥大有氣力。常須預求。使足服。而勿闕。又香美易服。不比諸藥。

周白水散

主心虛勞損。令人身輕。目明。服之八十日。百骨間寒熱除。百日外。無所苦。氣力日益。老人宜常服之。大驗方。遠志 炮白朮 參分 桂心 薑兩人參 參分 乾薑 宜兩

續斷 伍分 杜仲 伍分 椒 半兩 天雄 參分 茯苓 兩
蛇牀 人參 附子 參分 防風 伍分 乾地黃 伍分 石斛 參分
肉苁蓉 參分 桔梗 伍分 牡蠣 參分 石韋 參分 鍾乳 壹兩
赤石脂 兩 桔梗 壹兩 細辛 壹兩 牛膝 參分
右貳拾肆味。擣篩為散。酒服錢五心。服後飲酒。壹升。日二。不知更增壹錢。七二十日。身輕目明。

神圓方

茯苓 茯苓 桂心 乾薑 兩 肆 昌蒲

遠志 去心 細辛 白朮 人參 兩 甘草 貳兩

棗膏 捌兩

右壹拾壹味。皆擣篩。鍊蜜和。更擣萬杵。每令壹丸。如彈丸。有津咽之。盡更含之。若食生冷宿食不消。增一丸。積聚結氣。嘔逆心腹絞痛。口乾。脹。咽。吐。嘔。皆含之。絕穀者服之。學仙道士含之。益心力神驗。

彭祖松脂方

松脂 伍斤 灰汁 黃三十兩 鹽水 三十兩 茯苓 伍斤 灰汁 黃三十兩 鹽水 三十兩
生天門冬 伍斤 灰汁 黃三十兩 鹽水 三十兩 真牛酥 三十兩

白蜜 參分 蠟 參分

右陸味。擣篩。以銅器重湯上。先內酥。次下蠟。次下蜜。候消訖。次下諸藥。急攪之。勿住手。務令大勻。訖。內瓷器中。密封。勿令洩氣。先一日不食。欲食。須喫好美食。令大飽。然後絕食。即服貳兩。二十日後。服四兩。又二十日。服八兩。細九之。以得咽中下為度。第二度。服四兩。為初二十日。又服八兩。又二十日。服二兩。第三度。服八兩。為初二十日。又服八兩。又二十日。服四兩。合二百八十日。藥成。自餘服三丸。將補不服。亦得常以酥蜜消息。美酒一升。為佳。又合藥。須取

四時王相特忌刑殺及四激休廢等日大凶
守中方

白蠟章所煉之凡賦升酒為一升砂細研蜜之極

右參味合圓之如小棗大初一日服三九三日服九九如
此至九日止

茅山仙人服質多羅方出益州導江縣

此有三種一者紫花根八月二者黃花根亦黃

右三種功能一種不列依法採根乾已搗篩且煖一合酒
和方寸匕空腹服之待藥消方食日一服不可過之忌晝
日眠睡三十匕為一劑一月服

第二方
蜜半合 酥半合

右貳味煖之和方寸匕服之一法蜜多酥少一方以三指
撮為定主療諸風病禁猪肉豕食之即失藥力

第三方
取散五兩生胡麻脂三升半投之微火煖之勿令熱旦接
取上油一合煖空肚服之日一服油盡取滓服之主偏風
半身不遂并諸百病延年不老

第四方
煖水一合和三指撮空腹日一服主身羸瘦及惡瘡癬疥
并諸風

第五方
煖牛乳一升和方寸匕服之日一服主女人絕產無子及
白更黑

第六方

煖濃醪漿一合和方寸匕服之日一服主腸上痰飲水氣
諸風

第七方

以牛尿一合煖和方寸匕服之遣四人搗脚主令氣息
通流主五種癩若重者從少服漸加至一匕若候身作
金色變為少年顏若桃李延年益壽

右件服藥時皆須平旦空腹服之以靜室中不得傷風
及多語戲笑作務等事所食桃李粳米及新春粟禁一切
魚肉豕陳臭等物得食乳酪油其藥功說不能盡又服神
仙八十老人狀如少年若觸藥發時身體脹滿四肢強直
俱赤脫却衣裳向火炙身得汗出差

服地黃方

生地黃拾斤

右壹味搗之以水二升絞取汁澄去滓微火上煎減半即
內好白蜜五升棗脂壹升攪令相得乃止每服雞子大一
枚日三服令人肥白美色

又方

生地黃拾斤

右壹味細切以淳酒貳斗浸經二宿出暴令乾又浸酒中
直令酒盡又取甘草已乾大厚朴乾漆覆盆子各一斤各
搗下篩和之飯後酒服方寸匕日三服加至二匕使人老
者還少強力無病延年廿金無

作熟乾地黃法

別採地黃去根葉及細楊搗絞取汁以漬肥者著甑中土
及米無在以蓋其上蒸之一時出暴燉更內汁中又蒸之
一時出暴以汁盡止便乾之亦可直切地黃蒸之半日數

數以酒灑之使周圍至夕出暴乾可搗蜜丸服之

種地黃法并造

先擇好肥地黃赤色虛軟者選取好地深耕之可於臘月預耕凍地彌佳擇肥大地黃根切斷長三四分至一二寸許一斛可種一畝二月三月種之作畦時相去一尺生後隨後鋤壅及數次至九月十月視其葉小葉乃掘取一畝得二十許斛擇取大根水淨洗其細根及剪頭尾輩亦洗之日暴令極燥小膽乃以刀切長寸餘白茅覆甑下蒸之密蓋上亦可囊盛土填之從日至暮當日不盡者明日又擇取蒸之先待已搗其細碎者取汁於銅器中煎之可如薄飴將地黃內汁中周匝出暴乾又內之汁盡止率白斤生者合得三十斤取初八月九月中掘者其根勿令太老強蒸則不消盡有筋脈初以地黃內甑中時先用銅器承其下以好酒淋酒地黃上令匝汁後下器中取以併和真汁最佳也

王喬輕身方

茯苓壹斤 桂心壹斤

右貳味搗篩鍊蜜和酒服如雞子黃許大一服三九日服

不老延年方

雷丸壹斤 防風壹斤 柏子仁壹斤

右叁味等分搗篩為散酒服方寸匕日一六十以上又亦可服二匕久服延年益精神腦年未六十太盛勿服

領黃精法

取黃精以竹刀剝去皮自仰卧生服之盡飽為度則不頭痛若坐服則必頭痛難忍少食鹽及一切鹹物佳

餌木方

取生木削去皮炭火急炙令熟空肚飽食之全無藥氣可以當食不假山狼得飲水神仙秘之勿傳

服齊州長石法主羸瘦不能食療百病方

馬牙石一名石名石長石

右取黃白明淨無瑕類者搗密絹下勿令極篩恐太麤以壹石米合內一石水中於銅器中極攪令濁澄少時接取上汁如清漿水色置一大器中澄如水色去水內滓於白練袋中盛經一宿漚却水如造烟脂法出日中暴之令乾仍白練袋盛之其袋每一如掌許大厚薄亦可於三斗斗米下蒸之再遍暴乾以手按之令聚手研之即成擊出母以酒服一大匙日三服即覺患差若覺觸以米汁煮洋石一雞子大煮三沸去滓頓服之夏月不能服散者服湯亦佳石出齊州歷城縣藥療氣痰飲不下食百病羸瘦皆差

杏仁壹斤 蜜壹斤 茯苓壹斤 桂心壹斤

右伍味內銅器中微火煎先下蜜次下杏仁次下酥次下茯苓次下人參調令均和則內於瓷器中空肚服之一合

稍加之以利為度日再服忌食肉

有因讀誦思義坐禪及為外物驚恐狂走失心方

酥貳兩 蘇白壹斤

右貳味搗蘇白并溫酥和攪以酒一盞服之至三七日服之佳得食枸杞菜羹蘇白亦得作羹服訖而仰臥至食時

乃可食也忌獲得力者非一

主頂心不能言諸心下懸急苦痛舉動不安數數口
中寒客熱心中百病方

防風 伍分 人參 伍分 龍齒 伍分 苦參 壹兩 鐵精 壹兩

枳子仁 壹兩 枳實 壹兩 枳殼 壹兩 枳實 壹兩 枳殼 壹兩

雄黃 壹兩 昌蒲 壹兩 枳實 壹兩 枳殼 壹兩 枳實 壹兩

光明砂 壹兩 鍾乳 壹兩

右貳拾壹味搗篩鍊蜜和飲服梧子大五丸漸加至十五
丸日貳服稍加至三十九丸慎腥臭等當宜小進食為佳宜
喫酥乳倍日將息先須服湯方如左

玄參 伍兩 乾地黃 伍兩 黃芪 伍兩 地骨皮 伍兩 茯苓 伍兩
丹參 伍兩 牛膝 伍兩 五味子 伍兩 麥門冬 伍兩 去心

杏仁 煨兩 去皮 細辛 叁兩 礞石 伍兩 生薑 叁兩

茯苓 叁兩 橘皮 貳兩 非子 半升 柴胡 貳兩

右壹拾壹味以水三斗煮取三升分為三服後三日
乃更進丸時時食後服服訖即仰臥少時即左右臥及數
轉動頭腰底安物令高亦不得過久斟酌得所不得發後
身心氣力服藥時乾食即且停一日食訖用兩三升漿水

飲壓之服藥時有異狀貌起勿怪之服九後二日風動藥
氣衝頭兩眼赤痛久而不差者依狀療之法取黃根直入
地二尺者白皮一握水一升煮取半升一服即愈

主治心虛熱不能飲食食即嘔逆不欲聞人語方

人參 壹兩 苦參 壹兩 沙參 壹兩 丹參 叁分

玄參 半兩

右五味搗篩鍊蜜和為丸食訖飲服十九如梧子大日二

漸加至二十九

治損心吐血方

苦參 貳兩 葱白 貳兩 生薑 貳兩 油 伍合 椒 貳合

桂心 壹兩 豉 叁合 白梗米 肆合

右捌味以水四升煮取二升內米油又煎
取一升去滓頓服慎變

正禪方
春桑耳 夏桑子 秋桑葉

右叁味等分搗篩以水一斗煮小豆一升令大熟以桑末
一升和煮微沸著鹽最服之日三服飽服無妨三日外稍
去小豆身輕目明無眠睡十日覺遠智通初地禪服二十
日到二禪定百日得三禪定累一年得四禪定萬相皆見
壞欲界觀境界如視掌中得見佛性

服昌蒲方

二月八日採取肥實白色節間可容指者多取陰乾去毛
距擇吉日搗篩百日一兩為一劑以藥四分蜜一分半酥
和如稠糜柔脂極勻內瓷器中密封口埋穀殼中一日
日飲服此藥須先服瀉藥吐利訖取主相日旦空肚服一
兩含而咽之有力能漸漸加至三三兩服藥至夜已開藥
消諸可食糗米乳糜更不得喫飲食若渴惟得飲少許熟
湯每日止一服藥一頓食若直治病差止若欲延年益壽
未聰明益智者宜須勤久服之修合服食須在靜室中勿
喜出入及晝睡一生須忌羊肉熟菜又主癰癤瘰癧上氣
痔漏病最良又令人膏體肥充老者光澤髮白更黑面不
皺身輕目明行疾如風填骨髓益精氣服劑壽百歲天
竺摩揭陀國王舍城色陀寺三藏法師跋摩米帝以大業

八年與突厥使主至武德六年七月二十三日為洛州大德護法師淨土寺主矩師譯出

養老例第三 論三首

論曰人之在生多諸難兼少年之時樂遊馳騁情數放逸不至於道倏然自覺方悟虛生終無所益年至耳順之秋乃希食餌然將欲順性莫則按依追思服食者於此二篇中求之能庶幾於道足以延齡矣語云人老有疾者不藥斯言失矣細尋聖人之意本為老人設方何則年少則陽氣極盛食者皆甘不假醫藥悉得肥壯至於年邁氣力稍微非藥不救雖是新生之與故舍斷可知矣

論曰人年五十以上陽氣日衰損與日至今心力漸退忘前失後與居急情計授皆不稱心視聽不穩多退少進日月不常萬事憂落心無聊賴健忘瞋怒情性變異食飲無味寢處不安子孫不能識其情惟云大人老來惡性不可談議是以為孝之道常須慎護其事每起速稱其所須不得令其意負不快故曰為人子者不植見落之木淮南子曰木葉落長年悲夫栽植卉木尚有避忌況俯仰之閒安得輕脫乎

論曰人年五十以上去皆大便不利或常苦下痢有斯二疾常須預防若秘澀則百數食菜羹等公清之物如其下利宜與薑韭溫熱之菜所以老人於四時之中常宜溫食不得輕之老人之性必恃其老無有藉在率多驕恣不循軌度忽有所好即須捕情既曉此術當宜常預慎之故養老之要耳無妄聽口無妄言身無妄動心無妄念此皆有益老人也又當愛情每有誦念無令耳聞此為要妙耳又老人之道常念善無念惡常念生無念殺常念信無念欺養老之道無作博戲強用氣力無舉重無疾行無喜怒無極視無極聽無大用意無

大思慮無吁嗟無叫喚無吟吟無嘔嘔無咄咄無悲悲無喜喜無憂憂無接對賓客無預局席無飲飲能知此首可無病長壽斯必不惑也又常避大風大雨大寒大暑大霧雷霹靂旋風惡氣能不觸冒者是大吉祥也凡所居之室必須大周密無致風隙也夫善養老者非其書勿讀非其聲勿聽非其務勿行非其食勿食非其食者所謂猪狗雞魚蒜鱸生肉生菜白酒大酢大鹹也常學淡食至如黃米小豆此等非老者所宜食故必忌之當宜輕清鮮淡之物大小麥粳稷米等為佳又忌強用力酸醢堅硬脯肉反致折齒破斷之弊人凡常不飽不飽不寒不熱美行住坐則言談語笑寢食造次之間能行不妄失者則可延年益壽矣

養老食療第四 論五首

論曰衛汜稱角鵠云安身之本必須於食救疾之道惟在於藥不知食宜者不足以全生不明藥性者不能以除病故食能排邪而安臟腑藥能恬神養性以資四氣故為人子者不可不知此一事是故君父有疾期先命食以療之食療不愈然後命藥故孝子須深知食藥一性其方在千金方中論曰人子養老之道雖有水陸百品珍羞每食必忌於雜雜則五味相掩食之不已為人作患是以食取鮮有務令簡少飲食當令節儉若貪味傷多老人腸胃皮薄多則不消多事短氣必致霍亂至已後秋分已前勿進肥濃羹醢油醢等則無他矣夫老人所以多疾者皆由少時春夏取涼過多飲食太冷故其胃膈生菜生肉腥冷物多損於人且常斷之惟乳酪酥蜜常宜溫而食之此大利益老年雖然卒多食之亦令人腹脹洩利漸漸食之

論曰非但老人須知服食將息節度極須知調身按摩搖動

肢節導引行氣行氣之道禮拜一日勿住不得安於其魁以致墮溺故流水不腐火不熾義在斯矣能知此者可得一二百年故曰安者非安能安在於慮亡樂者非樂能樂在於慮歟所以老人不得殺生取肉以自養也
普濟湯主大虛冷風羸弱無顏色方二云酥蜜湯

酥蜜湯 生薑一斤 白蜜三斤 酥蜜酒三升
白蜜一斤 油蜜升 椒蜜升 胡椒仁蜜升

右壹拾壹味先以酒漬鼓一宿去滓內糖蜜油酥於銅器中煮令勻沸次內雞薑煮令熟次下椒薑胡椒麻黃沸下貳升取汁又煮一沸出內蜜器中密封空腹吞一合如人行十里更一服冷者加椒

服烏麻方
純黑烏麻及梅檀色者任多少與水拌令潤勿使太濕蒸令氣遍即下暴乾再蒸往反九蒸九暴訖搗去皮作末空肚水若酒服二方寸匕日二服漸漸不飢絕穀久服百病不生常服延年不老耐寒暑

蜜餅主補虛羸瘦之氣力方
白蜜一斤 臘月猪肪脂 脂胡麻油 乾地黃末 蜜升
右四味合和以銅器重空煎令可丸下之服如梧桐子三九日三稍加以知為度又服肥之益壽

服牛乳補虛破氣方
牛乳一斗 畢撥半升 麥末
右二味銅器中取參升水和乳合煎取參升空肚頓服之日一二七日除一切氣慎勿食雞蒜生冷張蒼云波斯國及大秦甚重此法謂之惺散湯

猪肚補虛羸之氣力方

肥大猪肚壹具 人參伍兩 椒壹兩
乾薑壹兩半 葱白壹兩 粳米壹升

右六味下篩合和相得內猪肚中縫合勿令洩氣以水壹斗半微火煮令爛熟食之腹食之兼少與飯一頓令盡可服四五劑極良

論曰牛乳性平補血脈益心長肌肉令人身體康強潤澤面目光悅志氣不衰故為人子者須供之以為常食一日勿闕常使意充足為度也此物勝肉遠矣
服牛乳方

鍾乳壹斤 人參參兩 甘草伍兩
乾地黃參兩 黃耆參兩 杜仲參兩 菟絲子伍兩
茯苓伍兩 麥門冬肆兩 薯蕷陸兩 石斛貳兩

右壹拾壹味搗節為散以水伍升先煮粟米未升為粥內散柒兩攪令勻和少冷水牛渴飲之令足不足更飲水日一餘時患渴可飲清水平旦取牛乳服之生熟任意牛須三歲以上七歲以下純黃色者為上餘色者為下其乳常令犢子飲之若犢子不飲者其乳動氣不堪服也其乳牛淨潔者之洗刷飲飼須如法用心看之慎諱猪魚生冷陳臭等物

有人頸遭重病羸瘦不可平復以此方補之甚效其方如左
生枸杞根 細切 大升 水 白手骨 壹具
右二味合之微火煎取伍大升溫酒服之五日令盡不是小小補益一方單用枸杞根慎生冷酢滑油膩七日

補五勞七傷虛損方
白羊頭蹄壹具 以草火燒令黃 胡椒壹兩 畢撥壹兩

葱白壹升 香豉貳升

右降味先以水煮羊頭蹄骨半熟內葱豉煮令大爛去骨空腹通性食之日食一具滿其止其生令飲丹瓜果肥及諸雜肉湯與白酒和食大蒜一切魚肉仍慎食大酢滑五辛陳臭猪雞魚油等七日

療大虛羸困極方

取不中水猪肪一大升內葱白壹莖煎令葱黃止候冷暖如人體空腹平旦頓服之令溫蓋覆臥至日哺後乃食白粥稀粥過三日後服補藥其方如左

羊肝貳斤 羊脊骨壹斤 羊腰肉壹斤 麴末半升

枸杞根壹斤 打以水三大升

右四味合和下葱白貳斤 汁調和法煎之如稠糖 空腹飽食之三服時慎食如上

補虛勞方

羊肝貳斤 羊心壹斤 肺壹斤 以熟湯洗胡椒壹兩 葶藶壹兩 政心半升 葱白壹斤 心切去 犁牛酥壹兩

右陸味合和以水陸升緩火煎取三升去滓和羊肝等并汁皆內羊肝中以急火煮肚口更別作一綯袋稍小於羊肝盛肚裏若熟出以刀子并綯袋刺作孔壓取汁空肚頓服令盡餘任意分作食之若無羊五臟羊骨亦可用之其方如左

至骨兩具

右以水一大石微火煎取三斗依食法任性作羹粥麪食不食肉人油麪補大虛勞方

生胡麻油壹升 浙梗米汁清壹升

右貳味微火煎盡油清乃止出貯之取三合鹽汁七合先

以鹽汁和油令相得濃更一斤如常法煮之更五六沸出置冷水中更澆出鹽上之乃更一煮其油并湯出更取如常法十度煮之更煮乃盡以油作醃澆之任飽食烏麻脂主百病虛勞人服而寒者方

烏麻油壹升 薤白壹升

右貳味微火煎薤白令黃去滓酒服一合百日常服二百日老者更少三百日諸病悉愈

服石莖乳方

白石英粉伍兩 糯米壹斗

右壹味取牛乳三升水三升煎取三升頓服之日一度可二十遍煮乃一易之擣篩以酒三升漬二七日服之常令酒氣相接勿至於醉以補人虛羸更無以加也有力能多服一二年彌益○凡老人舊患眼暗者勿以酒服藥當用飲下之目暗者能終不與酒蒜即無所畏耳

論曰上篇皆是食療而不愈然後命藥藥食兩攻則病無逃矣其服餌如左

黃耆 柏子仁 天門冬法 白朮 乾地黃

遠志去心 澤瀉 署預 甘草炙 人參

石斛 麥門冬法 牛膝 杜仲炙 薏苡仁

防風 茯苓 五味子 茯苓 乾姜 丹參

肉蓯蓉 枸杞子 車前子 山茱萸 狗脊

草薢 阿膠炙 巴戟天 菟絲子 覆盆子

右三拾壹味各壹兩擣篩鍊蜜丸酒服十九日稍加至四

十圓性冷者加乾薑桂心細辛貳兩去車前子交門冬澤瀉多忘者加遠志昌蒲二兩患風者加獨活防風當歸二兩老人加牛膝杜仲葶藶狗脊石斛鹿茸白馬莖各二兩無問長幼常服勿絕百日以內慎生冷酢滑猪雞魚蒜油膩陳宿醬酒百日後惟慎猪魚蒜生菜冷食五十以上雖暑月三伏時亦忌冷飯依此法可終身常得藥力不退藥育三十一未合時或少一味兩味亦得且服之

服強記不忘方

柏子仁和合蛇牀子各半覆盆子各半

石斛巴戟天各貳兩杜仲炙茯苓

天門冬去心遠志去心天雄去皮續斷

桂心兩半昌蒲澤瀉署預

人參乾地黃山茱萸兩半五味子伍兩

鍾乳參兩成肉蓯蓉陸兩

右貳拾貳味搗篩鍊蜜和丸如桐子大先食服二十九稍加至三十九先齋五日乃服藥服後二十日齒垢稍去白如銀四十二日面悅澤六十日瞳子黑白分明尿無遺濕八十日四肢偏潤白髮更黑腰背不痛二百五十日意氣如少年藥盡一劑藥力周至乃入房內忌猪魚生冷酢滑

紫石英拾兩白石英拾兩白石脂兩赤石脂兩

乾薑兩

右伍味吹咀皆完用二石莖各取一兩石脂等三味各取三兩以水參升合以微火煎宿勿食分爲四服日三夜一服後午時乃食日日依前科取服日藥乃置新藥中其後乃至藥盡常然水數一準新藥盡訖常添水去滓服之滿

四十日止忌酒肉藥水皆用大升并取汁亦用大升服論曰此湯補虛除固公莫過於此能用之有如不覺者謂是常方輕易而侮之若一劑得差即止若服多人大熱即須服冷藥壓之宜審而用之

千金翼方卷第十三

服茯苓第一方六首

服茯苓方

茯苓粉 伍斤 白蜜 叁斤 柏脂 法升 煉

右參味合和圓如梧桐子服拾圓飢者增數服之取不飢乃止服吞壹圓不復服穀及他果菜也永至休粮飲酒不得但得飲水即欲求升仙者常取杏仁伍枚咬咀以水煮之為湯令沸去滓以服藥亦可和丹砂藥中令赤服之又若却欲去藥食穀者取消石葵子等熟治之以粥服方寸匕日一四日內日再服藥去稍稍食穀葵羹太良

又方

茯苓 叁斤 白蠟 貳斤 大麻油 三升 松脂 叁斤

右肆味微火先煎油三沸內松脂令烱烱內蠟蠟烱烱內茯苓熟攪成圓乃止服如李核大壹圓日再一年延年千歲不飢

又方

茯苓 貳斤 雲母粉 貳斤 天門冬粉 貳斤 羊脂 伍斤 麻油 叁斤 蜜 伍斤 白蠟 叁斤 松脂 拾斤

右捌味內銅器中微火上煎令相得下火和令凝紫色乃止欲絕穀先作五肉糴糧食五日乃少食三日後圓此藥大如彈圓日三服一日玖圓不飢飢則食此止却百二十日復食九圓却三歲復食九圓却十二年復食九圓如此壽無極可兼食棗脯飲水無苦還下藥取消石壹升葵子壹升以水叁升煮取壹升日三服八合亦可壹升藥下乃食一合米粥日三三日後日中三合

又方

茯苓 去皮

右以淳酒漬令淹密封十日出之如餌可食甚美服方寸匕日三令人肥白除百病不飢渴延年

又方

茯苓粉 伍斤 白蜜 叁斤

右氣味漬銅器中甕器亦得重釜煎之數數攪不停候蜜竭出以鐵臼持坐萬并日壹服三十圓如梧子百日病除二百日可夜書二年後役使鬼神久服神仙辟穀延年千歲方

松脂

天門冬 法茯苓

蠟 蜜 格壹

右伍味以酒伍升先煎蜜蠟三沸內羊脂三沸內茯苓三沸內天門冬相和服三圓如李子養色還白以杏仁壹升內之為良

服松柏脂第二方貳拾首

採松脂法

常立夏日伐松橫枝指東南者圍二三尺長一尺許即日便倒頓於地以器其下承之脂自流出三四過使以和藥此脂特與生雄黃相宜若堅強者更著酒中火上消之汁出著冷酒中引之乃燂和雄黃衡山松脂膏常以春三月入衡山之陰取不見日月之松脂鍊而食之即不召自來服之百日耐寒暑二百日五藏補益服之五年即王母見諸名山所生三百六十五山其可食者獨滿谷陰懷中耳其谷正從衡山嶺直東肆百八十里當橫捷正石橫其嶺東北行過其南入谷五十里窮穴有石城白鶴其東方有大石四十餘丈狀如白松松下二丈有小穴可入山有丹

砂可食也其南方陰中有大松大三四十餘圍有三十餘株不見日月皆可服也

取破松脂法

以日入時破其陰以取其膏破其陽以取其脂等分食之可以通神靈鑿其陰陽為孔令方寸深五寸選以皮掩其孔無令風入風入不可服也以春夏時取之取之訖封塞勿洩以泥塗之東北行至丹砂穴下有陰泉水可飲之此洪農車君以元封元年入此山食松脂十六年復下居長安東市又在上谷牛頭谷時往來至秦嶺在常山千

取松脂法

所取老枯肥松細擘長尺餘置甌中蒸之滿甌脂下流入金中數數接取脂置水中凝之盡更為一日可得數十斤枯節益佳

又法

取枯肥松細破於釜中煮之其脂自出接取置冷水中凝之引之則成若以五月就木取脂者對刻木之陰面為二三刻刻可得數升秋冬則依煮法取勿煮生松者少脂

鍊松脂法

松脂貳拾斤為一劑以大釜中著水加甌其上塗際勿洩加茅甌上為藉復加生土茅上厚一寸乃加松脂於上炊以桑薪湯減添水接取停於冷水中凝更蒸之如煎法三蒸畢止脂色如白玉狀乃用和藥可以圓菊花茯苓服之每更蒸易土如煎法以銅鑊承甌下脂當入鑊中如膠狀下置冷水中凝更蒸欲出銅器於釜中時預置小繩於脂中乃下停於水中凝之復停於炭須更乃四過皆解乃可舉也盡更添水以意斟酌其火勿太猛常令不絕而已

又方

治松脂以灰汁煮之寫置盆水中須更凝斷取復置灰中煮之如此三反皆易水成矣

一法鍊松脂十二過易水不能者五六過亦可服之

鍊松脂法

薄淋桑灰汁以煮脂一二沸接取投冷水中引之凝復更煮凡十過脂則成若強者復以酒中煮三四過則柔矣先食服一兩日三十日不復飢飢更服之一年後夜如白日久服去百病禁一切肉鹹菜魚蝦蠶等

又方

松脂拾斤

右用桑新灰汁貳石內釜中加甌於上甌中先鋪茅次鋪黃砂土可與手蒸之脂少開流入釜中寒之凝接取復蒸如煎三上更以清水代灰汁復如煎三上去水更以陰深水壺石伍斗煮甘草參斤得壺石汁去滓內牛酥貳斤加甌釜上復炊如煎令脂入甘草汁中凝接取復蒸之下如此三上即成苦味皆去甘美如飴膏服如彈丸日三久服神仙不死

又方

好松脂壹石石灰汁叁石

右貳味於淨處為竈加大釜斬白茅為藉令可單止以脂內甌中炊之令脂自下入釜盡去甌接取內冷水中以扇扇之兩人引之三十過復蒸如煎滿三遍三易灰汁復以白酢漿三石鍊之三過三易酢漿也復以酒鍊之一過亦如上法訖以微火煎之令如飴狀服之無少長

又方

松脂貳斤半水伍升煎之汁黃濁出投冷水中如是百二十上不可以為率四十入湯輒一易湯凡三易湯且成軟如泥其色白乃可用治下茯苓一斤內藥中攪令相得藥成置冷地可圓圓如杏核日吞叁圓拾日止自不欲飲食當鍊松脂無令苦乃用耳

又方

松脂柒斤以桑灰汁壹石煮脂三沸接置冷水中凝復煮之凡十編脂白矣為散叁兩分為三服十兩以上不飢飢復服之一年以後夜視目明久服不死論曰鍊松脂春夏可為秋冬不可為絕穀治癰第一欲食即勿服亦去三斤粉松脂法

松脂拾斤

丹黍灰汁煮滿接置冷水中二十過即末矣亦可雜雲母粉丸以蜜服之良

服松脂法

欲絕穀服叁兩飢復更服取飽而止可至壹斤不絕穀者服食壹兩先食須藥力盡乃餘食錯者即食不安而吐也久服延年百病除

又方

松脂拾斤松實叁斤柏實叁斤菊花伍升

右肆味下篩蜜和服如梧子叁拾圓分為叁服一百日以不復飢服之一年百歲如三四十者久服壽同天地

又方

桑寄生蒸之令熟調和以鍊松脂大如彈丸日一九即不飢服法

以夏至日取松脂日食壹升無食他物飲水自恣令人不飢長服可以終身不食河南少室山有大松取陰處斷之置器中蒸之膏自流出鍊出去苦氣白蜜相和食之日壹升二日後服如彈丸渴飲水令人不老取無時

又方

松脂伍斤羊脂叁斤

右貳味先鍊松脂令消內羊脂日服博棊二枚不飢多服神仙守中方

白松脂柒斤參編

白蠟伍斤白蜜叁升茯苓粉叁斤

右叁味合煮一石米填服如梧子拾圓飢復取服日一丸不得食一切物得飲酒不過一合齋戒咬咀五香以水煮一沸去滓以藥投沸中又欲致神女者取茅根治取汁以和之蒸服之神女至矣

又方

松脂桑灰鍊百遍色正白復內之飴蜜中數反出之服二圓如梧子百日身輕一年玉女來侍

取柏脂法

五月六日刻其陽二十株株可得半升鍊服之欲絕穀者增至陸兩不絕穀者壹兩半禁五辛魚肉菜鹽醬治百病久服鍊形延年鍊脂與鍊松脂法同

服松柏實第三方一十九首

凡採柏子以八月過此零落又喜蠹蟲頤取之又易得也當水中取沈者八月取并房暴乾末服方寸匕稍增至五合或日壹升半欲絕穀恣口取飽渴飲水一方柏子服不可過五合

凡採松實以七月未開時採之纔開口得風便落不可見也

松子宜陳者佳。
絕穀升仙不食法

取松實末之服三合日二則無飢渴飲水勿食他物百日
身輕日行五百里絕穀升仙

服松子法

治下節服方寸匕日三四或日壹升半升能多為善二百
日以上日行可五百里一法服松子不過三合

松子味甘酸益精補腦久服延年不老百歲以上顏
色更少年身輕悅澤方

松子菊花等分以松脂若蜜丸服如梧子十九日三可至
二十九亦可散服二方寸匕日三功能與前同

又方

松柏脂及實各等分丸以松脂服之良

服松葉令人不老身生毛皆綠色長一尺體輕氣香還年變

白父服以絕穀不飢渴飲水服松葉亦可粥汁服之初服如
惡父自便亦可乾末然不及生服

服松葉法

細切食之日二合令人不肌

又方

細切之如粟使極細日服三合四時皆服生葉治百病輕
身益氣還白延年

又方

四時採春東夏南秋西冬北方至治輕身益氣令人能風
寒不病延年

高子良服柏葉法

採無時以葉切置甑中令滿覆盆蒸者金上蒸之三石米

頃父父並善蒸記水淋百餘過記陰乾若不沐者蒸訖便
陰乾服壹大碗後食日三服勢力少稍增從壹合始至壹升
令人長生益氣可辟穀不飢以備厄還山隱無穀昔龐伯
寧康君平趙德鳳唐公房等脩道佐時也世遭飢運又避
世隱峨眉山中飢窮欲死適與仙人高子良五馬都相遭
以此告之皆如其言盡共服之空賴其力皆度厄後以告
道士進同得其方遂共記之

又方

取大盆內柏葉著盆中水漬之一日一易水易水者狀麤
出水也如是七日以上若二七日為佳記覆盆蒸之令氣
微便止暴乾下篩末一石以一斗囊膏浸如作乾飯法服
方寸二匕日三以水送不飢飢即服之渴飲水以山居讀
誦氣力不衰亦可濟凶年

仙人服柏葉減穀方

柏葉取近上者但取葉勿雜枝也三十斤為一劑常得好
不津器內柏葉於中以東流水漬之使上有三寸以新盆
覆上泥封之三七日出陰乾勿令塵入中乾便治之下篩
以三升小麥淨擇內著柏葉汁中須封五六日乃出陰乾
燥復內之封五六日出陰乾令燥磨之下篩又取大豆三
升炒令熟取黃磨之下篩合三物攪調相得內草葉汁
之一服五合用酒水無在日三食飲無妨治百病自然
消冬不寒顏面悅澤齒脫更生耳目聰明腸胃服此食不
食無在

又方

取柏葉三石熟蒸暴乾下篩大麥一升煮令變色細磨之
都合和服多少自任亦可作粥服之可稍稍飲酒

又方

取柏葉二十斤著盆中。以東流水漬三七日。出暴乾。以小麥一斗漬汁三四日。出暴乾。熬令香。柏葉亦然。鹽一升亦熬之。令黃。三味搗下篩。以不中水猪膏一斤細切著末中。攪復篩之。先食服方寸匕。日三七。不用食。良亦可兼服之。

又方

取陰地柏葉。又取陰面皮。咬咀蒸之。以盆下湯灌之。如是至三陰乾。白。日下篩。大麥末大豆末三味各一斤。治服方寸匕。日三。以絕穀。不食。除百病延年。

又方

柏葉三石。熟煮之。出置平。管中以汰之。令水清。乃止。暴乾。以白酒三升。浸葉。微火蒸之。熟。一石米頃。息火。復暴乾。治大麥三升。熬令變色。細治。暴擣。葉下篩。合麥屑中。日服三升。以水漿若酒送之。止穀。療病辟溫。癘惡鬼。久可度世。

又方

柏葉拾斤。以水四斗。漬之一宿。煮四五沸。漉出去汁。別以器。閉之。乾。以小麥一升。漬柏葉汁中。一宿。出暴乾。復內之。令汁盡。取鹽一升。柏葉一升。麥一升。熬令香。合三味末之。以脂肪一片。合濃酒。服方寸匕。日三。病自消滅。十日以上。便絕穀。若乘驕取一升半水飲之。可以涉道路。不疲。

休糧散方

側柏

烏豆

麻子

右參味。搗拌空心。冷水服方寸匕。

酒膏散第四方。首。論一首。

仙方。靈寶膏。

茯苓

松脂

松仁

柏子仁

右肆味。鍊之。搗篩。以白蜜兩石四斗。內銅器中。微火煎之。一日一夜。次第下藥。攪令相得。微火之。七日七夕止。可取九如小棗。服七丸。日三。若欲絕穀。頓服。取飽。即不飢。身輕。目明。老者還少。十二年仙矣。

初服方

茯苓

松脂

鍾乳

右參味。為粉。以白蜜五斗。攪令相得。內埤器中。固其口。陰乾百日。出而粉之。一服三方寸匕。日三服。劑大佳。不同餘藥。

論曰。凡欲服大藥。當先進此一膏。一散。然後乃服大藥也。

五精酒。主萬病。髮白反黑。齒落更生方。

黃精

天門冬

松葉

白木

右伍味。皆生者。內金中。以水參石煮之。一日去滓。以汁漬。麴如家醞法。酒熟。取清。任性飲之。一劑長年。

白木方

白木

右壹味。咬咀。以東流水兩石伍斗。不滓器中。漬之二十日。去滓。內汁大盆中。夜候流星過。時抄已姓名。置盆中。如是五夜。汁當變如血。取以漬麴。如家醞法。酒熟。取清。任性飲之。十日萬病除。百日白髮及黑。齒落更生。面有光澤。久服長年。

枸杞酒方

枸杞

右壹味。切。以東流水肆石煮之。一日去滓。得石汁。

漬麴。釀之。如家醞法。酒熟。取清。置不滓器中。取。

乾地黄末。桂心末。壹升。乾薑末。壹升。商陸根末。壹升。

澤寫末膏升 椒末壹升

右陸味盛以絹袋內酒中密封口埋入地三尺堅覆上二十日沐浴整衣冠向仙人再拜訖開之其酒當赤如金色平日空肚服半升為度十日萬病皆愈二十日癰疽瘰癧惡疾人以一升水和半升酒分五服服之即愈若欲食石者取河中青白石如棗杏仁者貳并以水參升煮一沸以此酒半合置中須臾即熟可食

雲母粉法

雲母粉壹法 鍾乳 柏仁 桂心 柴胡 人參 白朮 續斷 菊花 乾地黃 兩兩

右壹拾味搗篩以生天門冬拾玖斤取汁浸藥者銅器中蒸之壹石貳斗黍米下出暴乾搗篩先食服方寸匕日壹服三日力倍五日血脈充盛七日身輕十日面色悅澤十五日行及奔馬二十日夜視有光七十日頭髮盡落故齒皆去更取二十匕白蜜和搗二百杵尤如梧子作八十一丸皆映徹如水精珠欲令髮齒時生者日服七丸九三日即生若髮未白不落者且可服散如前法已白者餌藥至七年乃落入山日服七丸則絕穀不食

服雲母第五方三首 論一首

雲母粉法

雲母取上上白澤者細擘以水淨淘洗出蒸之一日一夜下之復更淨淘如前去水令乾率雲母壹升鹽三升消石一斤和雲母搗之一日至暮取少許掌上碾著不見光明為熟出安盆中覆之以水漬之令相得經一炊久登去上清水徐徐去之盛更添水如前凡三十遍易水令淡如水味即盡出其法一如研粉澄取淀然後取雲母淀徐徐坐絹袋中漉著單上

暴令乾即成矣雲母味甘平無毒主治死肌中風寒熱如在船上除邪氣安五藏益子精明目下氣堅肌續絕補中五勞七傷虛損少氣止利久服輕身延年強筋脈填髓補可以負重經山不羣落齒更生癰疽消滅先澤人面不老耐寒暑志高可至神仙此非古法近出東海賣鹽女子其女子年三百歲貌同笄女常自負一龍鹽重五百餘斤如斯得効者其數不一可驗神功矣

又方

雲母璧薄淘淨去水餘減沙盆中研萬遍以水淘澄取淀見此法即自保愛修而服之勿泄之勿泄之

凡服雲母祕澀不通者以燕菁菹汁下之即通祕之用雲母粉法

熱風汗出心悶水和雲母浴之不過再差

勞損汗出以粉摩之即定以粳米粥和三方寸匕服之

疳濕瘰癧月蝕粳米粥和三方寸匕服之以一錢匕內下部中取差

止下脫病粳米粥和三方寸匕服之七日慎血食五辛房室重作務

赤白痢積年不差服三方寸匕不過一兩即差寸白蟲者服一方寸匕不過四服

帶下服三方寸匕三五服差

金瘡一切惡瘡粉塗之至差止

疽疥癬癰癧

風癰者服三方寸匕取差

痔病服三方寸匕慎多食血食油膩

淋病服三方寸匕

又一切惡瘡粉和猪脂塗之

頭瘡禿癬酢酒洗去痂以粉塗之水服三寸匕百日慎如前

論曰凡服粉治百病皆用粳米粥和服之慎房室五辛油膩血食勞作若得雲母水服之壹升長年飛仙

雲母水主除萬病久服長年神仙方

雲母細粉芒消拾斤露水壹石崖蜜貳斤

右肆味先取露水捌斗作沸湯分半泚汰雲母再遍漉出以露水二斗溫之內芒消令消置木器中內雲母訖經三七日出之令燥以水漬之麤皮令軟作袋內雲母袋中急繫口兩人揉挺之從寅至午勿任出之密綰篩末餘不下者更內袋中揉挺如初篩下揔可得五斤以崖蜜和攪令如粥內薄削甬中添固口理舍北陰中深六七尺禁土令平一百二十日出之皆成水且溫水一合和雲母一合向東服日三水寒溫自任服十日小便當黃此先除勞氣風赤也二十日腹中寒瘕皆消二十日齕齒落若更生四十日不畏風寒伍十日諸病皆愈顏色日少久服不已長年神仙

服水第六 論一首 法七首

論曰夫天生五行水德最靈浮天以載地高下無不至潤下為澤升而為雲集而為霧降而為雨故水之為用其利博哉可以滌湯淨穢可以浸潤焦枯尋之莫測其涯望之莫觀其際故含靈受氣非水不生萬物稟形非水不育大則包稟天地細則隨氣方圓聖人方之以為上善余嘗見真人有得水仙者不觀其方武德中龍齋此一卷服水經授余乃披讀不捨晝夜其書多有遺壞文字頗致殘缺因暇僕尋其義理集

成一篇好道君子勤而脩之神仙可致焉

第一服水法

凡服水之法先發廣大心仍教三塗大苦普度法界含生然後安心服之

經曰服水以死為期決得不疑然後辦一瓦杯受一升擇取四時王相甲子開除滿之日并與身本命相生之日候天地大時無一雲氣日未出時清淨沐浴服鮮淨衣燒香禮十方諸佛及一切聖賢仙人天真乞大鴻恩乃向東方取水以水置器中候日出地令水與日同時得三杯杯各受一升呪之三遍向日以兩手捧水當心面向正東方並膝而立先扣齒鳴天鼓三通乃以口臨水上密誦呪一二五七遍極微微用力乃細細咽之想三咽在左腋下三咽在右腋下三咽在中央下周而復始但是服即作此法咽水服一杯斷隔消息徐徐行二十步乃迴更服一杯訖更徐徐行四十步乃迴更飲一杯復行八十步乃止勿煩多飲亦不得少也常燒衆名香至心念佛凡有所證悟境界一切狀貌不得執著乃真事向人道說此則是初起首服水法極用桑杯瓦亦得其呪曰乾元亨利正九種吾生日月與五昇吾復不飢復不渴賴得水以自活金木水火土五星之氣六甲之精三真天倉濁雲上盈黃父赤子守中無傾急急如律令每服皆用此呪呪之三杯杯各三通乃細緩緩徐徐服之

細服五色水法

經曰白黃黑水服法如前唯有青水一法服滿三匕日中思食鬼神遍在身中從人索食當如法與之絕中五穀多食棗栗詐稱鬼親附說人慎勿信之但當以法調和以時及節

服赤水方

赤向生氣所宜之方。三杯三呪。扶手心念口言。誦得曰。金木水火土五精六府。一切藏腑。欲服之時。專心注下。初服之時。如似發氣。三七日如甘露味。亦當食藥。粟一升。七日食蟲漸發。三尸亦盛。思美飲食。遍緣一切世間。當發善念。相續五七日。中二食。粟水方漸強。增長顏色。怡悅。氣力異常。更須加口水。當漸少。日月漸盈。膚體汗。漸漸潤。目精明。亦少睡眠。心開意解。但如法。慎護心。若不至誠。內連六氣。外為鬼神侵。其心念。青帝神守護。水精五七日。脚弱。心意不定。但當正念。重加神司。土父神。后五藏君名。衆邪。驅鬼。如法而去。六七日後。獨善解。音樂不得禮拜。省習誦養氣力。勿鳴。忌。却鬼呪法。

呪曰。然摩。然摩。波悉。諦蘇。若摩。鳩狀。關提。若。夢。若。想。若。聰明。易解。常用此呪法去之。

服水禁忌法

經曰。凡服水忌用銅鐵器。唯用埴器。初起手時。忌陰雲大雨。大風大霧。天地不明。皆忌。

凡服水。禁陳米臭。敗生。冷。酢。滑。椒。薑。一切。衆果。悉不得食。又不得至。麥。孝。產。乳之家。五辛之氣。亦不得聞。一切。脂。膩。血。食。菜。茹。悉不得食也。

凡服水。四七日後。不聞琴聲。歌。嘯。悉不得容。受。音。身。悅。樂。音。聲。博。戲。皆不得執。漸漸。通泰。以洪大道。五色水法。皆同於此也。世間之法。音聲。觸。五穀。觸。畏。孝。觸。產。婦。觸。射。利。觸。善。友。觸。惡。人名。聞。觸。惡。名。觸。皆當謹慎之。

服水節度法

經曰。凡服水。七日中。漸止。酢。滑。亦漸省。食。七日滿。取。粟。麥。食。

經二日後。乃更服之。二七日後。食蟲。漸發。更食。粟。粟一升。三。七日後。思。食。更服。粟。粟一升。四七日後。食蟲。思。食。欲。死。脚。弱。不能。行。步。五七日。水。力。漸。盈。顏色。更好。氣。力。異。常。六七日中。能。步。不止。隨。意。東。西。七七日。中。心。解。異。義。耳。聞。異。聲。必。不。得。貪。著。義。亦。有。悲。欣。慈。旨。八七日。中。守。尸。九七日。中。尸。自。然。遠。離。不。樂。世。間。五藏。諸。病。悉。得。除。愈。十七日。中。髓。腦。發。脉。皮。膏。汗。類。一切。悉。愈。眼。目。精。明。心。想。分。別。無。事。不。知。千。日。後。中。表。內。外。以。五藏。漸。納。漸。小。衆。毒。不。害。人。精。水。神。漸。來。附。人。七。年。腸。化。為。筋。髓。化。為。骨。火。不。能。燒。水。不。能。漂。居。在。水。中。與。水。同。色。在。水。底。與。地。無。異。居。山。澤。間。遠。視。之。者。獨。如。山。雷。此。服。黃。黑。水。法。用。水。法。并。泉。清。流。悉。得。用。之。當。字。疑。

服水大列法

經曰。凡服水。以死為期。必得無疑。信。因。信。果。正。真。其。心。聞。法。歡。喜。不。生。疑。惑。

又曰。凡服水。諸。男。先。舉。左。足。向。陽。左。行。女。先。舉。右。足。向。陰。右。行。男。奇。女。偶。

凡服水法

立。飲。之。不。得。坐。飲。欲。細。細。而。緩。不。得。麤。麤。而。急。杯。受。壹。升。每。一。服。必。三。杯。服。輒。一。迴。徐。行。三。杯。三。迴。若。少。兼。食。者。杯。受。一。升。如。是。三。杯。

凡服水。上。行。一。百。三。十。步。中。行。一。百。二。十。步。下。行。六。十。步。水。重。難。得。氣。力。善。將。其。宜。而。不。失。其。所。者。一。百。日。水。定。周。年。水。盈。四。十。年。氣。二。百。倍。遊。形。自。在。高。原。陸。地。與。水。等。無。差。異。顏。色。皎。然。四。十。年。腸。化。為。筋。髓。化。為。骨。

凡服水。八。十。以。下。十。歲。以。上。皆。得。服。之。若。小。者。當。加。粟。麥。粟。法。上。根。者。從。初。七。至。四。七。止。中。根。者。從。初。七。至。八。七。止。下。

根者從初七至十七乃至十七止後有中下根者一
周時將補乃始休息

上利根之人一服如甘露根之人再服如甘露下根之人

四服如甘露下根者六服如甘露上利根者一服二七日

中根者過七日乃至十日下午根者服日再服七日

又有上利根者延日三倍中利根者延日一倍下利根者纔
不當日

又有上品人脩戒定過去業強中品人見在脩業強下品人
以死爲期必得無疑信向三寶

中根有三品中上品當聞知此寶法欲長年服大升一石二

石即得不死中品脩習其行比智殖業當服此藥廣行善

願中下品少有嫉妬及以憎慢亦具五蓋三毒起罪心因國

土荒亂人民饑饉刀兵劫起思服此藥以免

下根有三品雖眠無覺想不善言惡口或懷藏又無聰惠瞻

瞻不了須人教呵中品人小復遠人下品人居大深山乃得
服耳

退居

論曰人生一世甚於過隙役役隨物相視俱盡不亦哀乎就中養衛得理必免夭橫之醜若知進而不知退知得而不知喪嗜慾則其內權位牽其外其於過分內熱之損胡可勝言況乎身滅覆宗之禍不絕於世哉今擇退居養生上篇庶無禍敗大橫之事若延年長生則存乎別錄高人君子當審思之

擇地第一

山林深遠固是佳境獨往則多阻數人則喧雜必在人野相近心遠地偏背山臨水氣候高爽土地良沃泉水清美如此得十畝平坦便便可構居若有人功可至二十畝更不得廣廣則營為關心或似產業尤為煩也若得左右映帶蘭草取勝最為上地地勢好亦居者安非他望也

締和第一

看地形向背擇取好勢立一正屋三間內後牽其前梁稍長柱令稍高椽上著棧棧乾一書三四寸泥泥令平待乾即以瓦蓋之四面築牆不熱動事務令屋密光如法須斷風隙折縫門牕依常法開後門若無屋蓋令厚二尺則冬溫夏涼於簷前西間作一格子房以待客客至引坐勿令入寢室及見藥房恐外來者有穢氣損人壞藥故也若院外置一客位最住堂後立屋兩間每間為一房修泥一津正堂門令牢固一房著藥藥多者連一立櫃高脚為之天陰霧氣櫃下安少火若江北則不須火也一房著藥器地上安厚板板上安之著地土氣恐損正屋東去屋十步造屋三間備飾準上二間作厨地頭一間作庫庫內東牆施一棚兩層高八尺長一丈闊四尺以安食物必不近正屋近正屋則恐煙氣及人兼

慮火燭尤宜防慎於厨東作屋二間弟子家人寢處於正屋西北立屋二間通之前作格子充料理曬藥物以離院隔之又於正屋後三十步外立屋二間椽梁長壯柱高間闊以安藥鑪更以離院隔之外人不可至也西屋之南立屋一間引簷中隔著門安功德无念誦入靜之處中門外水作一池可半畝餘深三尺水常令滿種菱荷菱葉繞池岸種甘蕉既堪採食兼可闔目怡閑也

服藥第三

人非金石况犯寒熱霧露既不調理必生疾病常宜服藥辟外氣和藥也平居服五補七宣九鍾乳九量其性冷熱虛實自求好方常服其紅雪三黃九青木香九理中九神明膏陳元膏暑初水解散天行茵陳九散皆宜先貯之以防疾發忽有卒急不備難求臘日合一劑烏膏椒葉膏以防癰瘡等若能服食尤是高人世有偶學合鍊又非真好或身嬰朝紋心迫名利如此等輩亦何足言今退居之人豈望不死羽化之事但免外物逼切庶幾全其天年然小小金石事又須閑解神精丹防老救急所不可闕耳伏火丹砂保精養魂尤宜長服伏火石硫黃救脚氣除冷痺理腰膝能食有力小還丹愈疾去風伏火磁石明目堅骨火鍊白石英紫石英療結滯氣魂強力堅骨伏火水銀壓熱鎮心金銀膏養精神去邪氣此等方藥固宜留心功力各依本草其餘丹火以冀神助非可卒致有心者亦宜精懇儻遇其真

飲食第四

身在田野尤宜備膳須識罪福一事不可為不慎食所有養身在藥菜而已料理如法鍊益水人枸杞甘菊木牛膝首烏商陸白蒿五加服石者不宜喫商陸以藥二月已前苗嫩

時採食之。或菜或蔬或炒或煮。悉用土蘇。鹹豕汁。加米等色。爲之下飯。其良。蔓菁作羹最佳。不斷五辛者。春秋嫩。張四時。採蘇其甚。雖難。其氣力。但不可多食。致令悶。慎料理。有法。節而食之。百沸。餅及煮。餅起。麪等法。在食。經中。白。米。白。菜。黃。梁。青。菜。米。常。須。貯。積。支。料。一。年。炊。飯。煮。粥。亦。各。有。法。並。在。食。經。中。最。且。紫。蘇。烏。麻。亦。須。宜。貯。俱。能。下。氣。其。餘。諸。醬。之。徒。食。之。所。要。皆。須。貯。蓄。若。肉。食。者。必。不。得。害。物。余。但。以。錢。買。猶。愈。於。殺。第。一。戒。慎。勿。殺。若。得。肉。必。須。新。鮮。似。有。氣。息。則。不。宜。食。爛。藏。損。氣。切。須。慎。之。戒。之。料。理。法。在。食。經。中。食。後。將。息。法。

平日。點。心。飯。訖。即。自。以。熟。手。摩。腹。出。門。庭。行。五。六。十。步。消。息。之中。食。後。還。以。熟。手。摩。腹。行。二。百。步。緩。緩。行。勿。令。氣。急。行。訖。還。臥。臥。時。四。肢。手。足。勿。睡。之。氣。定。便。起。正。坐。喫。五。六。顆。蜜。煎。或。半。升。以。下。人。參。在。令。甘。草。等。分。實。以。少。熱。酒。喫。麥。門。冬。汁。葉。等。根。等。飲。皆。將。理。食。飽。不。得。急。行。及。飽。不。得。大。語。遠。人。頃。喜。卧。睡。覺。食。後。隨。其。事。業。不。得。勞。心。勞。力。覺。肚。空。即。須。食。食。不。得。忍。飢。必。不。得。食。生。硬。乾。滑。等。物。致。害。病。故。冬。間。睡。覺。腹。中。微。似。不。安。即。服。麥。門。冬。汁。等。飲。如。此。將。息。必。無。橫。疾。

養性第五

雞。鳴。時。起。就。卧。中。導。引。訖。漱。漱。即。巾。巾。後。正。坐。量。時。候。寒。溫。喫。點。心。飯。若。粥。等。若。服。藥。者。先。飯。食。服。藥。酒。消。息。訖。入。靜。燒。香。靜。念。不。服。氣。者。亦。可。念。誦。洗。雪。心。源。息。思。煩。慮。良。久。事。訖。即。出。徐。徐。步。庭。院。間。散。氣。地。濕。即。勿。行。但。屋。下。東。西。步。今。氣。散。家。事。付。與。兒。子。不。得。關。心。所。營。退。居。于。家。百。里。五。十。里。但。時。知。平。安。而。已。應。錄。居。所。要。金。今。子。弟。支。料。頻。送。勿。

令。數。數。往。來。慣。開。也。一。物。不。得。在。意。營。之。平。居。不。得。嘆。不。得。大。語。大。叫。大。用。力。飲。酒。至。醉。並。爲。大。忌。四。時。氣。候。知。時。之。日。量。其。時。節。寒。溫。出。門。行。三。里。二。里。及。三。百。一。百。步。爲。佳。量。力。行。但。勿。令。氣。之。氣。喘。而。已。親。故。隣。里。來。相。訪。問。携。手。出。遊。百。步。或。坐。量。力。宜。談。笑。簡。約。其。趣。繞。得。歡。適。不。可。過。度。耳。人。性。非。合。道。者。焉。能。無。悶。悶。則。何。以。遣。之。還。須。畜。數。百。卷。書。易。老。莊。子。等。陶。來。閱。之。殊。勝。閑。坐。衣。服。但。纓。纓。可。禦。寒。暑。而。已。第。一。勤。洗。洗。以。香。露。洗。身。數。次。浴。務。令。潔。淨。則。神。安。道。勝。也。浴。法。且。養。生。經。中。所。將。左。右。供。使。之。人。或。得。清。淨。弟。子。精。選。小。心。少。過。謙。謹。者。自。然。事。閑。無。物。相。惱。令。人。氣。和。心。平。也。凡。人。不。能。絕。嗔。得。無。理。之。人。易。生。嗔。喜。妨。人。道。性。

種造藥第六

種枸杞法

揀。好。地。熟。翻。加。糞。訖。然。後。逐。長。開。壟。深。七。八。寸。今。寬。乃。取。枸杞。連。莖。到。長。四。寸。許。以。草。爲。索。慢。束。束。如。羹。碗。許。大。於。壟。中。立。種。之。每。束。相。去。一。尺。下。束。訖。別。調。爛。牛。糞。稀。如。麪。糊。灌。束。子。上。令。滿。減。則。更。灌。然。後。以。肥。土。攤。之。滿。訖。土。上。更。加。熟。牛。糞。然。後。灌。水。不。久。即。生。乃。如。翦。法。從。一。頭。起。首。割。之。得。半。兩。料。理。如。法。可。供。數。人。其。割。時。與。地。面。平。高。留。則。無。葉。深。割。即。傷。根。割。仍。澆。熟。及。兩。中。但。早。朝。爲。佳。

又法

但。作。束。子。作。坑。方。一。尺。深。於。束。子。三。寸。即。下。束。子。訖。著。好。糞。兩。坑。填。之。以。水。澆。糞。下。即。更。著。糞。填。以。不。減。爲。要。今。糞。上。束。子。二。寸。即。得。生。後。極。肥。數。鋤。攤。每。月。加。一。糞。尤。佳。

又法

但。畦。中。種。子。如。種。菜。法。上。糞。下。水。當。年。雖。瘦。二。年。以。後。悉。

肥勿令長苗即不堪食如食不盡即剪作乾菜以備冬中常使如此從春及秋其苗不絕取甘州者為真葉厚大者是有刺葉小者是白棘不堪服食慎之

又法

枸杞子於水盆接今歲乾斷地作畦畦中去却五寸土勾作壟壟草作磚以臂長短即以泥塗磚上令遍以安壟中即以子布泥上。一面令稀稠得所以細土蓋上令遍又以爛牛糞蓋子上令遍又布土一重令與畦平待苗出時時澆澆及堪採即如剪韭法更不要求鍊鍊每種用二月初一年但五度剪不可過此也凡枸杞生西南郡谷中及甘州者其子味過於蒲桃今蘭州西去鄯城靈州九原並多根莖尤大

種百合法

上好肥地加糞熟斷訖春中取根大者摩取瓣於畦中種如蒜法五寸一瓣種之直作行又加糞灌水苗出即鋤四邊絕令無草春後看結穢得所稠處更別發亦得畦中乾即灌水三年後甚大如芋然取食又取子種亦得或一年以後二年以來始生甚速不如種瓣

種牛膝法

秋間收子至春種如種菜法上加糞水澆苗出堪採即如剪菜法常須多留子秋中種亦好其收根者別留子取三畝肥地熟耕更以長鋤深掘取其土壟長也土平訖然下子荒即生草早則澆至秋子成高刈取莖收其子九月末間選用長鋤深掘取根如法料理

種合歡法

移根畦中種一年自稠春前苗食如枸杞夏秋不堪食

種車前子法

收子春中取土地加糞熟斷水澆取如上法此物宿根但空澆而巳可數歲也

種黃精法

擇取葉參差者是真取根孽破稀種一年以後極稠種子亦得其苗甚香美堪喫

種牛蒡法

取子畦中種種時乘雨即生若有水不要候雨也地須加糞灼然肥者早即澆水澆如上法菜中之尤吉但多種食苗及根並益人

種商陸法

又取根紫色者白色者良亦及黃色者有毒根孽破畦中作行種種子亦得根苗並堪食色要者味尤佳更勝白者淨洗熟蒸不尸灰汁黃鍊並無毒尤下諸藥服丹砂乳石等入不宜服

種五加法

取根深掘肥地二尺埋一根令沒舊痕其易苗生從一頭剪取每畝畝鋤土擁之

種甘菊法

移根最佳若少時折取苗乘雨中濕種便活一年之後子落遍地長服者及冬中收子如法

種首霜法

老圃多解但肥地令熟作壟種之極益人還須從一頭剪每一畝加糞鋤土擁之

種蓮子法

又八月九月取堅黑子卷上塵尖頭直令皮薄取墮土作

熟泥封如三指大長二寸使帶頭兼重今磨須尖泥欲乾時攤置池中重頭向下自能周正薄皮上易生數日即出不磨者卒不可生

種藕法

春初掘取根三節無損處種入深泥令到硬土當年有花

種黃法 即胡麻苗也

取八錢者畦中如菜法種之苗生採食秋間依此法種之

種地黃法

十二月耕地至正月可止三四遍細耙訖然後作溝闊一尺兩溝作一畦畦闊四尺其畦端高而平硬者不受雨水苗未生間得水即爛畦中又撥作溝溝深三寸取地黃切長二寸種於溝中訖即以熟土蓋之其土可厚三寸以上每種一畝用根五十斤蓋土訖即取經冬爛糞草覆之俟稍芽出以火燒其草令燒去其苗再生者更肥後收葉益壯自春至秋凡五六遍若不得用鋤八月生後葉至春佳至時不採其根大盛春二月當宜出之若秋採至春不須重種其種生者猶得三四年但採訖把之明年轉芸而已今藥古法此為最良按本草二月八月採其根物性也八月殘葉猶在葉中精氣未盡歸根二月其葉已生根中精氣已滋於葉不如正月九月採殊妙又雲其相宜古人云二月八月非為種者特謂野生當須見其耳若食其葉但覆後摘取修葉勿損中心正葉甚益人難藏

造牛膝法

八月中長鐵強取根水中浸一宿密置篩中手揀去上皮齊頭暴令稍乾為令直即作束子又暴令極乾此者端正

若自用者不須去皮但洗令淨便暴殊有氣力

造乾黃精法

九月末掘取根揀取肥大者去目熟蒸微暴乾又蒸暴乾食之如蜜可停

造生乾地黃法

地黃一百斤揀擇肥好者六十斤有鬚者去之然後淨洗漉乾暴三數日令微皺乃取揀退四十斤者淨洗漉乾於柏木臼中熟搗絞取汁如盡以酒投之更搗絞即引得餘汁盡用拌前六十斤乾者於日中暴乾如天陰即於通風處薄攤之夜亦如此以乾為限此法比市中者氣力數倍頻取汁恐損隨日搗絞用令當日盡佳

造熟乾地黃法

斤數揀擇一準生法浸訖候好晴日便早蒸之即暴於日中夜置汁中以物蓋之明朝又蒸古法九遍止今但看汁盡色黑熟蒸三五遍亦得每造皆須春秋二時正月九月綠冷寒氣方可宿浸二月八月拌而蒸之不可宿浸也地黃汁經宿恐醞不如日日搗取汁用凡暴藥皆須以牀架上置薄簾等以通風氣不然日氣微弱則地氣止津也於漆盤中暴取好簾多汗又損汁

藕粉法

取藕藕不限多少切然淨洗截斷浸三宿換水看灼然淨訖漉出堆中碎搗絞取汁重搗絞取濃汁盡而限即以密布濾藕惡物澄去清水如稠難澄以水攪之然後看水清即瀉去一如造米粉法

雞頭粉取新熟者去皮熟搗實如上法菱角粉去皮如上法

葛根粉去皮如上法開胃口止煩熱也

葛根粉去皮如上法開胃口止煩熱也

葛根粉去皮如上法開胃口止煩熱也

葛根粉去皮如上法開胃口止煩熱也

葛根粉去皮如上法開胃口止煩熱也

葛根粉去皮如上法開胃口止煩熱也

葛根粉去皮如上法開胃口止煩熱也

葛根粉去皮如上法開胃口止煩熱也

種竹法

欲移竹先掘坑令寬下水調細土作泥如稀煎餅泥即掘

竹須四面鑿斷大作土斜連根以繩周下押緊之勿令動

著竹動則損根多不活掘訖昇入坑泥中令泥周匝糊滿

如泥少更添土著水以物勻攪令實其竹根入坑不得埋

過本根若竹稍長者以木深埋入土架縛之恐風搖動即

死種樹亦如此竹無時樹須十二月以後三月以前且去

根尺五寸留栽來年便生笋泥坑種動搖必不活

種法子法

臘月折取枝長一尺五寸以來先鑿坑一尺闊五寸取枝

屈下拗處如穗枝却向上令有葉處坑向上坑口出五寸

一邊約著土實訖即下肥土實築灼然堅訖自然必活二

年間即有子

作藥法

於地四畔掘坑深二尺闊二尺坑中熟斷酸棗熟時多取

取子坑中種之生後護惜勿令損一年後高三尺間去

惡者一尺以下留一莖稀稠行伍端直來春剝去橫枝留

距不留距恐瘡大至冬凍損剝記編依芭籬隨里交縛務

令緩舒明年更編高七尺便定種榆柳並同法木槿木芙蓉

種法

秋收取枳實破作四片於陰地熟斷加糞即種之至春

生隔一冬高一尺然後移栽每一尺種一栽至高五尺以

物編之甚可觀也

雜忌第七

屋宇宅院成後不因崩損輒有脩造及妄動土二尺以下即

有土氣慎之為佳初造屋成恐有土不氣待泥乾後於庭中

醮祭訖然後擇良日入居居後明日燒香結界發願願心不

退轉早悟道法成功德無窮無財壞結界如後平日以清水漱

口從東南方左轉誦言緊沙如羅又到西南角言你自受殃

又從東南角言緊沙如羅又到西南角言你自受殃一一如

是滿七遍盜賊皆便息心不能為害矣或入山野亦宜作此

法或在道路逢小賊作障難即安心作降伏之意呪言緊沙

迦羅緊沙迦羅一氣盡為度亦自懷散也此法秘妙於門

深秘可以救護眾生天慈悲故不用令孝子之輩魚捕之人

入宅不用輒大叫喚每栽樹木量其便利不使驚嚇

益柴炭等並年支不用每日令人出入閉巷惟務寂然論曰

看此論豈惟極助生靈亦足以誠於貪婪之士無敗禍之累

庶忠義烈士味之而知止足矣

千金翼方卷之十四

千金翼方卷第十五

叙虛損論第一

論曰凡人不能終壽或致夭殁者皆由不自愛惜竭情盡意
遺名射利聚毒攻神內傷骨髓外敗筋骨血氣將亡經絡便
塵皮裏空疎惟招盡疾正氣日衰邪氣日盛不異擊津液以
注燭火類華燄而漸消流語其易也又甚於此然疾之所起
生自五勞五傷既用二藏先損心腎受邪腑藏俱病故彭祖
論別壯異被之戒本耳陳黃精鈞吻之談斯言至矣洪濟實
多令具錄來由并貫病狀庶智者之察微防未萌之疾也五
勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞即
生六極一曰氣極氣極令人內虛五藏不足外受邪氣多寒
濕痺煩滿吐逆驚恐頭痛二曰血極血極令人無色澤恍惚
喜忘善驚少氣舌強喉乾美熱不嗜食苦睡眩胃喜嘔三曰
筋極筋極令人不能久立喜倦拘攣腹脹四肢筋骨疼痛四
曰骨極骨極令人酸削齒不堅牢不能動作厥逆黃疸消渴
癰腫疔發膝重疼痛浮腫如水狀五曰精極精極令人無髮
髮落枯落悲傷喜忘意氣不行六曰肉極肉極令人發狂如
得擊不復得言甚者致死復生七傷者一曰陰寒二曰陰痿
三曰裏急四曰精連連而不絕五曰精少囊下濕六曰精清
七曰小便苦數臨事不卒名曰七傷七傷為病令人邪氣多
正氣少忽忽喜忘而悲傷不樂羣色黧黑飲食不生肌膚色
無潤澤髮白枯槁牙齒不堅目黃淚出遠視眈眈見風淚下
咽焦消渴鼻衄唾血喉中介介不利胃中噎塞食飲不下身
寒汗出肌肉痠痛四肢沉重不欲動作膝胫苦寒不能遠行
上重下輕久立腰背苦痛難以俛仰繞臍急痛飢則心下虛

懸唇乾口燥腹裏雷鳴背脊相引痛或時嘔逆不食或時變
吐小便赤熱乍數時難或時傷多或如針刺大便堅澀時或
下血身體羸瘦陰下常濕黃汗自出陰痿消小臨事不起精
清而少連連獨洩陰端寒冷中疼痛小便餘瀝如腫而大
縮入腹中四肢浮腫虛熱煩疼乍熱乍寒卧不安席心如梓
春驚悸失脉呼吸短促時時惡夢與死人共食入塚此由
年少早娶用心過差接會汗出戴皆浮滿當風卧濕久醉不
醒及墜重落馬傷仆所致也故變生七氣積聚堅牢如杯留
在腹內心痛煩冤不能飲食時來時去發作無常寒氣為病
則吐逆心滿熱氣為病則恍惚悶亂長如肢臂又復失精喜
氣為病則不能疾行不能久立怒氣為病則上氣不可當熱
痛上衝心短氣欲死不能喘息憂氣為病則不能苦作卧不
安席志氣為病則聚在皮下不能飲食愁氣為病則平居而
忘置物還取不記處所四肢浮腫不能舉止五勞六極力乏
氣畜變成寒熱氣症發作有時受邪為病凡有十二種風風
入頭則耳聾風入目則遠視眈眈風入肌膚則身體癢癢筋
急風入脉則動上下無常風入心則心痛煩滿悸動喜腹脹
風入肺則數逆短氣風入肝則眼視不明目赤淚出發作
有時風入脾則脾不磨腸鳴脇滿風入腎則耳鳴而聾脚疼
痛腰尻不隨甚者不能飲食入膽則眉間疼痛大小便不利
令人痿痺五勞六極七傷七氣積聚變為病者甚則令人得
大風緩急濕痺不仁偏枯筋縮四肢拘攣關節隔塞經脈不
通便生百病羸瘦短氣令人無子病欲及人便即夭逝勞傷
血氣心氣不足所致也若或觸勞風氣則令人角弓反張舉
身皆動或肩頸項落惡氣腫起魂去不足夢與鬼交通或悲
哀不止恍惚恐懼不能飲食或進或退痛無常處至此為瘵

不亦難乎十二種風元不足

大補養第二論一首 方八首

論曰病患已成即須勤於藥餌所以立補養之方此方皆是五石三石大寒食九散等藥自非虛勞成就偏枯著牀惟向死近無所控生者乃可用之斯誠可以起死人耳平人無病不可造次著手深宜慎忌

張仲景紫石寒食散治傷寒已愈不復方

紫石英 白石英 赤石脂 鍾乳粉 桔梗根

防風 桔梗 文蛤 鬼臼 太一餘糧

人參 乾薑 附子炮去桂心各壹

右壹拾肆味搗篩為散酒服三寸匕

常用之佳主男子女人老少虛損及風寒毒冷下痢瘕飲飲嗽消穀助老人胃氣可以延年又主霍亂酒服二寸匕愈又主衆病休息下痢垂命欲死服之便差治人最為神驗方

人參 附子炮去皮 乾薑 桂心各伍

防風壹兩 牡蠣熬 黃芩 細辛各伍 桔梗

椒目開 茯苓 秦艽 白朮各壹

右壹拾叁味各搗篩為散更秤如分乃合之治千杵旦以溫酒服方寸匕老人類服三劑良兼主虛勞

治心腹脇下支滿邪氣衝上又心胃喘悸不得息

腹中漉漉雷鳴吞酸噎生食臭食不消化時洩時閉心腹煩悶不欲聞人聲好獨臥常欲得熱恍惚喜忘心中怵惕如恐怖狀短氣嘔逆腹中防蠲五藏不調如此邪在於內而作衆病皆生於勞苦若極意於為樂從風寒起治之皆同服此藥日未食時以清美酒服二寸匕不耐者減之去巾帽薄衣

力行方

鍾乳粉 附子炮去 桔梗根 茯苓 牡蠣各壹

桔梗 乾薑 人參 防風各壹 細辛

桂心各伍 白朮半兩

右壹拾貳味各搗篩治千杵以酒服之二也建日服之至破日止周而復始

又方說狀所主同前

鍾乳粉 人參 茯苓 附子炮去各伍 桔梗根

牡蠣熬 細辛各半 乾薑 桂心各伍 白朮

防風 桔梗各壹

右壹拾貳味搗篩為散服之二如前方有冷加椒有熱加黃芩各壹分

大補養第二論主寒冷虛損五十年心腹積聚百病邪氣往來厥逆心痺頑羸瘦骨立不能食破積聚方

烏頭炮伍分 人參伍分 生薑貳兩 前胡

蜀椒去目開口 黃芩 白朮 半夏洗

黃連 吳茱萸 龍骨 白頭翁 乾薑

細辛 桔梗 紫苑 芎藭 厚朴炙

女萎 礬石燒 桂心 甘草炙各壹兩

右貳拾貳味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大酒服拾圓日三夜以知為度

破積聚治積結冷聚陽道弱大便有血婦人產後出血不止方

烏頭炮伍分 大黃 乾薑 厚朴炙

吳茱萸 芍藥 前胡 芎藭 當歸

細辛 桂心各伍 蜀椒開口各伍 白薇半兩

黃芩 白朮 人參 紫苑 甘草
右壹拾捌味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大酒服拾圓日
參服漸漸加之

大理中藥圖 王風勞四十年癱絕冷并主欬逆上氣方

人參 桂心 吳茱萸 烏頭 礬石 附子
右伍味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大酒服三圓日再
知為度

四散發動圖 王毒冷方

礬石 桔梗 皂莢 附子
吳茱萸 等分

右陸味搗篩為末鍊蜜和丸如梧子大飲服參圓日再稍
加以知為度

解散發動第三 論第一首 方三十五首

論曰既得藥力諸病併遣石忽發動須知解方故次立解散
方焉一一依其診候而用之萬不失一夫脉或洪或實或斷
絕不足欲似死脉或細數或弦駛其所犯非一故也脉無常
投醫不能識也熱多則弦駛有癖則洪實急痛則斷絕凡寒
食藥熱者常如是自與所犯非一候也動從節度則不死矣
不從節度則死矣欲散者宜詳脉審正其候爾乃畢愈脉
沈數者難發難發者數下之脉浮大者易發也人有服散兩
三劑不發者此人脉沈難發者不令人覺藥勢已行不出形
於外但以藥治於內欲候知其力人進食多一候也顏色和
悅二候也頭面身體癢癢三候也滿滿惡風四候也厭厭欲
寐五候也諸有此證候者皆藥內發五藏但如方法服藥宜
數下之內虛自當發也

人參湯主散發諸氣逆心腹絞痛不得氣息命在轉燭方

人參 枳實 甘草 桔梗 乾薑
白朮 各壹

右陸味咬咀以水以升煮取三升分三服若短氣者稍稍
數服無苦也能如方皆佳冬月溫食宵腹熱者便冷食夏
月冷食以水服藥冷食過多腹冷者作湯即自解便止
不快樂熱往來大小便難方

白鴨通經大黃 石膏 知母 政壹升
麻黃 杏仁 桂心 附子 甘草 各壹分
右壹拾味咬咀以湯壹斗貳升淋鴨通乃以汁煮藥取三
升半去滓然後內政更煮三沸去政未食煎服一升

治眼湯主散家患氣不能食苦果逆方

人參 茯苓 桂心 厚朴 半夏 洗

甘草 麥門冬 生薑 大棗 各壹分
右玖味咬咀以水捌升煮取貳升陸合分服未合

主散發頭欲裂眼疼欲出惡寒骨肉痛狀如傷寒臍中清涼
出方

以香政五升整令煙出以酒壹斗投之濾取汁任性飲
多少欲令小醉便解更飲之取解為度亦主時行寒食
散發或口噤不可開腸滿腹急欲決此久坐溫衣生食
所為皇甫云口不開去齒下此酒五合熱飲之更更開
能者多飲至醉益佳不能者任性腹脹滿不通導之令下
善服散家發飲心胃客熱悶者吐之方

甘草 他兩生用

右壹味咬咀以酒五升煮取二升半空腹分再服之服別
相去如行伍六里快吐止

主散發黃胃中熱氣悶方

胡安 壹把切

右壹味以水柒升。煮取貳升。分再服。便愈。如不差。更作

亦主通身發黃者。濃煮大黃。葉令溫。自洗漬。尤良。并主熱

毒。及胃中。毒氣相攻。若不盡。復煩悶。或痛飲。如故。亦主新

熱下痢

解散主諸石熱毒方

白鴨通伍升。新者

右壹味湯壹斗。漬少。澄清。候冷。飲之。任性多少。以差為度

三散主解散發腹痛脹滿卒急方

大黃 黃連 黃芩 各壹兩

右叁味。以水柒升。煮取三升。分爲三服。作一

散。發時。行兼有客熱。下血痢。不止。而煩者。黃連湯方

黃連 黃蘗 各壹兩 梔子 散 阿膠 壹兩 乾薑 散

右藥 石榴皮 各壹兩 切 黃連 散

右柒味。以水壹斗。煮取三升。分三服。一

乳石發。頭痛。寒熱。胃中。塞。日。哺。手足。煩。鬱。方

生麥門冬 壹斤 切 葱白 壹斤 切 三升

右叁味。煮湯。捌升。煮取二升。分三服

散發虛羸。不能食。飲大便不通。調藏。臍方

麥門冬 壹斤 切 人參 壹斤 切 竹節 壹斤 切 大棗 壹斤 切

茯苓 半斤 切 生薑 半斤 切 甘草 半斤 切 桂心 半斤 切

右壹拾味。以水壹斗。煮取叁升。分三服

散發四肢腫方

甘遂 壹兩 木防己 壹兩 茯苓 壹兩 白朮 壹兩

麻黃 壹兩 甘草 壹兩 切

右柒味。以水柒升。煮取二升。捌合。分三服

散發口瘡方

龍膽 壹兩 子藥 壹兩 黃連 貳兩 升麻 壹兩

右肆味。以水四升。先煮龍膽。黃連。取升。別取子藥

冷水淹浸。投湯中。令相得。絞取汁。熱含。冷吐。差止

散發如淋熱方

葵子 壹升 茯苓 壹兩 大黃 壹兩 通草 壹兩 葱白 壹兩

右玖味。以水壹斗。煮取六升。去滓。內藥。重煮。取

參升。去滓。內芒消。更煮一沸。令消盡。分爲四服。日三夜一

散發大便秘澀不通方

大黃 肆兩 桃仁 壹兩 切 杏仁 壹兩 切 麻子 壹兩 切

右貳味。以水陸升。煮取貳升。分再服

又大便秘不通方

生地黃汁 五合 大黃 壹兩 甘草 壹兩 切

右叁味。以水壹升。煮取壹升。下地黃汁。又煮三沸。分

二服

單服硫黃發為瘡方

以大醋和。攪研。熟。如膏。以塗瘡上。燥。輒易之。甚良

以石發。亦作瘡。狀如癰。子紫。石多發於腹背。或著四肢。直以

酥摩。便差。仍用。薤白湯方

薤白 壹斤 切 麥門冬 壹斤 切 乾薑 壹兩 切 麻黃 壹兩 切

右捌味。以水玖升。煮取叁升。分三服。從旦至晡。乃盡

日。日合服。以差為度。非但。石凡。諸石發。皆用此方

散發瘡癰血方

黃連 乾薑 芍藥 生竹皮 桂心 甘草 瓜子 壹升

右壹拾味以水壹斗煮竹皮取捌升去滓內藥煮取貳升分三服一日盡

新羅大黃國主寒食散成痰飲癖水氣心痛白節俱腫方

大黃 葶藶 乾薑 巴豆 杏仁 芍藥 蜜相和 右伍味各搗大黃為末別搗巴豆杏仁如脂鍊蜜相和 令相得又更搗壹升并空腹以飲服如麻子一九日再不 知增至貳圓強人服九如小豆大

羅苦渴大虛等方 主男子女入驚厥口乾心下堅羸瘦不能食喜卧 墜墮血痰火秋上氣皆痛足腫不仁而冷少腹滿而痛身重 目眩百節疼痛上虛下實又主女人乳餘痰帶下五藏散癖 伏熱大如梔堅腫在心下胃中津液內結浮腫膝寒蠱毒淫

消石 蜀椒 水蛭 大黃 壹斤 茯苓 陸兩 柴胡 去苗 芍藥 伍兩 蟅蟲 伍兩 去足 乾薑 伍兩 去炮 右玖味搗篩為末鍊蜜和更搗萬杵圓如梧子大空腹以 飲服伍圓日三服五日進十九此皆不下自此以後任意 加之一日可數十丸與羊臙自補若利當益下之勿於圓 尤慎風冷若女人月經閉加桃仁三十枚去皮以酒服十 加九日三不知可稍增當下 如豆升長蟲腹中有病皆除

解散雷氏千金九方 消石 陸分 大黃 肆兩 巴豆 壹分 去心 右叁味搗篩為末鍊蜜和九如小豆許飲服一九日二以 利為度

主散發五藏六腑三焦冷熱不調痰結胃中強飲百 數不安服強氣方 細辛 杏仁 乾薑 澤瀉 乾薑 白朮

茯苓 桂心 甘草 附子 木防己 羌活 甘遂 右壹拾伍味各搗篩為末別治杏仁如脂合搗百杵鍊白 蜜和更搗五千杵九如梧子大以酒服貳九日再服不能 者如大豆二九以知為度散家困於痰癖無處困者參 服此九暨相發助又不令越逸消飲去結癖令胃腸無痰 無逆寒之患又今人不眩滿迷悶

大青 麥門冬 香豉 石膏 葶藶子 枳實 芍藥 知母 右壹拾伍味搗篩為末鍊蜜和九如梧子大以飲服五九 日二九五日不知則更服之以知為度 下藥法 凡散數發熱無賴當下之諸丹及金石等用此方下之 黍米參升作糜以成煎猪脂一斤合和之使熟宿不食 明旦早食之令飽晚當下藥煎隨下出神良下藥盡者 後不復發若發更服之

又方 肥猪肉 伍斤 葱白 蘇白 各半 右叁味食煮之旦不食噉之一頓令盡為度 壓藥發動數數患熱用求下却之方 取猪腎脂勿令中水盡取以火炙之承取脂適寒溫一

取猪腎脂勿令中水盡取以火炙之承取脂適寒溫一

服二三合一日一夜可五六升藥稍隨大便去其良又方

肥猪肉作臛一升調和如常法平旦空腹一頓食之須臾間腹中雷鳴鳴定便下藥隨下出以器承取以水淘汰取石不盡更作如前服之

凡散發瘡腫方

生胡粉 薰青子熟別 杏仁去皮尖 黃連去末

水銀 猪脂

右陸味並等分惟水銀倍之以脂和研令相得更以水銀

治瘡目三

有發赤腫者當摩之以膏方

生地黃兩 大黃兩 杏仁去皮尖 生商陸根兩

右肆味切以醋漬一宿以猪脂一升煎商陸黑去滓膏成

日三摩之

散發有生細瘡者此藥主熱至捷方

黃連 芒消各伍

右貳味以水捌升煮黃連取四升去滓內芒消令沸以布

塗貼著上多少甘著之

洗瘡湯方

黃連 黃芩 芒參各兩

右叁味切以水三斗煮取一斗去滓極冷乃洗瘡日三

治發瘡痛癢不可堪忍方

取冷石棣下篩作散粉之日五六度乃燥瘡中自淨無

不差良

凡服散之後身體浮腫多是取冷所致宜服檳榔湯方

大檳榔五枚

右壹味先出子擣作末細篩然後咬咀其皮以湯洗升煮取貳升內子末分為再服服盡當下即愈

解散大麥麩方

取大麥炒令汗出燂便止勿令太焦春去皮淨淘蒸令熟

暴乾熬令香細末綿下以冷水和服三寸匕日再有赤

腫者當摩之以蜜亦佳

補五藏第四方四十五首

主心氣不足驚悸汗出心中煩悶短氣喜怒悲憂悉

不自知咽喉痛口腎黑嘔吐舌本強水漿不通方

紫石英 茯苓 遠志 甘草 赤小豆 大棗

麥門冬 桂心

右壹拾壹味

主心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自覺喉咽痛

時吐血舌本強水漿不通方

麥門冬 桂心 茯苓 紫石英 人參

甘草 大棗 赤小豆

右玖味

以水捌升煮取貳升伍合分為三服早春夏

服之

主心氣虛驚悸喜忘不進食補心方

遠志 黃芩 鐵精 乾薑 桂心

人參 防風 當歸 芎藭 紫石英

茯苓 茯神 獨活 甘草 五味子

半夏 洗 麥門冬 桂心

右壹拾捌味以水壹斗參升煮取參升伍合分為伍

服日三夜二

心氣不足心痛驚恐方

遠志去心 昌蒲 人參 茯苓各半

右肆味咬咀以水壹斗煮取叁升分叁服

陽事不舉腰脊痛背相引痛不能俯仰方

茯苓 遠志去心 乾地黄各貳兩 大棗叁枚

附子炮去 生薑切 甘草炙

右壹拾肆味咬咀以水壹斗伍升煮取三升半去滓內飴

糖阿膠更煎取三分二合分三服

主男子女人虛損夢寐驚悸失精女人赤白淫漏或

月水不通風邪鬼疰寒熱往來腹中積聚憂急結氣諸疾皆

悉主之方

紫石英 茯苓 昌蒲 菴蓂 遠志去心

麥門冬心 當歸 細辛 卷柏 乾薑

大豆卷 防風 大黃各伍 麝蟲拾貳 大棗伍枚

乾地黄各三 人參 澤瀉 丹參 秦艽各半

芍藥 石膏研 烏頭炮去 柏子仁 桔梗

桂心各壹 半夏洗 白朮各貳 鐵精 白斂

銀屑 前胡 牛黃各半 罌頤 甘草各貳

右叁拾伍味搗篩為末鍊蜜及棗膏和之更搗五千杵水

如梧子飲服五九日三稍稍加至貳拾圓以差為度

大棗心圓 所主與前同凡患心病皆悉服之方

乾地黄壹兩 牛黃伍分 杏仁伍枚

蜀椒汗各三分 桑螵蛸拾貳枚 大棗三枚

白斂 當歸各半 澤瀉 大豆齊 黃耆

鐵精 柏子仁 前胡 茯苓各壹 獨活

秦艽 芎藭 桂心 人參 麥門冬去心

遠志去心 丹參 阿膠多 防風 紫石英

乾薑 銀屑 甘草壹兩

右貳拾玖味搗篩為末鍊蜜及棗膏和更搗五千杵九如

梧子酒服柒圓日三加至二十九千金有署

主肝氣不足兩脇滿筋急不得太息四肢厥寒熱偏

癰淋瀝石少腰尻少腹痛婦人小腹四肢痛乳癰膝膠熱轉

筋遺溺痛渴爪甲青枯口禁面青太息疝瘕上搶心腹中痛

兩眼不明悉主之方後兩行

薤仁 柏子仁各壹 茯苓半兩 烏頭炮四枚

大棗叁枚 牛黃 石膽 桂心各壹 細辛

防風 白朮 甘草叁兩

右壹拾貳味咬咀以水壹斗煮取二升八合分三服用方

主肝氣不足兩脇下滿筋急不得太息四肢瘕瘕上

搶心腹痛目不明方

茯苓壹兩 烏頭肆枚 大棗貳拾肆

薤仁 柏子仁 防風 細辛各貳 山茱萸

桂心各壹 甘草捌分 炙

右壹拾味咬咀以水捌升煮取二升分三服常用

主肝氣不足目暗四肢沉重方

人參 半夏洗 白朮三升 生薑壹兩 細辛壹兩

茯苓 黃芩 前胡 桂心 甘草各壹

右壹拾味咬咀以水捌升煮取三升分三服三五日後次

服後湯方

茯苓參兩 吳茱萸壹兩 大棗拾枚 桃仁壹兩 杏仁壹兩 及

人參 防風 烏頭皮 柏子仁 橘皮

桂心 甘草炙

右宜拾壹味以水壹斗煮取貳升半分三服細辛

補肺湯主肺氣不足病苦氣逆背腹滿欬逆上氣搶喉中

閉塞欬逆短氣氣從背起有時而痛惕然自驚或笑或歌或

怒無常或乾嘔心煩耳聞風雨聲面色白口中如含霜雪言

語無聲劇者吐血方

五味子參兩 麥門冬參兩 去

梗米壹合 紫苑 乾薑

桑根白皮 人參 鍾乳研 竹葉壹兩

右宜拾壹味以水壹斗煮取貳升桑白皮及捌升去滓內藥

煮取三升分三服

平肺湯主肺氣虛竭不足之氣背中乾口中碎碎乾方

麻黃大節 橘皮拾兩 小麥壹升

右宜拾壹味以水伍升煮取壹升半分再服

肺湯主肺氣不足而短氣欬唾膿血不得卧方

人參 生薑 桂心 阿膠炙 紫苑各壹兩

乾地黃壹兩 桑根白皮 飴糖各壹兩

右捌味以水壹斗伍升煮桑根白皮貳拾沸去滓內

藥煮取貳升伍合內飴糖令烊分三服

傷中湯主傷中肺氣不足腹下痛上氣欬唾膿血不欲食惡

風目視眩暈足脛腫方

生地黃壹兩 桑根白皮伍升 生薑五兩

白膠伍兩 麻子仁 芎藭各壹兩 紫苑壹兩 麥種

飴糖壹兩 桂心 人參 甘草炙

右宜拾貳味以水壹斗煮取壹升桑根白皮取柒升去滓內

藥煮取伍升登去滓內飴糖煎取三升分爲三服

溫液湯主肺痿涎唾多心中溫溫液液方

甘草參兩

右宜拾壹味以水參升煮取壹升半分三服

治肺癰欬背中滿而振寒脉數咽乾不渴時時出濁唾腥臭

久久吐膿如粳米粥者方

桔梗參兩 甘草壹兩

肺湯主肺氣不足背痛牽脊上氣失聲方

白石英 五味子拾兩 桂心貳兩 大棗伍枚

麥門冬拾兩 款冬花 桑白皮 乾薑 甘草壹兩

右玖味搗篩爲散以水壹升煮取捌合及熟投一升寸

已服日三亦可酒煮以知爲度

肺湯主肺氣不足失聲背脊上氣息鳴方

麥門冬拾兩 款冬花 白石英 桑根白皮拾兩 桂心壹兩

五味子拾兩 鍾乳伍分 研爲

右玖味搗篩爲末以棗膏和爲圓如梧子大以飲下拾伍

圓日三

肺湯主醉酒勞瘁汗出當風背中小氣口乾喘息骨痛甚

者吐逆致吐血方

款冬花 桂心 附子炮去 蜀椒去目開口

五味子 紫苑 茯苓 杏仁去皮尖 遠志去心

茯苓

石斛各壹兩 細辛

乾薑各壹兩 百部

甘草

各壹兩

右壹拾捌味各壹兩 搗篩為散酒服方寸匕日三

主脾氣實中滿不能食方

茯苓

厚朴各壹兩 桂心

伍兩 生薑

兩半夏各壹兩 去滑

人參

黃芩

甘草各壹兩

右捌味各壹兩 以水壹斗各壹兩 煮取叁升分三服又主冷氣在脾

藏走四肢手足流腫亦逐水氣

治脾氣實其人口中淡甘甘甘情情痛無常變及嘔吐及胃並

主之方

大黃陸兩

右壹味破以水陸升各壹兩 煮取壹升分再服又主食即吐并大

便不通者加甘草貳兩各壹兩 煮取貳升半分三服

主脾氣不足虛冷注下腹痛方

當歸

乾薑

黃連

龍骨 赤石脂

人參

橘皮

附子炮去

秦皮 大黃各壹兩

半夏

各壹兩

右壹拾壹味各壹兩 以水壹斗各壹兩 煮取三升一合分四服

主不欲食留腹中或上或下煩悶得食輒嘔欲吐已

即脹滿不消噎腥臭發熱四肢腫而苦下身重不能自勝方

麻子仁

餘糧各壹兩 桑根白皮

壹斤 大棗各壹兩

黃連

乾薑

白朮

甘草各壹兩

右捌味各壹兩 以水壹斗各壹兩 煮取半去滓得二升九合日壹服

三日令盡老小任意加減

主脾氣不調使身重如石飲食即嘔四肢酸削不收方

生地黄

黃耆

芍藥

甘草各壹兩 生薑各壹兩 貳兩

白蜜壹升

右陸味各壹兩 以水玖升各壹兩 煮取叁升去滓內蜜攪令微沸服

捌合日三夜

主脾氣不足下焦虛冷胃中滿塞汗出脇下支滿或

吐血及下血方

乾地黄各壹兩 黃耆

芍藥

甘草各壹兩

右肆味各壹兩 以酒三升各壹兩 漬之三斗米下蒸以銅器承取汁隨

多少服之

主脾氣不足虛弱下痢上入下出方

乾薑

大黃各壹兩 人參

附子炮去

甘草各壹兩

右伍味各壹兩 以水捌升各壹兩 煮取貳升半分三服

主脾氣不足水穀下痢腹痛食不消方

半夏各壹兩

乾薑

赤石脂

白石脂

厚朴

桂心各壹兩

當歸

芍藥

附子炮去 人參

甘草各壹兩

右壹拾壹味各壹兩 以水玖升各壹兩 煮取三升分三服

主脾氣不調有熱或下閉寒調五藏治嘔逆食飲方

大黃陸兩 杏仁

芍藥各壹兩

茯苓

芍藥各壹兩 細辛

半夏各壹兩

玄參

茯苓

當歸

桂心各壹兩

右壹拾肆味各壹兩 搗篩為末鍊蜜和丸如梧子飲服六丸日三

增至十圓

主毒風在脾中流腫腹滿短氣食輒嘔不消時時

微下方

乾薑

當歸

桂心

葶藶各壹兩 狼毒

大黃 苦窮 蜀椒去目及開 白微

附子炮去 甘遂 吳茱萸各半

右壹拾貳味 搗篩為末 鍊蜜和圓如梧子 飲服三九日三

法麴 主脾中冷水穀不化 脹滿 或時寒 極方

大麥蘖 吳茱萸 各五合 枳實參枚

乾薑 細辛 桂心 五兩 桔梗 附子炮去

右壹拾壹味 搗篩為末 鍊蜜和圓如梧子 酒服柒圓日三 加至拾伍圓

主大病後至虛羸瘦 不能食 食不消化方

小麥麴 蜀椒去目及 乾薑 吳茱萸

大黃 附子炮去 厚朴 當歸 桂心

甘草各兩

右壹拾味 搗篩為末 鍊蜜和圓如梧子 酒服十五圓日三

主胃氣弱 大腹冷則下痢 小腹痛即小便難 防嚮腹

法麴 小麥蘖 各五合 吳茱萸 枳實參枚

人參 桔梗 麥門冬 乾薑 附子炮去

細辛 桂心 厚朴 當歸 茯苓

甘草各兩

右壹拾伍味 搗篩為末 鍊蜜和圓如梧子 空腹飲服七九

日三亦可加大黃二兩

主胃中寒熱 嘔逆 胃中微痛 吐如豆羹汁 或吐血方

阿膠 芍藥 乾地黃 乾薑 石膏

人參 黃芩 甘草各兩

右捌味 咬咀以水酒各參升 煮取三升分三服

胃脹腸主胃氣不足 心氣少 上奔 胃中憤悶 寒冷 腹中絞痛

吐痢宿汁方

人參 薑 茯苓 橘皮 乾薑 甘草各兩

右伍味 搗篩為末 鍊蜜和更搗五百杵 九如梧子 以水二

升銅器中火上煮二十九一沸 不能飲者服一升日三可

長將服一名胃服九又名補藏湯

主胃痛 煩煩噎噎 逆胃中氣滿 腹脇下邪氣寒 壯積聚

大小便乍難 調六腑安五藏 達達腸胃 令人能食 并主女人

絕產方

大黃 細辛 黃連 蜀椒去目及開

皂莢炙去 當歸 桂心各兩 杏仁去皮尖

黃芩 葶藶 阿膠 芒消 厚朴各兩

甘草各兩 半夏洗分

右壹拾伍味 搗篩為末 鍊蜜和九如梧子 空腹酒服伍九

日三稍加至拾圓

主噎噎 以上熱 惕惕驚恐 時悲淚出 時復喜怒 妄

語 惡酒 洒酒 頭痛 少氣 時如醉 狀不能食 噫聞食 臭欲

大小便不利 或寒熱 小便赤黃 惡風 目視眈眈 耳中兜兜

方

防風 澤瀉 白朮 蛇狀子 吳茱萸

細辛 昌蒲 烏頭炮去 五味子各壹分

當歸 遠志去心 桂心各兩 乾薑參分

右壹拾參味 搗篩為末 鍊蜜和九如梧子 日

三加至十九華化方

主腎氣不足 心中忙忙而悶 目視眈眈 心懸少氣 陽

氣不足 耳聾 目如星火 瘡渴疽痔 一身悉癢 骨中疼痛 小

弱拘急之氣 難咽咽乾 唾如膠色 黑方

磁石 生薑切 五味子 防風 牡丹皮

玄參 桂心 甘草炙各附子 大豆黃連

右壹拾味咬咀以水壹斗貳升銅器中揚之三百遍內藥

煮取六升去滓更煎得三升八合分為三服

腎湯主腰以下冷痛而重如帶五千錢小便不利方

茯苓 白朮各兩 乾薑貳兩 甘草壹兩

右肆味咬咀以水六升煮取三升分三服

治腎間有水氣腰脊疼痛腹背拘急絞痛方

茯苓 白朮 澤瀉 乾薑各兩

右肆味咬咀以水捌升煮取參升分三服

又方

茯苓 白朮各兩 飴糖兩 乾薑 甘草各兩

右伍味咬咀以水壹斗煮取三升內飴糖煎之令烊分為

四服

大補腎湯主腎氣腰背疼痛方

磁石 石斛 茯苓 橘皮 麥門冬去心

芍藥 牛膝 棘刺 桂心各參 地骨皮三升

人參 當歸 五味子 高良薑 杜仲各兩

此藥各兩 乾薑各兩 遠志各兩 乾地黃各兩 甘草各兩

右貳拾味咬咀以水肆升煮取壹升分十服

腎湯主五勞七傷中虛竭腎氣不足陰下羸小便餘瀝

忽忽喜忘悲愁不樂不嗜食飲方

署預 石斛各參 茯苓 黃耆各參 羊腎各具

茯苓 五味子 遠志去心 當歸 澤瀉

人參 巴戟天 防風 附子炮去 乾薑

天雄炮去 乾地黃 獨活 桂心 棘刺

杜仲炙 菟絲子各兩

右貳拾味咬咀為散以水壹斗煮取九如梧子空腹酒服十九

日三稍加至貳拾圓

腎湯散主五勞男子百病方

防風 黃耆 山茱萸 白斂 厚朴炙

芍藥 署預 麥門冬去心 天雄炮去 甘草各兩

獨活 菊花 秦艽 細辛 白朮

枳實炙 柏子仁各兩 當歸 芎藭 菟絲子

茯苓 桂心各兩 石斛 乾薑 人參各兩

鍾乳研 蜀椒口皆 附子炮去 白石英各兩

烏頭各兩 羊腎各具 黃耆各兩

右參拾貳味咬咀為散酒服方寸匕日二加至二匕日三

腎湯主男女諸虛不足腎氣之方

消石 礬石各兩

右貳味咬咀為散以梗米粥汁一升內一方寸匕攪令和

調頭服之日三不知稍增

五藏氣虛第五方九首

大補腎湯主五藏內虛竭短氣數逆傷損腎氣不足下氣復通

津液方

麥門冬去心 小麥各壹升 粳米各壹合 地骨皮 薤白各壹升

人參 五味子 桂心 甘草各兩 生薑各兩

右壹拾味咬咀以水壹斗貳升煮取三升分三服口乾先

煮竹葉一把減一升去滓內藥煮之

腎湯主男子五勞七傷中虛諸害食之氣喘通兩脇下

脹少腹急痛宛轉欲死調中平藏氣理傷絕方

人參 茯苓 芍藥 當歸 白糖

桂心 甘草 蜀椒 生薑

前胡 橘皮 五味子 枳實

麥門冬 大棗 枳實

右壹拾伍味以東流水壹斗伍升漬藥半日以三歲

陳蘆微燉取四升去滓內糖令消二十以上六十以下

服一升二十以下六十以上服藥捌合又羸者服七合日

三夜一

治手足厥寒脈為之細絕其人有寒者當歸藥更四逆湯方

當歸 芍藥 桂心 吳茱萸 生薑 細辛 通草 甘草

右玖味以水各四升煮取三升分四服

治下痢清穀內寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反惡寒其人

面赤或腹痛乾嘔或咽痛或痢止脈不出通脈四逆湯方

甘草 大附子 乾薑 芍藥 通草 細辛 桂心 吳茱萸 生薑

右叁味以水三升煮取一升二合分再服脈即

出也面赤者加葱白九莖腹痛者去葱白加芍藥貳兩

者加生薑貳兩咽痛者去芍藥加桔梗壹兩痢止脈不出

者去桔梗加人參貳兩

王虛勞不足汗出而悶脈結心悸行動如常不出百

日危急者二十一日死方

生地黃 生薑 麥門冬 麻子仁 阿膠 大棗 人參 桂心 甘草

右玖味以水壹斗煮取陸升去滓內糖服日三夜三

若脈未復隔日又服一劑力弱者二日一劑乃至五劑十

劑以脈復為度宜取汗越公楊素因患失脉七日服五劑

而復

引車口乾燥目暗眩暈憤憤不樂胃中氣逆不下食飲中

榮然痛小便赤黃尿有餘瀝夢與鬼神交通失精驚恐虛乏

方 人參 龍骨 澤瀉 黃耆 大棗 芍藥 桂心 甘草 乾薑 細辛 五味子 生薑

右壹拾伍味以水一斗煮取二升半去滓內糖令消

一服八合相去如行十里又

所主與前同

右陸味以水七升煮取三升去滓內糖一服一升

日三服已載傷寒中此再見之

大棗 芍藥 桂心 生薑 乾薑 細辛 五味子 生薑

右陸味以水七升煮取三升去滓內糖一服一升

日三服已載傷寒中此再見之

大棗 芍藥 桂心 生薑 乾薑 細辛 五味子 生薑

右陸味以水七升煮取三升去滓內糖一服一升

日三服已載傷寒中此再見之

大棗 芍藥 桂心 生薑 乾薑 細辛 五味子 生薑

右陸味以水七升煮取三升去滓內糖一服一升

日三服已載傷寒中此再見之

大棗 芍藥 桂心 生薑 乾薑 細辛 五味子 生薑

右陸味以水七升煮取三升去滓內糖一服一升

日三服已載傷寒中此再見之

大棗 芍藥 桂心 生薑 乾薑 細辛 五味子 生薑

右陸味以水七升煮取三升去滓內糖一服一升

日三服已載傷寒中此再見之

大棗 芍藥 桂心 生薑 乾薑 細辛 五味子 生薑

右陸味以水七升煮取三升去滓內糖一服一升

或酒。此是腎虛所致主之方

菴蘭子 酸棗仁 大豆卷 薏苡仁 車前子

蔓荊子 枳實子 冬瓜子 菊花 秦椒各五兩

阿膠燉介

右壹拾壹味各搗細下為散合和得令相得食後服三合日再若苦筋等骨節痛難以屈伸倍酸棗仁菴蘭子黃瓜子各三升久服不老益氣輕身耳目聰明

大五續圓主五藏勞氣七傷虛損不足冷熱不調飲食無味

署預 石龍芮 覆盆子 乾地黃 五味子各兩

石南 秦兌 五加皮 天雄炮去 狗脊

人參 黃耆 防風 山茱萸 白朮

杜仲炙 桂心各兩 麥門冬去心 巴戟天各兩 宣兩

遠志酒兩半去 石斛 菟絲子 天冬各兩 參兩

蛇牀子 草薢解半 茯苓伍分 乾薑叁分 肉蓯蓉參兩

右貳拾捌味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子壹腹以酒服十

圓日三稍加至叁拾圓

諸虛勞損方

署預 牛膝 菟絲子 澤瀉 乾地黃

茯苓 巴戟天 赤石脂 山茱萸 杜仲各兩

茯苓肆兩 五味子壹兩

右壹拾貳味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子消服貳拾圓日

一夜一瘦者加燉煌石膏貳兩使心加遠志貳兩少津液

加柏子仁貳兩慎食蒜醋陳臭等物

補虛風勞方

署預 牛膝 續斷 巴戟天 菟絲子

茯苓 枸杞子 五味子 杜仲各兩 蛇牀子

茯苓

山茱萸各叁 茯苓壹兩

右壹拾貳味搗篩為散酒服方寸匕日二夜一惟禁蒜醋

健忘加遠志茯苓神體澀加柏子仁各貳兩服三劑益肌肉

亦可為圓

諸虛勞損方主頭面有風牽引眼睛疼痛偏視不明方

署預伍兩 細辛壹兩 天雄炮去 秦兌各兩 桂心

羌活 山茱萸各兩

右柒味搗篩為散酒服方寸匕日三

補虛勞損方

桂心 牡丹皮 澤瀉 署預 芍藥各肆

玄參 茯苓 山茱萸各伍兩 附子壹兩 炮去

乾地黃捌兩

右壹拾味搗篩為末鍊蜜和丸如梧子以酒服二十九稍

加至三十九以知為度

張仲景八味腎氣丸方

乾地黃捌兩 澤瀉貳兩 桂心貳兩 署預肆兩

山茱萸肆兩 牡丹皮 茯苓各伍兩 附子壹兩 炮去

右捌味搗篩為末鍊蜜和丸如梧子以酒服七九日三稍

加至十九久長可服

服大補益散方

肉苁蓉 乾棗肉 石斛各兩 枸杞子 菟絲子

續斷 遠志各伍兩 天雄壹兩 乾地黃貳兩

右玖味搗篩為散酒服方寸匕日二無所忌

補虛主陽氣斷絕不起方

白石英 陽起石 茯苓 菟絲子

乾地黃各兩 五味子 石斛 桔梗

防風各半 茯苓各半 杜仲續命

右捌味搗篩為散酒服方寸匕日一服

三人九子圖 主五勞七傷補益方

酸棗仁 柏子仁 薏苡仁 蛇牀子 拘杞子

五味子 菟絲子 菊花子 菴蘭子 蔓荊子

地膚子 烏麻子 乾地黄 罌頰 桂心

右壹拾伍味各貳兩加茯苓貳兩搗篩為末鍊蜜和圓如

梧子酒服二十九日二大主腎虛方

療氣及虛方千金方云治氣及補五臟功

白石英續命 石斛子壹 菟絲子壹兩

茯苓 澤瀉 橘皮各壹兩

右柒味先取白石英無多少以鐵鉗碾上細打去間者及

惡物屬縣惟取向日看明微著搗篩節於銅盤中水研之

如米粉法三度研訖澄之漸漸却水暴令涸泥然看上有

不淨之物去之取中心好者在下有惡物亦去之所得好

者更研令熟以帛鍊袋盛置甕甕合上以參斗米下蒸之

飯熟下懸袋日中乾之取出更研然後搗諸藥下篩摠於

甕器中研令相得酒服方寸匕日二不得過之忌猪魚鵝

鴨蒜生冷酢澆

治腰痛方

鹿角末酒服方寸匕日二服

千金翼方卷第十六

諸酒第一 方二十首

主八風十二痺方

獨活 石南各兩 防風參兩 茵芋

附子去皮 烏頭去皮 天雄各兩

右柒味切以酒貳斗漬六日先食服壹服半合以知為度

主八十三種風著人頭面腫痒眉髮墮落手脚拘急不得行步夢與鬼神交通或心煩恐怖百脉自驚轉加羸瘦略出要者不能盡說方

牛膝 石南各兩 烏頭去皮 天雄去皮

茵芋各兩 細辛伍分

右摩味切以酒壹斗貳升漬之春秋五日夏三日冬七日初服半合治風癰宿癖服之即下強人日三老小日一不知稍加惟禁房室及猪肉等

主新久風體不仁或垂曳或拘急腫或枯焦施連方

茵芋 狗脊 烏頭去皮 附子各兩

天雄各兩

右陸味切以酒壹斗漬八九日服半合以知為度

主積年八風五注舉身痺曳不得轉側行步蹇躄不能收攝又暴口喎失音言語不通利四肢脊筋皆多肉疽血脉曲伸掌痺脇起腫痛流走無常處勞令積聚少氣或寒或熱三焦脾胃不磨飲澀結實逆害飲食醋咽嘔吐食不生肌醫所不能治者悉主之方

金牙燒碎之如 細辛 地膚子若無子用

地黃 附子去皮 防風 蜀椒口開

千金翼方 卷十六 中風上

茵芋 胡蘆根各兩 羌活壹斤

右壹拾味切以薤中清酒四斗漬之密泥封勿洩春夏三四宿秋冬六七宿去滓服一合此酒無毒及可小醉不盡一劑病無不愈矣又令人肥健盡自可加諸藥各參兩

惟蜀椒五兩用酒如法勿加金牙也此酒勝針灸治三十九諸風痺中神驗冷加乾薑四兩一方用升麻四兩年諸風痺中神驗冷加乾薑四兩一方用升麻四兩年諸風痺中神驗冷加乾薑四兩一方用升麻四兩

主除風氣通血脉益精氣定六腑明耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更生服藥二十日力勢倍六十日志氣充強八十日能夜書百日致神明房中盈壯如三十時力能引弩

有人服藥年七八十有四男三女隴西韓府君筋急兩膝不得屈伸手不得帶衣起居增劇惡風寒冷通身流腫生瘡藍田府君背痛不能立面目萎黃服之二十日身輕目明房室盈壯病在腰膝藥悉主之常山太守方

天雄去皮 茵芋各兩 蜀椒口開 躑躅各壹

白欬參兩 烏頭去皮 附子去皮 乾薑各兩

右捌味切以酒參斗漬之春夏五日秋冬七日去滓初服半合為始稍加至三合暴滓為散服方寸匕日三以知為度夏日熱酒酸以油單覆下垂并中近水不酸也

主百病風邪狂走少腹腫脹瘕瘕霍亂中惡飛尸道注暴瘕傷寒中風濕冷頭痛身重諸病寒熱風虛及頭風服酒當從少起藥發當吐清汁一二升方

芫青 巴豆去皮 斑蝥各壹拾枚 附子去皮

躑躅 細辛 烏頭去皮 乾薑

蜀椒口開 天雄各兩 黃芩各壹 桂心

右壹拾貳味切以酒壹斗漬十日每服半合日貳應苦煩
則飲壹升水解之以知爲度

主久風枯癱三十年著狀及諸惡風有毛瘡落方

獨活 烏頭去皮 乾薑 地黃 礬石燒

丹參各壹兩 白芷貳兩 蕪夷 芫花 柏子仁各壹兩

人參 甘遂 狼毒 茯苓 蜀椒去目

防風 細辛 礬石燒 牛膝 寒水石

茯苓 金牙燒 蘇黃去節 芍藥 當歸

柴胡 枸杞根有金作 天雄去皮 烏頭去皮 各

附子去皮 署預 杜仲炙 石南 牡蠣熬

山茱萸 桔梗 牡荊子 款冬各壹兩 白木各分

石斛貳分 桂心壹分 蘇子壹升 赤石脂貳兩

右肆拾貳味切以酒貳斗漬之夏三日春秋六日冬九日

壹服半合當密室中合藥勿令女人六畜見之至二日清齋

乃合藥加麥門冬貳兩大棗四十枚更佳也千金有

主八風十二痺偏枯不隨宿食並冷五勞七傷及

女人產後餘疾月水不調方

遠志去心 礬石燒 白朮 石斛貳兩 蜈蚣貳枚

狼毒 礬石燒 白朮 附子去皮 半夏洗

桂心 石南 白石脂 續斷 龍膽

芫花 玄參 白石英 代赭 蘭茹

石韋去毛 天雄去皮 寒水石 防風 桔梗

藜蘆 卷柏 山茱萸 細辛 烏頭去皮

躑躅 蜀椒有目 秦朮 葛蒲 白芷各壹兩

右叁拾肆味切以酒貳斗漬四日一服一合日再十日後

歷去滓暴乾持篩爲散酒服方寸匕日再以知爲度

主百病敗心能耳聾目眩淚出草不聞香臭口爛
生瘡風癰疽喉下生瘡煩熱厥逆上氣背脇有輕痛手不
上頭不自帶衣肢脊不能俯仰脚酸不仁難以久立八風十
二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋攣不可屈伸賊風咽
喉閉塞更不利或如錐刀所刺行人皮膚中無有常處久
久不治入人五藏或在心下或在背脊遊行四肢偏有冷熱
如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損萬病方

細辛半兩 茵芋 烏頭去皮 躑躅有目 木防已

天雄去皮 石斛各壹兩 柏子仁 牛膝 山茱萸

通草 秦朮 桂心 乾薑 乾地黃

黃芩一作茵陳 附子去皮 瞿麥 王孫作王

杜仲炙 澤瀉 石南 防風 遠志各壹兩

右貳拾伍味切以酒伍斗漬十日一服一合加至四五合

以知爲度草三升

主大風冷淡痺脹滿諸痺方

大附子壹枚重貳兩者亦

右壹味用酒伍升漬之春日一服一合以痺爲度日再

服無所不治勿用壯者陳者非者不差病

主久風虛冷心氣不足或時驚怖方

紫石英燒 鍾乳研 防風 遠志去心 桂心各壹兩

麻黃去節 茯苓 白朮 甘草炙

右玖味切以酒叁斗漬如上法服肆合日三亦可至醉常

令有酒氣

主惡風疼痛不仁惡瘡不差無痂瘻自落方

丹參 前胡 細辛 卷柏 天雄去皮

秦朮 茵芋 乾薑 牛膝 芫花

<p>白朮 附子<small>去皮</small> 代赭 續斷 防風</p> <p>桔梗 蘭茹 礬石<small>燒</small> 半夏<small>洗</small> 白石脂</p> <p>石南 狼毒 桂心 菟絲子 芍藥</p> <p>龍膽 石韋 恒山 黃連 黃芩</p> <p>玄參 礬石<small>燒</small> 遠志<small>去心</small> 紫苑 山茱萸</p> <p>乾地黄 蘇 甘草<small>炙</small> 石膏<small>煅</small> 杏仁<small>去皮尖</small></p> <p>麻黃 去節 大黃<small>分</small> 白芷 白朮 蜈蚣<small>炙</small></p> <p>右肆拾伍味切以酒肆斗漬五宿一服半合增至一二合日二以差為度</p>	<p>附子 主腰脚疼痛不遂風虛方</p> <p>杜仲<small>切</small> 羌活<small>切</small> 石南<small>去</small> 大附子<small>去</small></p> <p>右肆味切以酒壹斗漬三宿服二合日再</p>	<p>附子 主腕傷腰痛方</p> <p>杜仲<small>切</small> 乾地黄<small>切</small> 當歸 烏頭<small>去</small> 芎藭<small>各</small></p> <p>右伍味切以酒壹斗漬外漬服之如上法</p>	<p>附子 主諸藥不能差者方</p> <p>枳實<small>切</small> 上青皮<small>切</small> 取其未欲至心止得茹五分微火熬去濕氣以酒壹斗漬微火煖令得藥味隨性飲之主口僻眼急神驗主緩風急風並佳</p> <p>附子 主風勞虛冷腰脚疼痛弱方</p> <p>杜仲<small>切</small> 乳味<small>各</small> 當歸 芎藭 乾薑</p> <p>附子<small>去</small> 秦朮 石斛 桂心<small>各</small> 蜀椒<small>去</small></p> <p>細辛 茵芋 天雄<small>各</small> 獨活 防風<small>各</small></p> <p>右壹拾伍味切以酒叁斗漬伍宿一服三合日三服加味</p> <p>附子 主男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無也噫吸少氣去風冷補不足方</p>
--	---	--	---

<p>菊花 杜仲<small>各</small> 獨活 鍾乳<small>研</small> 草薢<small>各</small></p> <p>茯苓 紫石英<small>各</small> 附子<small>去</small> 防風 黃耆</p> <p>茯苓 當歸 石斛 桂心<small>各</small></p> <p>右壹拾肆味切以酒柒斗漬五宿一服二合稍漸加至五合日三服</p>	<p>附子 主虛勞百病傷寒風濕及女人帶下月水往來不調手足攣痺著牀方</p> <p>麻子<small>去</small> 法麴<small>各</small></p> <p>右貳味先持麻子成末以水兩石著釜中蒸麻子極熟炊壹斛米頃出去滓隨汁多少如家醢法酒熟取清任性飲之令人肥健</p>	<p>附子 主大風虛冷痰癖偏枯脚腫滿自病方</p> <p>黃耆 獨活 山茱萸 桂心 蜀椒<small>去</small></p> <p>白朮 牛膝 葛根 防風 芎藭</p> <p>細辛 附子<small>去</small> 甘草<small>各</small> 大黃 乾薑<small>各</small></p> <p>秦朮 當歸 烏頭<small>去</small></p> <p>右壹拾捌味切以酒叁斗漬拾日一服一合日三稍加至五合夜二服無所忌去虛加茯苓二兩葶藶兩石斛貳兩多忘加呂蒲貳兩紫石英貳兩心下水加茯苓貳兩人參貳兩署預參兩服盡復更以酒叁斗漬澤不爾可暴乾作散酒服方寸匕日三</p>	<p>附子 主地黃汁壹石煎取伍斗冷漬麴蘖先淘米暴乾欲釀時別煎地黃汁如煎法清米一宿漉乾炊釀一如家醢法拌饋亦以餘汁酸醱然其押出地黃乾澤亦和米炊釀之酒熟訖封七日押取溫服一盞常令酒氣相接</p>
--	--	---	--

慎猪魚服之百日肥白疾愈

諸散第二 方九首 論一首

九散主男女老少未有不苦風者男子五勞七傷婦人產後餘疾五藏六腑諸風皆悉主之方

知母 人參 茯苓 蜀椒 附子 乾薑

附子 桂心 細辛 白朮 澤瀉 乾薑

右壹拾貳味持節為散以酒服方寸匕日再飲酒常令有酒色勿令大醉也禁房室猪魚生冷無病常服益佳延年益壽輕身明目強筋骨愈折傷

吳茱萸 乾薑 白斂 杜桂 附子 天雄 乾漆 秦朮 狗脊

右壹拾壹味持節為散以酒服方寸匕日三服

山茱萸 附子 王蓀 杜桂 乾地黃 乾漆 秦朮 天雄 白朮

右壹拾壹味持節為散先食酒服方寸匕日三藥走皮膚中淫淫服之一月愈

王頭痛眩亂耳聾兩目淚出鼻不聞香臭口爛惡瘡鼠漏瘰癧喉咽生瘡煩熱欬嗽背滿脚腫半身偏枯不遂手足筋急緩不能伸屈風濕退張尸蠱注江南惡氣在人心下或在背脊遊走四肢針灸不及積聚僻戾五緩六急濕痺女人帶下積聚生瘕中風男女五勞七傷皆主之方

石斛 防風 巴戟天 天雄 乾地黃

石南 遠志 烏頭 乾薑

桂心 蜀椒 附子 黃耆 薔薇 獨活

秦朮 茵芋 黃耆 薔薇 獨活

細辛 牛膝 拍子 澤瀉 杜仲

山茱萸 通草 甘草 附子 乾薑

右貳拾柒味持節為散難未鳴時冷酒服伍分匕日三加至一匕

人參 當歸 天雄 前胡 吳茱萸

白朮 秦朮 烏頭 細辛 附子 獨活 防風 麻黃 芥草 蜀椒

右貳拾壹味持節為散酒服方寸匕日三服中熱者加減服之若在中風傷寒卑寒者服訖覆取汗即愈

防風 蜀椒 麥門冬 天雄 附子 人參 當歸 五味子 山茱萸

烏頭 細辛 白朮 柴胡 山茱萸

右壹拾壹味持節為散酒服方寸匕日三不知稍增之以知為度

八散主五勞七傷風入五藏手脚身體沉重或如邪氣時時出又張尸道注相染身或步氣腹滿或皮膚筋

痛項骨相引無常或咽中有氣吞之不入吐之不出皆主之方

細辛

巴戟

黃耆

礬石燒

厚朴炙

白敏

桂心

黃芩

杜刺

山茱萸

白朮

女萎

菊花

人參

天雄炮炙

防風

萆薢

石斛

蜀椒各半

天雄炮炙

芎藭

龍膽

芍藥

茯苓各半

紫苑

秦朮

茯苓

昌蒲

烏頭炮炙

乾薑各半

附子炮炙

署預

五味子各半

烏頭炮炙

桔梗

遠志各半

署預

五味子各半

烏頭炮炙

桔梗

右參拾肆味搗篩為散酒服方寸匕日二稍增至二匕主萬病

八風十二痺主風痺嘔逆不能飲食者心痺也數滿腹痛氣逆嘔涕白者脾痺也津液唾血腥臭者肝痺也陰痿下濕者痿痺也腹中雷鳴食不消食即氣滿小便數起胃痺也兩膝寒不能行者濕痺也手不能舉腫痛而逆骨痺也煩滿短氣涕唾青黑腎痺也並悉主之方

遠志去心

黃耆

黃芩

白敏

附子炮炙

龍膽

署預

厚朴炙

蜀椒各半

附子炮炙

牡荊子

天雄炮炙

細辛

菊花

狗脊

山茱萸

防風

芎藭

桂心各半

五味子

巴戟天各壹分

茯苓

芍藥

芍藥

秦朮

烏頭炮炙

燕薹

昌蒲

麥蘖各壹

秦朮

右貳拾柒味搗篩為散食後飲服方寸匕日三寧從少起

稍增之

王綱命天八風散主諸風五緩六急或浮腫嘔吸微痺風

虛不足并補益藏氣最良其說甚多略取其要方

秦朮

防風

附子

牛膝

烏頭

天雄

昌蒲

茯苓

細辛

烏頭

天雄

桔梗

芎藭

石龍

蜀椒

龍膽

天雄

署預

石龍

蜀椒

龍膽

天雄

天雄

石龍

蜀椒

龍膽

天雄

石斛

白芷

龍膽

天雄

天雄

白朮

山茱萸

桂心

天雄

天雄

菊花

女萎

厚朴

天雄

天雄

巴戟天

草薢

牡荊子

天雄

天雄

乾漆

肉蓯蓉

五味子

天雄

天雄

芍藥

黃芩

白敏

天雄

天雄

續斷

白敏

天雄

天雄

天雄

右參拾肆味

甘新好以破除

日合搗篩

為散溫酒和服

方寸匕日參服

不知稍增之

可至二三匕以知為度若苦

心悶者飲少冷水

禁生魚猪肉菹菜

能斷房室百日苦善

此方療風消脹滿調和五藏

便利六腑男女有患悉可合

服常用其良患心氣不足

短氣內人參甘草各壹兩若腹

痛是腎氣不足內杜仲

羊腎各貳兩隨病增減

論曰此等諸散天下名藥

然熱人不可用惟舊冷者

大佳

諸膏第三

方三首

當歸

丹砂

細辛

芎藭

附子

天雄

桂心

天雄

乾薑

烏頭

雄黃

天雄

松脂

牛脂

大醋

白芷

猪肪

猪肪

中合煎之

右壹拾伍味切以地黃汁

大醋漬藥一宿猪肪中

合煎之

王綱命天八風散

主諸風五緩六急

或浮腫嘔吸微痺風

痛項骨相引無常

或咽中有氣吞之不入

吐之不出皆主之方

細辛

巴戟

黃耆

礬石燒

厚朴炙

山茱萸

白敏

桂心

黃芩

杜刺

天雄炮炙

防風

萆薢

石斛

芍藥

茯苓

芍藥

秦朮

烏頭炮炙

燕薹

昌蒲

麥蘖各壹

秦朮

秦朮

秦朮

秦朮

秦朮

十五沸膏成去滓內丹砂等末攪攪無令小兒婦人及六畜見之合藥切頂禁之

有人苦背脇背痛服之七日所出如雞子汁者貳升即愈

有人脇下積氣如杯摩藥十五日愈

有人苦膈停氣如手摩之去如瓜中黃蘗壹升許愈

有人患腹切痛時引脇痛數年摩膏下如蟲三十枚愈

有女人苦月經內塞無子數年膏摩小腹并服如杏子大

一枚十日下午崩血貳升愈其年有子

有患風發腫起累累如大豆摩之五日愈

有患膝冷痛摩之五日亦愈

有患頭項寒熱瘰癧摩之皆愈

有患向日翳黑瘡瘻是心腹中疾服藥下如酒糟者貳升愈

頭項痛主傷寒時行賊風惡氣在外肢節痛痺不得屈伸項頸咽喉痺塞閉入腹則心急腹脹背脊中嘔逆藥主之病

在腹內服之在外摩之緩風不遂濕痺不仁偏枯拘屈口面

喎斜耳聾齒痛風頸腫痺腦中風痛石癰結核瘰癧堅腫未

潰傳之取消及赤白癰癧諸腫無頭作癰疽者摩之令消風

結核在耳後風水遊腫攻痛瘡瘡針之黃汁出時行溫氣服

之如棗大一枚小兒以意減之方

丹參 胡蘆根 秦元 羌活

蜀椒 開口者牛膝 烏頭 去皮 連翹

白朮 兩各 躑躅 菊花 莽草 各壹

右壹拾貳味切以苦酒伍升麻油柒升合煎苦酒盡去滓

用猪脂煎成膏凡風冷者用酒服熱者單服藥綿拭嘴之

主一切火瘡多瘡金瘡木石傷損不可差者醫所不能

療令人憂懼計無所出以塗上一宿生肌肉即差方

生地黃汁生烏麻脂黃陸香末丁香末路

黃丹肆錢 黃蘗壹斤

右陸味先極微火煎地黃汁烏麻脂參分減乃下丁香

黃陸香煎然拾沸乃下黃丹次下蠟煎之使消以匙攪之

數千迴下之停凝用之

鳴辟第四 方肆首

治心虛寒風半身不遂骨節離緩弱不用便利無度口面喎

斜乾薑附子湯方

乾薑 附子各八兩 黃芩參兩 麻黃去節 桂心各肆

右伍味咬咀以水壹斗煮取參升分三服三日復進一劑

治中風面目相引偏僻牙車急舌不轉方

牡蠣熬 礬石燒 附子生 伏龍肝等分

右肆味搗篩為散以三歲雄雞血和藥傳上預低看勿令

太過偏右塗左偏左塗右正則洗去之

頭項痛主賊風身體不遂偏枯口僻及傷寒其身強直方

烏頭皴野葛 莽草各壹

右叁味切以好酒貳斗伍升淹漬再宿三日以猪膏伍斤

煎成膏合藥作東向露龜以葦火煎之三上三下膏藥成

有病者向火摩至三千過汗出即愈若觸寒露露鼻中塞向

火背指頭摩人鼻孔中即愈勿令入口服

治風者人面引口偏著耳牙車急舌不得轉方

生地黃汁 竹瀝將壹 獨活壹兩

右叁味合煎取壹升頓服之即愈

心風第五 方一十四首

主五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸跳動

恍惚不定方

茯苓 人參 茯苓 昌蒲 赤小豆

右伍味以水壹斗煮取貳升半分參服

主風邪氣往來發作有時或無時節方

人參 防風 烏頭 黃芩 附子

遠志 去心 桔梗 秦艽 五味子 前胡

杜鵑 細辛 石膏 芎藭 蜀椒 附子

牛膝 澤瀉 桂心 山茱萸 竹皮

橘皮 桑根 白皮 乾薑 澤蘭

狗脊 石南 白朮 大棗 麻黃

茯苓 獨活 甘草 附子

右參拾貳味以水陸升酒陸升合煮取肆升分伍服

日三夜二服

主金匱忽忽朝暮劇驚悸心中忪忪胃滿不下食

飲陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人聲定志下氣方

人參 茯苓 龍齒 當歸 遠志 去心

甘草 枳實 枳殼 茯苓 大棗

右壹拾肆味以水壹斗貳升先煮梗米伍合令熟去

滓內藥煮取肆升每服八合日三夜二服

主風虛勞冷心氣不足喜忘恐怖神志不定方

防風 甘草 乾薑 附子 白朮 秦艽

白朮 桂心 白芍 遠志 附子

桔梗 參分 大旦 卷 署預 石膏 茯苓

人參 伍分 大棗 麥門冬 法

右貳拾參味末之鍊蜜和為圓酒服如梧子大拾圓日叁

服加至貳拾圓

治大風風邪入心心痛達背背痛達心前後痛去來

上下或大腹脹滿微痛一寒一熱心中煩悶進退無常面或

青或黃皆足旁內太過虛損勞傷交會後汗出汗未除或

因把扇或出當風而或勞五俞大傷風因外入下有水因變

成邪雖病如此然於飲食無退坐起無異至卒不知是五內

受氣故也名曰行尸宜預備此方

麻黃 大棗 桂心 防風 細辛

芍藥 甘草 附子 秦艽

獨活 黃芩 防已 附子 白朮

右壹拾陸味以水壹斗叁升先煮麻黃一沸去上沫內

諸藥煮取伍升去滓內藥煎取叁升分爲三服老小久病

服五合取汗忌生葱海藻松菜生菜猪肉冷水桃李雀鴉

忘夜不得寐諸邪氣病悉主之方

秦艽 柏實 當歸 乾漆 白欬

杏仁 芍藥 澤瀉 乾地黃 防風

人參 甘草 白朮 署預 茯苓

乾薑 麥門冬 法

右壹拾捌味以水壹斗伍升先煮梗米伍合令熟去

滓內藥煮取肆升每服八合日三夜二服

主心氣不足五藏不足憂悲不樂忽忽遺忘朝差

暮極狂眩方

遠志 去心 昌蒲 茯苓 人參

右肆味以水壹斗伍升先煮梗米伍合令熟去滓內藥

神為散服亦佳

補心治遺忘方

昌蒲 遠志 茯苓 人參 通草

石決明 各等分

右陸味搗篩為散食後水服方寸匕日一服酒亦佳

槐實益心智方

以十月上辛日令童子於東方採兩斛槐子去不成者

新瓦盆貯之以井華水漬之令淹藏合頭密封七日去

黃皮更易新盆仍以水漬之密封一七日去其黑肌擇

取色黃鮮者以小盆隨藥多少以密布次其黃夏密布

其上以盆合頭密封內暖馬糞中三七日開視結成擣

圓如梧子日服三圓大月加三圓小月減三圓先齋二

七日乃服三十日有驗百日日行一百里日明視見表

裏白髮更黑齒落再生回皺却展日記千言尋本知未

除六十四種風去九漏冷癢癰蟲毒魔魅

開心肥健方

人參 伍兩 大猪肪 捌枚

右貳味搗人參為散猪肪煎取凝每服以人參一分猪肪

十分以酒半升和服之一百日骨髓充溢日記千言身體

潤澤去熱風冷風頭心風等月服二升半即有大效

孔子枕中散方

龜甲 炙 龍骨 昌蒲 遠志 各

右肆味為散食後水服方寸匕日三常服不忘

鎮心省睡益智方

遠志 伍兩 益智子 昌蒲 各

右參味搗篩為散以酒糯米酒服方寸匕一百日有驗秘

不令人知

止腫方

龍骨 虎骨 炙 龜甲 炙

右參味搗篩為散水服方寸匕日三以睡定即止

治多睡欲合眼則先服以上睡方

麻黃 去節 白木 各伍 甘草 壹兩

右參味以日中時南向搗篩為散食後以湯服方寸匕日

三服

風眩第六方 二十七首

治風眩屋轉眼不得開人參湯方

人參 防風 芍藥 黃耆 獨活 麥門冬 各壹兩

桂心 白木 各壹 當歸 炙 附子 壹枚 炮

右玖味咬咀以水壹斗煮取參升伍合分肆服

治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲枝神湯方

茯苓 伍兩 黃耆 生薑 切 遠志 伍兩 附子 壹枚 炮

防風 伍兩 人參 獨活 當歸 牡蠣 炙

茯苓 白木 甘草 各

右壹拾貳味咬咀以水壹斗煮取參升分陸服每服

五合日三夜三白木 無

防風 主頭面風在眉間得熱如蟲蟻行或頭眩目中決出

防風 伍兩 天雄 炮 細辛 乾薑 烏頭 炮 朱砂 研 桂心 各參 莽草 茯苓 附子 壹枚 炮

人參 當歸 各壹

右壹拾貳味搗篩為散酒服方寸匕日三服

防風 主頭眩惡風吐冷水心悶方

防風 乾薑 各壹 桂心 壹兩 澤蘭 附子 壹枚 炮

防風 乾薑 各壹 桂心 壹兩 澤蘭 附子 壹枚 炮

茯苓

人參各半細辛

署預

白木略重

右壹拾味搗篩為散酒服方寸匕常令有酒氣醺醺則脫巾帽解髮前却梳頭一百遍復投一升酒便洗手足須臾頭面熱解髮以粉粉之快即便愈可洗頭行步如服寒食散十日愈

治頭風方

搗葦蘆子末以湯淋取汁洗頭良

治卒中惡風頭痛方

搗生烏頭去皮以酢和塗故布上薄痛上須臾痛止日夜五六薄之

治風主頭面身腫方

防風各兩白芷壹兩白木參兩

右叁味搗篩為散酒服方寸匕日二服

治風主頭面目眩耳聾亦隨病所在兩攻方

天雄炮去山茱萸

署預各兩

右叁味搗篩為散以酒服伍分日三不知稍增以知為度

天雄炮去主口喎目斜耳聾面骨疼風眩痛方

天雄炮去

細辛各半

山茱萸

乾薑各伍

署預

防風各半

右陸味搗篩為散以酒服伍分日再不知稍增以知為度

治頭面風眼瞤鼻塞眼暗冷淚方

杏仁三分搗末水浸四五洗頭冷汗盡二度差

又方

熟棗大豆內飯甕中作漿水日日溫洗頭面不淨加少麴勿用水濯不過十洗

治頭中白屑如髮糠方

立截楮木作枕六日一易新者

沐頭主頭風方

五月五日取鹽壹升水壹升合煮并內三蛇牀以陳蘆燒之三沸以沐頭訖急結密巾之四五日以水洗之

又方

吳茱萸各分

右壹味以水伍升煮取叁升以綿拭髮根良

八項主三十六種風偏枯不遂方

天雄炮去山茱萸各壹兩

細辛

石南

牛膝

麻黃去心

署預各兩

白木

烏頭炮去

桔梗

防風

甘草各兩

蜀椒去目

附子通

右壹拾肆味搗篩為散以酒服方寸匕日三服金附子通

治遍身風方

石南各兩

天雄炮去

細辛

白木

烏頭炮去

桔梗

防風

甘草各兩

蜀椒去目

右壹味搗篩為散酒服三大豆日三至食時當覺兩脅如

蟲行狀亦如風吹從頭項向壁脊腰脚至膝下骨中痛痛遍

即齊下頭風盡止若風愈即能飲酒肥健忘知藥法日一服

風濕主三十年惡風濕痺長禿落隱癰生瘡氣脉不通抓

搔不覺痛痒方

附子炮去

乾薑

白木各兩

石南

蜀椒去目

署預各兩

烏頭炮去

天雄炮去

細辛

白木

烏頭炮去

桔梗

防風

甘草各兩

蜀椒去目

石南

天雄炮去

細辛

白木

烏頭炮去

桔梗

防風

甘草各兩

右壹拾貳味搗篩為散酒服五分日三以少羊臍下藥日再

勿大飽食飽即更服常令有酒勢先服吐下藥後乃服之

以韋袋貯藥勿洩忌冷水房室百日

十六

千金翼方卷第十七

中風下

中風第一論四首 灸法二首

小續命湯方

麻黃去節 防己 人參 桂心 黃芩

芍藥 芎藭 杏仁去皮尖 甘草炙

附子炮 乾薑炮 防風半斤 生薑五兩

右壹拾貳味 咬咀以水壹斗 先煮麻黃去上沫 內諸藥 煮取參升 分參服 有風預備 宜括刺

大續命湯方

麻黃去節 大杏仁去皮尖 桂心 芎藭各

石膏碎 黃芩 乾薑 當歸 甘草炙

荆瀝壹升

右壹拾味 咬咀以水壹斗 先煮麻黃去上沫 下藥 煮取四升 下荆瀝 煮取三升 分四服 能言未差 後服 小續命湯

又小續命湯方

麻黃去節 生薑伍兩 防風壹兩 芍藥 白朮

人參 芎藭壹兩 附子炮 黃芩 防己各

桂心 甘草炙

右壹拾貳味 咬咀以水壹斗 先煮麻黃去上沫 內諸藥 煮取三升 分三服

又小續命湯方

麻黃去節 石膏碎 桂心貳兩 杏仁參拾枚 去皮

芎藭 乾薑 黃芩 當歸 甘草炙

右玖味 咬咀以水壹斗 先煮麻黃去上沫 下諸藥 煮取肆升 分四服

又小續命湯方

麻黃去節 石膏碎 桂心貳兩 杏仁參拾枚 去皮

芎藭 乾薑 黃芩 當歸 甘草炙

右玖味 咬咀以水壹斗 先煮麻黃去上沫 下諸藥 煮取肆升 分四服

主久風臥在牀起死人神方

麻黃去節 人參 桂心 附子炮 茯苓各

防己 防風 黃芩各 生薑各 半夏各

枳實各 乾薑各 甘草各

右壹拾貳味 咬咀以水壹斗 先煮麻黃取玖升 去上沫 亭

冷去滓 內藥 煮取參升 分三服 若不瀉 半夏去之 如苦藥 參兩

主八風十二痺 偏枯不仁 手足拘急 疼痛不得伸

屈 頭眩不能自舉 起止顛倒 或臥忽驚 如墮 獨狀盜汗 臨事

不興 婦人帶下 無子 風入五藏 甚者 恐怖 鬼來收錄 或與鬼

神交通 悲啼 泣忽忽欲走方

烏頭炮 防風 麻黃去節 人參 杏仁去皮

芍藥 石膏碎 乾薑 芎藭 茯苓

黃芩 桂心 蜀椒去毒 甘草炙 當歸各

右壹拾伍味 搗篩為散 酒服方寸匕 日二稍增 以知為度

又小續命湯方

白鮮皮 白朮 芍藥 芎藭 當歸

獨活 杏仁去皮 防風 桂心

甘草炙 茯苓 麻黃去節 生薑各

右壹拾貳味 咬咀以水壹斗 先煮麻黃去上沫 內諸藥 煮取參升 分三服 取汗可服 兩三劑

又小續命湯方

白鮮皮 附子炮 麻黃去節 杏仁去皮 白朮

防風 葛根 獨活 防己 當歸

人參 茯苓 甘草炙 石膏碎 桂心各

白芷壹兩

右壹拾陸味 咬咀以水壹斗 先煮麻黃取壹升 去

又小續命湯方

麻黃去節 石膏碎 桂心貳兩 杏仁參拾枚 去皮

芎藭 乾薑 黃芩 當歸 甘草炙

右玖味 咬咀以水壹斗 先煮麻黃去上沫 下諸藥 煮取肆升 分四服

沫登清內藥煮取四升分四服日三夜一服
又諸毒風邪氣所中只藥時不識人身體疼痛
面目暴腫手足腫方

犀角屑 羚羊角屑 貝子 升麻

右肆味各壹兩別搗成末合和以水二升半內方寸匕煮
取壹升去滓服五合殺藥者以意加之若腫和難子傳上
日三夜小以意增減神良

大風濕主賊風腹中絞痛并飛尸過注發作無時發則搶
心腹脹滿脇下如刀錐刺并主少陰傷寒方

枳子 枳實 乾地黄 乾薑 細辛 當歸

青羊脂 吳茱萸 茯苓 芍藥 桂心

甘草 壹兩

右壹拾壹味以水捌升煮取叁升去滓內羊脂令消
分溫三服

小瘰癧主惡風角弓反張飛尸入腹絞痛關絕往來有時
筋急少陰傷寒口噤不利方

雄黃 青羊脂 各壹兩 大黃 貳兩 吳茱萸 叁兩

當歸 乾薑 芍藥 細辛 桂心

乾地黄 甘草 壹兩

右壹拾壹味以水貳斗煮取陸升分六服重者加藥
用水三斗煮取九升分十服

主八風五尸惡氣遊走心胃流出四肢來往不住短
氣欲死方

烏頭 芍藥 當歸 乾薑 桂心

細辛 乾地黄 吳茱萸 甘草 各兩

右玖味以水柒升煮取貳升分三服

大風濕主毒風頑痺或手足不隨身體偏枯或毒弱
不任或風入五臟恍惚多驚喜忘有時恐悸或肢節疼
痛頭眩煩悶或腰脊強直不得伸仰腹滿不食欬嗽或始遇
病時卒倒悶絕即不能語便失音半身不隨不仁沈重皆由
風痺得少不避風冷所致方

烏頭 炮 黃芩 芍藥 遠志 去心 獨活

防風 芎藭 麻黃 去節 秦艽 石斛

人參 茯苓 石膏 碎 黃耆 紫苑 碎

當歸 貳兩 分麻 壹兩 大豆 貳合 五味子 分五 杏仁 貳分 碎

乾薑 桂心 甘草 兩半

右貳拾壹味以水壹斗叁升酒貳升合煮取四升強
人分四服少力人分五六服

主卒中風四肢不仁喜笑不息方

芎藭 杏仁 貳分 麻黃 去節 黃芩

桂心 當歸 石膏 碎 秦艽 乾薑

甘草 壹兩

右壹拾壹味以水九升煮取三升分三服

主賊風口噤角弓反張身體強直方

當歸 細辛 防風 兩半 獨活 叁分 麻黃 貳兩 半

附子 壹枚 炮

右陸味以酒八升水四升合煮取四升分肆服口不
開者按口下湯一服當開二服小汗三服大汗

主風癰引脇痛發作則吐耳中如蟬鳴方

芎藭 藁本 蘭茹 各兩

右叁味切以淳酒五升內藥煮取三升頓服重者二服取
大汗

治風癱狂及百病方

大麻子外上

右壹味以水陸升猛火煮令干生去滓煎取柒升旦空肚頓服或不發或多言語勿怪之但使人摩手足須臾即定凡進三劑無不愈令人身輕衆邪皆去

防己湯主風歷節四肢痛如鉅銀不可忍者

防己

茯苓

生薑切

桂心路身

烏頭去皮

人參參兩 白朮陸兩 甘草炙兩

右捌味咬咀以水壹斗煮取貳升半服捌合日三當燭燭微乾勿怪若不覺復更合之以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用無毒

三才湯主中風手足拘攣自節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食方

麻黃細分

獨活壹兩

黃芩參分

黃耆半兩

細辛半兩

右伍味咬咀以水伍升煮取貳升去滓分貳服一服小汗兩服大汗心中熱加大黃半兩腹滿加枳實一枚氣逆加人參三分心悸加牡蠣二分渴加栝樓三分先有寒加入角附子一枚此仲景方神秘不傳

黃耆

當歸

桂心

甘草炙兩

白朮

烏頭去皮

防風

生薑切

防風

乾地黃各貳兩

右壹拾壹味咬咀以水壹斗壹升煮取叁升半分四服此湯和而補有氣者加半夏四兩

主中風萎痺拘攣不可屈伸方

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

白欬

乾薑

慈以仁

酸棗

牛膝

桂心

芍藥

車前子

甘草炙兩

附子去皮

右壹拾壹味咬咀以酒貳斗漬一復時煮三沸服壹升日三服扶杖而起不能酒者服五合

右壹拾壹味咬咀以酒貳斗漬一復時煮三沸服壹升日三服扶杖而起不能酒者服五合

防己湯主風濕四肢痠痺急浮腫方

防己

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

芍藥

甘草炙兩

大棗拾貳枚

芍藥參兩

麻黃去節

右玖味咬咀以水壹斗煮取貳升分三服漸汗出令遍身以粉粉之慎風冷

治三十年風方

松葉壹斤切以酒壹斗煮取貳升頓服取汗出佳

治一切風虛方

杏仁兩

白朮陸兩

黃芩參分

黃耆半兩

細辛半兩

右壹味擣作末以水玖升研濾如作粥法緩火煎令如麻浮上匙取和羹粥酒內一匙服之每食即服不限多少服七日後大汗出二十日後汗止慎風冷諸魚雞蒜大醋一劑後諸風滅差春夏恐醋少作服之秋九月後煎之此法神妙可深秘之

治中風發熱方

大戟

苦參半分

右貳味擣碎藥半升外以醋漿水壹斗煮三沸洗之從上至下立差寒乃止小兒二指撮醋漿水四升煮如上法

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

治風方

羌活參兩

茯苓

白朮陸兩

桑白皮切貳升

桂心參兩

芍藥參兩

甘草炙兩

獨活 茯苓 澤瀉 黃連 白木 各藥

防己 羌活 黃芩 人參 丹參

防風 牛膝 升麻 犀角 骨 杏仁 桂枝 皮 炙

秦艽 穀皮 柴胡 石斛 生薑 附子 炮

橘皮 黃芩 附子 炮 桑根 白皮 炙

右貳拾參味 搗篩為散 以水壹升半 煮五方寸 以取壹升

頓服 日再 不能者 壹服 十月後 二月末 以來可服之

論曰 人不能用心 謹慎 遇風 病半身不隨 言語不正 庶事

皆廢 此為癱瘓 病得者 不出十年 宜用此方 差後 仍須將慎

不得用 未病之前 當須絕於思慮 省於言語 為於無事 乃可

未愈 若還同俗 類名利 務財色 為心者 幸勿苦事 醫藥 徒

勞為療耳 宜於此善 以意推之 凡人忽中生風 皆須依此文

第用湯 即得愈也 學者 子細尋思 明然可見

凡初得風 四肢不收 心神惛目 愔眼 不識人言 不出口 凡中

風 多由熱起 服藥 當須慎 酒 麪 羊肉 生菜 冷食 猪魚 雞牛 馬

肉 蒜 乃可 差得 患即服 此竹瀝湯方

竹瀝湯方 生薑汁 壹升 生薑汁 壹升

右參味 相和 溫煖 分三服 平旦 日晡 夜各一服 服訖 若覺

四體有異 似好 以次進後方

麻黃 去節 防風 各壹兩 杏仁 肆拾粒 去皮 炙 終手用 煎兩

生薑 炮 兩 生葛汁 壹升 竹瀝 壹升 石膏 壹斤 炙 碎

芫花 兩 防己 兩 附子 壹枚 炮 炙 黃芩 兩 黃芩

人參 兩 桂心 兩 甘草 壹兩 炙

右壹拾陸味 咀咀 以水柒升 煮取壹升 乃下 竹瀝 汁 煮取貳

升 柒合 分溫三服 五日更服一劑 頗進三劑 慎如上法 漸

覺 稍拍次進後方

麻黃 去節 防風 外麻 桂心 芫花

獨活 羌活 終手用 煎兩 竹瀝 壹升 防己 壹兩

右玖味 咀咀 以水四升 并 瀝 煮取叁升 分三服 兩日進壹

劑 頗進三劑 若手足冷 若加生薑五兩 白木貳兩 若未除

次進後方

麻黃 去節 芍藥 防風 各壹兩 終手用 煎兩

生薑 炮 兩 附子 壹枚 炮 炙 石膏 壹斤 炙 碎

芫花 兩 防己 兩 附子 壹枚 炮 炙 黃芩 兩 黃芩

桂心 兩 甘草 壹兩 炙 竹瀝 壹升

右壹拾柒味 咀咀 以水捌升 煮取叁升 下 瀝 煮取貳升 半 分

參服 相去 如人行十里 再服 有氣 加橘皮 牛膝 五加皮 各

壹兩 若除退 訖 可常將服 後煮散方

防風 獨活 秦艽 黃芩 芍藥

人參 茯苓 白木 芫花 山茱萸

署預 桂心 天門冬 炙 麥門冬 炙 厚朴 炙

升麻 丹參 羚羊角 骨 五加皮 防己

牛膝 石斛 地骨皮 甘草 肆兩 炙 麻黃 去節

附子 壹枚 炮 炙 橘皮 壹兩 生薑 炮 兩 甘菊花

薏苡仁 各壹兩 石黃 兩 乾地黃 兩 炙

右參拾參味 搗篩為散 每以水參升 內散三兩 煮取壹

升 綿裹 去滓 頓服 之日 別壹服 若覺心下煩熱 以竹瀝代

水 煮之 無山茱萸 薯蕷 山茱萸 附子

凡患風人多熱 宜服 劑瀝方

荆瀝 竹瀝 生薑汁 各伍

右參味 相和 溫為壹服 每日旦服 煮散 午後當服 此劑瀝

常作此藥息

論曰夫得風之時則依此次第療之不可違越若不依此當失機要性命必危

防風 芍藥 白朮 狗脊 葶藶

牛膝 白芷 薏苡仁 葛根 杏仁 桂心

人參 先活 麻黃 生薑 附子

石膏

右宜拾陸味咬咀以水壹斗貳升煮取叁升分三服服一劑覺好更服一劑一劑一度針之服九劑湯九度針之針風池一穴有翳一穴曲池一穴文瀾一穴五樞一穴陽陵泉一穴巨虛下廉一穴合七穴即差○仁壽官備身患脚奉勅針環銑陽陵泉巨虛下廉陽輔即起行○大理趙卿患風腰脚不隨不得跪起針上邪二穴環銑二穴陽陵泉二穴巨虛下廉二穴即得跪起

治復退風方

蒼耳子 羊桃切 薔薇切 赤小豆

右伍味以水兩石伍斗煮取伍斗通寒溫內所患脚漬深至絕骨勿過之一度炊五斗米頃出之慎風冷汗從頭出論曰聖人以風是百病之長深為可憂故避風如避矢是以防禦風邪以湯藥針灸蒸熨隨用一法皆能愈疾至於火灸又有奇能雖曰針湯散皆所不及灸為其最要者耳他如魏武帝針頭風華他但針即差華他死後數年魏武帝頭風再發他當時針訖即差頭風豈可再發只由不灸其本不除所以聖者不得專恃針及湯藥等望病畢差既苦灸安能拔本塞源是以雖藥餌諸療之要在灸灸為良初得之

時當急下火火下即定比煮湯熱已覺眼明豈非大要其灸法先灸百會次灸風池次灸大椎次灸肩井次灸曲池次灸間使各三壯次灸三里五壯其壯如蒼耳子大必須大實作之其灸又須大熱從此以後日別灸之至隨年壯止凡人稍覺心神不快即須灸此諸穴各三壯不得輕之苟度朝夕以致殞斃戒之哉戒之哉

又論曰學者凡將欲療病先須灸前諸穴莫問風與不風皆先灸之此之一法醫之大術宜深體之要中之要無過此術是以常預收三月三日艾燭救急危其五月五日亦好仍不及三月三日者又有卒死之人及中風不得語者皆急灸之夫卒死者是風入五藏為生半風發強忍怕痛不灸忽然卒死謂是何病所以皆必灸之是大要也

脚氣第一 燭二指一節

論曰治脚氣順四時若春秋二時宜兼補濕夏則疾感尊須汗利十月以後少用補藥雖小變不越此法

治脚氣初發從足起至膝脛腫骨疼者方取胡麻葉切搗蒸薄裹日一易即酒若冬月取薔薇根切搗和糟三分根一分公煮令熱裹如前法

遍身腫小便澀者用麻豆湯主之方大麻湯烏豆湯白皮湯桑白皮湯

右參朮以豆汁內藥煮取陸升壹服壹升日二服三日全愈又方烏牛屎壹服壹升日二腫消上羸瘦者二分屎一分牛乳合煮漿浮結乃服之

又方生豬肝一具細切以淡蒜薑食盡不可盡者分再食之

治腰脚疼方

胡椒子壹斗

右壹味熬令香搗篩若不數篩當脂出不下日服壹小升

日參服盡藥計壹斗即不差酒飲美汁蜜湯皆可服之

生石斛壹斗

右壹拾味咬咀以酒參斗漬七日服六合稍加至七八合以知為度

調利之後未平復間為外風傷脚中痛酸轉為熱氣補虛防風湯方

防風 石斛 杜仲 前胡 薏苡仁 半斤

白朮 丹參 五加皮 附子 橘皮

右壹拾肆味咬咀以水壹斗貳升煮取參升分三服服湯已脚氣仍不止防風圓方

防風 秦元 石斛 丹參 薏苡仁 參合

前胡 橘皮 杜仲 附子 白朮

右壹拾貳味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓日貳服

治脚氣常作穀白皮粥防之法即不發方

千金翼方 卷十七 中風下

茯苓 乾薑 澤瀉 桂心 參

右肆味咬咀以水陸升煮取貳升分三服

甘草 附子 秦元 細辛 木防己

黃芩 乾薑 白朮 甘草 參

右壹拾肆味咬咀以水柒升內甘草瀝五升合煮取參升分四服取汁

五藥比其怒無常手足不隨皆悉主之方

烏頭 防風 獨活 芍藥 黃芩

茵芋 麻黃 葛根 木防己 桂心

右壹拾捌味咬咀以竹瀝煮取四升分三服

不舉口噤不能言方

竹瀝 當歸 秦元 防風 葛根

人參 芍藥 木防己 附子 細辛

右壹拾伍味咬咀以竹瀝漬半日煮取四升分三服不能者四服

乾薑 防風 麻黃 杏仁 白朮

人參 石膏碎 羚羊角 甘草 犀角 薑分

雄黃 青木香 黃芩 大黃 芍藥 附子 烏梅

右壹拾伍味 以水貳斗 煮取四升 分四服 日三夜一服

主脚弱 羸瘦 體虛 氣急 日夜不得眠方

麻黃 杏仁 桂心 黃芩

橘皮 石膏 生薑 半夏 厚朴 枳實 茯苓 秦艽 大戟 細辛 大棗 甘草 芍藥

右壹拾陸味 以水壹斗 貳升 煮取肆升 分五服 日三夜一

主脚弱 風寒 痺不仁 脚中沈重 行止不隨 氣上方

獨活 桂心 半夏 麻黃 去節 苦節 人參 茯苓 八角 附子 大棗 乾薑 防風 芍藥 當歸 黃耆 乾薑 甘草 芍藥

右壹拾伍味 以水壹斗 伍升 酒貳升 煮取叁升 分爲五服

主脚弱 連屈 虛冷方

硫黃 牛乳 伍升

右貳味 以水伍升 合煮及伍升 硫黃細篩內之 煎取叁升 一服 合不知至三合

主脚弱 大補 面熱 風虛方

硫黃 鍾乳粉 防風 乾薑 白朮 人參 蜀椒 附子 天雄 石斛 桂心 山茱萸

右壹拾陸味 以水壹斗 伍升 酒貳升 煮取叁升 分爲五服

主脚弱 連屈 虛冷方

硫黃 牛乳 伍升

右貳味 以水伍升 合煮及伍升 硫黃細篩內之 煎取叁升 一服 合不知至三合

主脚弱 大補 面熱 風虛方

硫黃 鍾乳粉 防風 乾薑 白朮 人參 蜀椒 附子 天雄 石斛 桂心 山茱萸

右壹拾陸味 以水壹斗 伍升 酒貳升 煮取叁升 分爲五服

主脚弱 連屈 虛冷方

硫黃 牛乳 伍升

右貳味 以水伍升 合煮及伍升 硫黃細篩內之 煎取叁升 一服 合不知至三合

主脚弱 大補 面熱 風虛方

硫黃 鍾乳粉 防風 乾薑 白朮 人參 蜀椒 附子 天雄 石斛 桂心 山茱萸

右壹拾陸味 以水壹斗 伍升 酒貳升 煮取叁升 分爲五服

右壹拾陸味 搗篩爲散 旦以熱酒服方寸匕 日三加至二匕

主脚弱 風皮肉身體諸風方

烏頭 附子 麻黃 烏頭 附子 麻黃

右壹味 搗篩爲末 鍊蜜和圓如梧子大 酒服五圓 日三服

主脚弱 痿痺 逐脚中風水方

硫黃 伍兩

右壹味 細粉以牛乳叁升 煮令可圓 如梧子大 暴令乾 酒服叁拾圓 日三 不知漸加至百圓

主脚弱 羸瘦 體虛 氣急 日夜不得眠方

麻黃 杏仁 桂心 黃芩

橘皮 石膏 生薑 半夏 厚朴 枳實 茯苓 秦艽 大戟 細辛 大棗 甘草 芍藥

右壹拾陸味 以水壹斗 伍升 酒貳升 煮取肆升 分五服 日三夜一

主脚弱 風寒 痺不仁 脚中沈重 行止不隨 氣上方

獨活 桂心 半夏 麻黃 去節 苦節 人參 茯苓 八角 附子 大棗 乾薑 防風 芍藥 當歸 黃耆 乾薑 甘草 芍藥

右壹拾伍味 以水壹斗 伍升 酒貳升 煮取叁升 分爲五服

主脚弱 連屈 虛冷方

硫黃 牛乳 伍升

右貳味 以水伍升 合煮及伍升 硫黃細篩內之 煎取叁升 一服 合不知至三合

主脚弱 大補 面熱 風虛方

硫黃 鍾乳粉 防風 乾薑 白朮 人參 蜀椒 附子 天雄 石斛 桂心 山茱萸

右壹拾陸味 以水壹斗 伍升 酒貳升 煮取叁升 分爲五服

主脚弱 連屈 虛冷方

硫黃 牛乳 伍升

右貳味 以水伍升 合煮及伍升 硫黃細篩內之 煎取叁升 一服 合不知至三合

主脚弱 大補 面熱 風虛方

硫黃 鍾乳粉 防風 乾薑 白朮 人參 蜀椒 附子 天雄 石斛 桂心 山茱萸

右壹拾陸味 以水壹斗 伍升 酒貳升 煮取叁升 分爲五服

主脚弱 連屈 虛冷方

硫黃 牛乳 伍升

增至黃錢也

治大人小兒風癰方

白藥

右壹味以酒叁升漬令消拭上愈

又方

吳茱萸

右壹味以酒伍升煮取壹升半拭上

治風痺癰癧方

大豆

酒陸升

右貳味煮四五沸服壹杯日三

治風痺癰癧洗湯方

蛇牀子

防風

生藥梨

右叁味切以水壹斗煮取伍升以綿拭上日四五度

又洗湯方

黃連

黃芩

白朮

戎鹽

礬石

細辛

茵芋

又洗湯方

馬蘭

胡蘆

紫葳子

礬石

蒺藜

茵芋

羊桃根

篇蓄

右捌味切以醋貳斗煮取壹斗貳升內礬石洗之旦服

治風氣在上表皮作癰癧瘡方

黃芩

治風氣在表以洗之灸瘡火瘡亦愈

青羊脂

為藥

黃芩

黃耆

白芷

寒水石

竹葉

石膏

白及

升麻

防風

甘草

右壹拾貳味切先以水壹斗煮石膏竹葉兩伍升合漬諸

藥以不中水猪脂貳升合煎白及黃耆成以傅之

多法

以一條艾蒿長者以兩手極意壓之著壁立兩手并蒿竿

托著壁伸十指當中指頭以大艾炷灸蒿竿上令蒿竿斷

即上灸十處無於後更發事依法灸之未去

治風氣在表方

人參

射干

甘草

外麻

蛇牀仁

右壹拾味切以水貳斗煮取柒升外適冷燂分以洗病上日

三夜

治風氣在表方

地榆

苦參

太黃

黃芩

黃連

苦參

甘草

右柒味切以水陸升煮取叁升洗之良

又方

大黃

當歸

外麻

防風

為藥

青木香

黃芩

甘草

楓香

黃藥

芒消

地黃汁

右壹拾貳味切以水壹斗煮取叁升半去滓內芒消令燂

帛揭病上一炊久日四五夜二三主癰癧痛癢良

治癰癧痛癢之逐手腫方

當歸

苦參

大戟

細辛

為藥

附子

羌活

躑躅

椒

莽草

右壹拾味切以苦酒浸藥一宿以猪膏貳升半煎三上三

下膏成去滓傳病上日三夜

瘰癧第四方

治白癰白瘰癧湯法瘰癧者頸及背前方

大醋於甌底磨硫黃令如泥又以八角附子截一頭使平就甌底重磨硫黃使熟夜卧先布拭病上令熱乃以藥傅之重者三度

又方

硫黃 水銀 礬石 蜜墨

右肆味等分擣下篩以葱涕和研之臨卧以傳病上

又方

石硫黃 參兩 附子 去皮 鐵精 各壹兩

右參味並研擣以三年醋和內甌器中密封七日以醋洗淨洗上拭乾塗之乾即塗壹兩以慎風

灸法

五月五日午時灸膝外屈脚當文頭隨年壯兩處灸一時

下火不得轉動

治頭項及面上白皰浸淫漸長有似於癰但無瘡方

乾鰾鱧魚炙脂塗之先洗拭乾上外把刮之令小瘡痛拭燥然後以魚脂塗之一塗便愈難者不過三塗之佳

又方 取生木空中水洗之食頃止

又方 桂心末唾和傳敷上日三

又方

白及 白附 當歸 附子 炮裂去皮 天雄 炮去

黃芩 乾薑 薑黃 蠶蠶 桑葉

右柒味擣篩為散酒服伍分日三服

凡人身有赤斑方

常以銀指令熱不久漸漸消滅癰痕

治疣贅疣瘡方

雄黃 硫黃 貝菜 礬石 煎 煎茹

巴豆 法皮 藜蘆 附子

右柒味擣篩為散以漆和令如泥塗貼病上須成瘡及去面上黑子點之即去

治皮中紫赤斑疹瘡方

乾漆 雄黃 礬石 雄黃 巴豆 法皮

炭皮 薑黃

右陸味為散以雞子白和塗故帛貼病上日二易之即除

治風濕白癰及二百六十種大風方

當歸 防風 秦艽 獨活 菊花

斑蝥 蜀椒 連翹 雄黃 丹砂 研

鬼箭 石長生 附子 皮 王不留行

人參 鬼白 莽草 木防己 石薺

烏頭 天雄 獨活 地膽 蝨蟲 炙

蜈蚣 參 水蛭 右參拾味諸蟲皆去足羽熬炙令瘳為散酒服方寸匕日

再服其白癰入頭令髮白服之日日白髮還黑也

治風濕白癰及二百六十種大風方

當歸 防風 秦艽 獨活 菊花

斑蝥 蜀椒 連翹 雄黃 丹砂 研

鬼箭 石長生 附子 皮 王不留行

人參 鬼白 莽草 木防己 石薺

烏頭 天雄 獨活 地膽 蝨蟲 炙

蜈蚣 參 水蛭 右參拾味諸蟲皆去足羽熬炙令瘳為散酒服方寸匕日

再服其白癰入頭令髮白服之日日白髮還黑也

治風濕白癰及二百六十種大風方

當歸 防風 秦艽 獨活 菊花

斑蝥 蜀椒 連翹 雄黃 丹砂 研

鬼箭 石長生 附子 皮 王不留行

人參 鬼白 莽草 木防己 石薺

斷續根

莢梨子

景天葉各切蛇床子伍兩

玉屑半兩

右伍味切以水壹斗半煮取壹斗稍稍洗身面上日叁夜

慎風

大黃主風癰腫瘻在頭面方

芒消各壹

莽草

黃芩各貳

右伍味切以水柒升煮取叁升半去滓內芒消令烺以帛

搗腫上數百遍日五夜二勿令近眼黃連壹分

右貳味以水陸升煮米熟服之

治嘔方

生薑 伍兩

右陸味切以水伍升煮取貳升分三服兼服小兒每三食

又方 飲大豆汁壹升止

又方 常服白羊乳壹升

治氣厥嘔不得息又主霍亂大絞湯方

香豉壹升 半夏洗

桂心 人參

生薑 伍兩

前胡

右柒味咬咀以水伍升煮取貳升分三服勿使冷

傷寒噦而滿者宜視其前後知在何部不利利之愈噦而不
利此湯主之方

橘皮 壹升 甘草 壹尺

右貳味咬咀以水伍升煮取壹升頓服之

治主之方

橘皮 通草

乾薑

桂心

甘草 貳兩

人參 壹兩

右陸味咬咀以水陸升煮取貳升分三服

主心下痞堅不能飲食胃中喘而嘔噦微寒數方

生薑 伍兩 半夏 伍兩 伍分 伍分 伍分 伍分

右貳味合煎取壹升半稍稍服之即止

又方

橘皮 肆兩 生薑 伍兩

右貳味切以水柒升煮取貳升伍分分三服下喉即差方

差更合

又方

羚羊角 前胡

人參

橘皮

甘草 貳兩

右伍味咬咀以水陸升煮取貳升分三服

卒噦爪眉頭亦可針此主實噦實噦者醉飽得之虛噦者吐
下得之又失血虛後亦得之方
炭末蜜和細細咽少許即差

又方

男噦女入丁壯氣盛者噦其肺俞女子男子噦之

疫癘第二方 伍分 伍分 伍分 伍分 伍分 伍分

蜀漆 知母 白薇 地骨皮 麥門冬 去心

升麻 伍分 恒山 壹兩 石膏 貳兩 香豉 壹合 葶藶

烏梅肉 鹽甲 貳兩 甘草 伍分

右壹拾味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子空腹飲服拾圓
日再加至貳參拾圓

主瘧疾江南瘧瘧方

陵經甲 拾肆 鹽甲 壹枚

烏賊魚骨

附子 貳兩 伍分

恒山 參兩

右伍味咬咀以酒參升漬壹宿未發前稍稍噦之勿絕吐
之并塗五心一日斷食過時又乃食

肝瘕令人色蒼蒼然太息其狀若死刺足厥陰見血

心瘕令人心煩甚欲得清水寒多不甚熱刺足少陰是謂神門

脾瘕令人病寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰

肺瘕令人心寒其熱間善驚如有見若刺手太陰陽明

腎瘕令人悽悽腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足

太陽少陰

胃瘕令人且病寒善飢而不能食支滿腹大刺足陽明太陰

橫痃出血

黃帝問岐伯曰瘡多方少愈者何岐伯對曰瘡有十二種

黃帝曰瘡鬼字何可得聞岐伯對曰但得瘡字便愈不得

其字百方不愈

黃帝曰瘡鬼十二時願聞之岐伯對曰

寅時發者瘡死鬼所為治之以瘡人著箬上灰火一周不令

火滅即差

卯時發者瘡死鬼所為治之用五白衣燒作灰三指撮著酒

中無酒清水服之

辰時發者瘡死鬼所為治之令瘡人上木高危處以棘塞

木奇間即差

巳時發者瘡死鬼所為治之令瘡人坐師以周匝然火即差

午時發者瘡死鬼所為治之令瘡人持脂火於田中無人處

以火燒脂令香假拾薪去即差

未時發者瘡死鬼所為治之令瘡人臨發時三渡東流水即

申時發者自刺死鬼所為治之令瘡人欲發時以刀刺塚上

使得姓字呪曰若差我與汝拔却即差

酉時發者奴婢死鬼所為治之令瘡人確梢上捧上卧莫令

人道姓字即差

戌時發者自絞死鬼所為治之左索繩繫其手脚腰頭即差

亥時發者盜死鬼所為治之以刀子一口箭一隻友一周刀

安瘡人腹上其箭橫著底下即差

子時發者寒燭死鬼所為治之令瘡人脫衣東廂牀上卧左

手持刀右手持杖打令聲不絕无盆盛水著路邊即差

丑時發者斬死鬼所為治之令瘡人當戶卧頭東向血流

頭下即差

瘡醫並不能救者方

以繩量病人脚圍繞足跟及五指一面訖截斷繩取所量

得繩置項上著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯

即定候看復惡寒急灸三十壯即定比至過發一炊久候

之雖飢勿與食盡日此法神驗男左女右

黃疸第三論

論曰凡遇時行熱病多必內瘀著黃但用瓜丁散內臍中令

黃汗出乃愈即於後不復病黃矣常須用心警候病人四肢

身面微似有黃氣須用瓜丁散不得令散漫失候必大危矣

特忌酒麪犯者死

黃疸目黃不除瓜丁散方

瓜丁細末如壹大豆許內臍中令病人深吸取入臍中黃

水出差

凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃變出小便亦少大便

時閉氣力無異食飲不化已服諸湯餘熱不除久黃者苦參

散主之方

苦參

黃連

黃蘗

黃芩

大黃

瓜丁

右法味搗篩為散飲服方寸匕當大吐者日壹服不吐者

日再亦得下服藥五日知可消息不知可更服之

熱除必噉噉者

半夏 薑 生薑 半斤

右貳味切以水壹斗煮取貳升分再服

黃疸身目皆黃皮肉變黃出方

茵陳 檉柳 梔子 仁 石青 壹斤

一身盡黃目黃腹滿小便不利方

礬石^{伍兩 研} 滑石^{伍兩 研}

右貳味搗篩為散水服方寸匕日三服先食服之便利如血已當汗出愈^{千金以麥}

風疸小便數或黃或白酒酒惡寒壯熱好睡不欲動方

生艾^{三月三日服一束} 附子^{壹兩 切} 黃連^{壹兩}

凝水石^{壹兩} 苦參^{壹兩} 葶藶子^{壹兩} 枯樓^{各壹兩}

右陸味搗篩為散以艾煎和為圓如梧子先食飲服伍圓日三可至貳拾圓有熱加苦參渴加枯樓小便澀加葶藶

小便多加凝水石小便黃白加黃連大便難加大黃

秦椒^{壹分} 瓜^{壹分} 牛兩

右貳味搗篩為散水服方寸匕日三

秦主九逆散方

胃疸食多喜飲梔子人主之

心疸煩心中熱黃根主之

腎疸脣乾黃蘗子主之

脾疸尿赤出少惕惕恐枯樓主之

膏疸飲少尿多秦椒瓜蒂主之

舌疸渴而數便鍾乳主之

肉疸小便白凝水石主之

髓疸目眦深多嗜卧牡蠣澤瀉主之

肝疸胃熱飲多水激肝白朮主之

右壹拾壹味等分隨病所在加半兩搗篩為散飲服伍分

匕日三稍稍加至方寸匕

論曰夫酒疸其脈浮者先吐之沈弦者先下之酒疸者或無

熱靖言了之腹滿欲吐者宜吐之酒疸心中熱欲嘔者且吐

之酒疸必小便不利其候當心中熱足下熱是其候也酒疸

下之久久為黑疸目青面黑心中如啖蒜薑大便黑皮革

搖之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之也

寒水石^{壹兩} 白石脂^{壹兩} 括樓^{各壹兩} 知母^{壹兩} 菟絲子^{壹兩}

右陸味搗篩為散麥粥服五分匕日三五日知十日差

酒疸身黃癰瘰生牛膽煎方

牛膽^{壹枚} 大黃^{壹兩} 芫花^{壹兩} 葶藶子^{壹兩} 瓜^{壹兩} 丁^{壹兩}

右伍味以酒壹升切肆味漬之一宿煮減半去滓內牛膽

微火煎令可圓丸如大豆服壹丸日移六七尺不知更服

壹丸臍上吐臍下利或不吐利而瘥

酒疸心中懊憹或痛梔子湯方

梔子^{拾肆枚} 枳實^{壹兩} 大黃^{貳兩} 豉^{半升}

右肆味以水陸升煮取貳升服柒合日三

茵陳^{參兩} 黃疸^{參兩} 酒疸^{參兩} 身目悉黃方

茵陳^{參兩} 大黃^{壹兩} 黃芩^{壹兩} 黃連^{壹兩} 人參^{半兩}

右柒味以水壹斗煮取參升五合分四服

此根本虛勞風冷飲食傷心由脾胃客淡所致方

半夏^{壹兩} 生薑^{拾兩} 黃芩^{壹兩} 前胡^{壹兩} 茯苓^{壹兩}

當歸^{壹兩} 茵陳^{壹兩} 枳實^{壹兩} 大戟^{壹兩} 白朮^{壹兩}

甘草^{壹兩} 右壹拾壹味以水壹斗煮取參升分參服

凡患黃疸足腫小便赤食少羸瘦方

乾地黃 石斛 白朮各一兩 牡蠣炙 芍藥

芎藭 大黃 小草 甘草炙

右玖味搗篩為散鍊蜜和圓如梧子飲服四圓日二

伏苓 茵陳 乾薑 半夏 杏仁各一兩

商陸半兩 甘遂一分 枳實一分 蜀椒一分 白朮一分

右壹拾味搗篩為末鍊蜜和圓如蟬豆參圓以棗湯下之

夫患黃疸常須服此若渴欲飲水即服伍分散若妨滿宛

轉圓治之五苓散見傷寒中

治黃疸小便赤黃方

前胡 茯苓 椒目 附子半分 炮去

茵陳 黃芩 呂蒲 附子半分 炮去

右陸味搗篩為散食以前服一錢匕日三服此劑更參服

上二藥

黃疸之為病日晡所發熱惡寒少腹急體黃額黑大便黑溲

溲足下熱此為女勞也腹滿者難療方

滑石 石膏 石脂

右貳味為散麥粥汁服方寸匕日三小便極利差

冬黃法

第十一椎下俠脊兩邊各一寸半灸脾俞百壯

兩手小指端灸手少陰隨年壯

手心中灸七壯

胃管主身體痿黃多百壯治十差忌針

耳中在耳門孔上橫梁主黃疸

上腭入口裏邊在上縫赤白脉上是針三鏹

舌下俠舌兩邊針鏹

頰裏從口吻邊入往對頰裏去口一寸鏹

上腭裏正當人中又脣針三分鏹

巨關 上管

右二穴並七壯狂言浪走者灸之差

寅門從鼻頭直入髮際度取通繩分為三斷繩取一分入髮

際當繩頭錐鑽不虧味正

脊中椎上七壯

屈手大指節理各七壯

中管 大陵 勞宮 三里 然谷 大谿

右八穴皆主黃疸

論曰黃疸之為病若不急救多致於死所以具述古今湯藥

灸鏹方法按據此無不差也有人患之皆昏昧不識好惡與

茵陳湯一劑不解亦有惺惺如常身形似金色再服亦然隔

兩日一劑其黃不變於後與灸諸穴乃差瘡上皆黃水出然

此大慎癰肉醋魚蒜非熱食犯之即死

吐血第四論三首 方三十首

論曰凡吐血有三種有內衄有肺病有傷胃內衄者出血如

鼻衄但不從鼻孔出是近心肺間津液以還流入胃中或如

豆汁或如蟬血凝停胃中滿悶或或去數升乃至一斗得

之於勞倦飲食過常所為也新病者或飲酒之後悶吐血從

吐出或一合半升傷胃者因飲食大飽之後胃中冷則不能

消化便煩悶強嘔吐之物與氣共上衝覺傷胃口血色鮮

赤腹中絞痛自汗出其脉緊而數者為難治也吐之後體中

但奄奄然心中不悶者無自愈煩躁心中悶亂紛紛欲

吐顛倒不安醫者又與黃土湯阿膠散使悶亂卒至不救

如此則胃常急吐之

吐方

瓜蒂 半兩 杜蘅 人參 各一兩

右參味嚼碎為散服一錢白米羹無在得下而巳瀉者小減之吐去青黃或血二三升無苦

主憂志嘔血煩滿少氣胃中痛方

生地黃 大棗 阿膠 甘草 各一兩

右肆味以水陸升煮取肆升分爲肆服日參夜壹

主勞內傷寒熱煩連吐血方

糖參 芍藥 半夏 生薑 大棗 各一兩

右陸味以水貳斗煮取柒升分柒服日三夜一有餘

治噎止唾血方

石膏 生薑 麻黃 五味子 各一兩

又方

小麥 壹升 厚朴 炙 半夏 杏仁 各一兩

右捌味以水壹斗煮取柒升分柒服日三夜一有餘

五合分再服

伏龍肝 乾薑 當歸 桂心 芍藥 白芷 阿膠 甘草 細辛 半兩

右壹拾貳味以清酒柒升水參升合煮取參升去

滓內膠煎取參升分三服亦治衄血

主吐血方

當歸 黃芩 乾薑 芍藥 阿膠 各一兩

右伍味以水陸升煮取柒升分柒服日三夜一有餘

主吐血方

當歸 黃芩 乾薑 芍藥 阿膠 各一兩

右伍味以水陸升煮取柒升分三服日三夜一

主吐血并衄血方

伏龍肝 乾地黃 乾薑 牛膝 阿膠 各一兩

右陸味以水壹斗煮取參升去滓內膠分三服

主傷中裏急胃脘痛煩嘔血時寒時熱小便赤黃

此傷於多者方

澤蘭 糖 桑白皮 桂心 遠志 生薑 各一兩

右捌味以水陸升煮取柒升分柒服日三夜一有餘

服壹升日三夜一勿勞動

主吐血汗血大小便出血方

淡竹茹 當歸 黃芩 芍藥 桂心 各一兩

甘草 人參 芍藥 桂心 各一兩

白朮 各一兩

右玖味以水壹斗煮取三升分四服日三夜一

治吐血唾血或勞發或因酒發方

當歸 羚羊角 乾地黃 小商根 柏枝 各一兩

阿膠 乾薑 白芍藥 白朮 伏龍肝 各一兩

亂髮 竹茹 蒲黃 在合甘草 各一兩

右壹拾肆味以水貳斗煮取五升五合去滓下膠消

盡下疑衣蒲黃分五服

吐血白治不差療十差神驗不傳方

地黃汁 大黃 生薑 各一兩

右貳味煎地黃汁三沸內大黃末調和空腹服之日二血

即止神良

治吐血方

服桂心末方寸匕日夜可二十服

治身腫暴血卑口耳目九孔皮膚中皆漏血方

取新生犢子未食草者有屎暴乾燒和水服方寸匕日四五服立差

治諸虛主衄血方

生地黃 黃芩 柏葉 薑 阿膠 炙 甘草 各各 合分三服

右伍味以咀以水柒升煮取叁升去滓內膠煎取二升五

又方

生地黃 阿膠 蒲黃 各各

右叁味以水伍升煮取叁升分三服

治鼻口瀝血三升氣欲絕方

龍骨細篩一棗核許微以氣吹入鼻中即斷更出者再吹之取差止

又方

細切葱白搗絞取汁瀝鼻中 棗許即斷

熱麴生冷等

主衄血不止方

阿膠 龍骨 當歸 細辛 桂心 各各

右柒味搗篩為散先食飲服方寸匕日三服三劑差亦可

治諸虛主衄血方

生地黃 黃芩 柏葉 薑 阿膠 炙 甘草 各各

右伍味以咀以水柒升煮取叁升去滓內膠煎取二升五

合分三服

又方 生地黃 阿膠 蒲黃 各各

甘草 乾薑

右玖味以咀以水壹斗叁升煮取三升內藥煮取三

升分三服

治諸虛主失血虛勞背腹煩滿痛血來藏虛不受穀嘔逆

不用食補中治血方

乾地黃 厚朴 炙 乾漆 熬 枳實 炙 乾薑

防風 大黃 細辛 白朮 各各 前胡 各各

人參 茯苓 各各 麥門冬 各各 甘草 各各 當歸

右壹拾捌味搗羅為末鍊蜜和圓如梧子先食酒服五丸

日三

論曰凡下血者先見血後見便此為遠血宜服黃土湯先見便後見血此為近血宜服赤小豆當歸散人病雖一得病之始不同血氣強弱堪否次第是以用藥制方隨其淺深取其能堪為方不一各取所宜也

附子 炮去 阿膠 黃芩 各各 白朮

右柒味以咀以水捌升煮取貳升分溫三服亦主吐血

赤小豆當歸散方

赤小豆 當歸 各各

右貳味搗篩為散先服一方寸匕日三

治諸虛主失血虛勞背腹煩滿痛血來藏虛不受穀嘔逆

續斷 當歸 阿膠 炙 枳實 炙 乾薑

右壹拾捌味搗羅為末鍊蜜和圓如梧子先食酒服五丸

日三

又方 赤小豆 當歸 各各

伏龍肝湯主先見血後便轉此為遠血方

伏龍肝伍合 乾地黃伍兩 髮燒屑貳合 阿膠參兩

黃芩 乾薑 牛膝 槲朮炙

甘草各貳兩

右玖味咬咀以水壹斗。煮取三升。去滓下膠及髮屑消盡分三服

下血方

牛角膠炙 當歸 龍骨 乾薑 熟艾各壹兩

蜀椒壹兩 去汙 黃連伍合 升麻半兩 大棗貳拾

附子壹枚 炙 黃蘗 芎藭 阿膠炙

厚朴炙 赤石脂 芍藥 石榴皮 甘草炙

右壹拾捌味咬咀以水壹斗伍升。煮取四升。去滓內牛角膠末阿膠消以綿絞去滓分七服。日四夜二。小瘡有

治小便出血方

龍骨細粉末之溫湯服方寸匕。日五六服

又方 以酒叁升煮當歸四兩取壹升。頓服之

治尿血方

車前葉切伍升。水壹斗。煮百沸。去滓內米煮為粥服之。凡憂恙絕傷吐血背痛虛勞地黃煎方

生地黃伍斤 搗汁

右壹味微火煎三沸內白蜜壹升。又煎三沸。服之日三。

治亡血脫血鼻頭白色唇白去血無力者方

生地黃拾斤

右壹味搗以酒壹斗絞取汁令極盡。去滓微火煎減半內白蜜伍升。煮膏壹升以攪之。勿止。令可九下之。酒服如雞子壹圓。日叁次。服不已老而更少。萬病除愈。

論曰凡亡血吐血衄血愈後必須用此三方。神效三四劑乃可平復。不爾恐有大虛及婦人崩中血亦同此方。

胃中熱第五方二十七首

寒水石伍兩 澤瀉 茯苓 前胡 黃芩

柴胡 牛膝 白朮 甘草炙 杏仁去皮

右壹拾味咬咀以水壹斗。煮取貳升。分叁服。治熱氣上衝不得息欲死不得眠方

白薇 檳榔 白石英研 枳實炙 白鮮皮

麥門冬去心 郁李仁去皮 貝母貳兩 天門冬去心 桃仁去皮

車前子 茯苓各壹兩 人參 前胡 杏仁去皮

橘皮各壹兩 桂心半兩

右壹拾柒味搗篩為末。鍊蜜和圓如梧子大。竹葉飲下十圓。日貳服。加至叁拾圓。

竹葉飲子方

竹葉切 紫蘇各壹兩 紫苑 白前 甘草炙

百部貳兩 生薑切 紫苑 白前 甘草炙

右柒味咬咀以水壹斗。煮取叁升。溫以下圓盡更合。

龍膽 苦參 黃連 黃芩各壹兩 大黃參兩

黃蘗 李子仁各壹兩 枳實 青柏子各壹兩

右玖味搗篩為末。鍊蜜和圓如梧子大。先食飲服柒圓。日二。不知增之。

升麻湯主強壯身有大熱熱毒流四肢骨節急痛不可忍腹中煩滿大便秘澀無聊賴方

升麻 枳實炙 梔子仁 黃芩各壹兩 香豉壹升

升麻 枳實炙 梔子仁 黃芩各壹兩 香豉壹升

升麻 枳實炙 梔子仁 黃芩各壹兩 香豉壹升

大黃韋兩 杏仁壹升去皮 生薑肆兩 生地黃拾兩

人參貳兩 甘草貳兩

右壹拾壹味咬咀以水壹斗貳升煮取三升去肉藥 取參并半分四服日三夜一 又主歷氣腫

又方

升麻各半 大黃各半 前胡各半 枳實各半

右肆味咬咀以水玖升煮取參升分三服

茯苓各半 五味子各半 甘草各半 烏梅去核 大棗去核

右伍味搗篩為散別搗梅棗令熟乃合餘藥更和搗五百杵圓如彈子大含之咽汁日三夜二任性分作小圓

半夏洗 主胃中客熱心下煩滿氣上大小便難方

半夏洗 生薑各半 前胡各半 茯苓各半 白朮伍兩

右壹拾壹味咬咀以水壹斗煮取參升旦服若胃中大煩熱者冷服大便難澀者加大黃參兩

前胡主胃中逆氣痛微背少氣不食方

前胡各半 半夏洗 芍藥各半 甘草各半 桂心各半

生薑洗 黃芩各半 人參各半 當歸各半 大棗各半

右壹拾壹味咬咀以水壹斗煮取三升分三服

又方

前胡各半 人參各半 生薑各半 麥門冬去心 各半

桂心各半 黃芩各半 當歸各半 大棗各半

右壹拾壹味咬咀以水壹斗煮取參升分三服

前胡主寒熱嘔逆少氣心下堅彭耳滿不得食寒熱消渴補不足方

前胡各半 朴消各半 大黃各半 黃芩各半 甘草各半

茯苓各半 當歸各半 半夏洗 芍藥各半 滑石各半

石膏碎 枳實各半 附子炮去 麥門冬去心 人參各半

生薑洗

右壹拾陸味咬咀以水壹斗煮取陸升分陸服

前胡主大勞虛寒寒熱嘔逆下焦虛熱小便赤痛客熱上熏頭痛目赤骨內痛及口乾皆悉主之方

前胡各半 芍藥各半 當歸各半 茯苓各半 桂心各半

人參各半 生薑洗 白朮各半 半夏洗 黃芩各半

甘草洗

右壹拾壹味咬咀以水壹斗煮取四升去滓內糖分為肆服

厚朴主腹滿發熱數日方

厚朴各半 枳實各半 大黃肆兩

右叁味咬咀以水壹斗煮取伍升內大黃煮取三升分三服主腹中熱大便秘不利

五石湯主骨間熱熱痛間不除煩悶口中乾渴方

寒水石各半 滑石各半 龍骨各半 牡蠣各半 枳實各半

赤石脂各半 黃芩各半 甘草各半 知母各半 桂心各半

石膏各半 大黃各半

右壹拾貳味搗篩以水七升煮取參升分四服日三夜一

竹葉湯主五心熱手足煩疼口乾唇乾胃中熱方

竹葉切 小麥舂 人參各半 石膏各半 生薑各半

知母 黃芩 茯苓 麥門冬各二兩

括樓 半夏洗 甘草炙

右壹拾貳味咀以水壹斗貳升煮竹葉小麥取捌升去滓內諸藥煮取叁升分三服

犀角湯 主熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角兩 羚羊角兩 石膏升 前胡

知母 黃芩 射干各二兩 大黃 升麻各肆兩

右玖味咀以水壹斗煮取三升分三服

承氣湯 主氣結胃中熱在胃管飲食嘔逆方

前胡 梔子炙 桂心 寒水石 大黃

知母 甘草各二兩 石膏 括樓各二兩

右壹拾味搗篩為散以水貳升煮藥五方寸匕取壹升五合分貳服

生夏湯 主逆氣心煩滿嘔吐氣方

半夏洗 生姜各二兩 茯苓 桂心各伍兩

右肆味咀以水壹升煮取叁升分三服日三服若少氣加甘草貳兩一名小扶苓湯

療熱骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息兩鼻孔張日西即發方

龍膽 黃連 括樓各壹兩 梔子各二兩 芒消各半兩

苦參 大黃 黃芩 芍藥 芒消各半兩

右壹拾味搗篩為末鍊蜜和丸如梧子大飲服十九日二以知為度

療積年久患熱風方

地骨皮 萎蕤 丹參 黃耆 澤瀉

麥門冬各二兩 清蜜 薑汁各壹升 生地黃汁貳升

右玖味咀以水陸升煮藥減壹升內蜜薑汁煮兩沸壹

服三合日再大驗

又方

羚羊角伍兩 生葛 梔子各二兩 乾薑 芍藥各二兩 鼠尾草貳兩

右捌味咀以水柒升煮取二升半分三服

又方

枳實伍兩 黃連貳兩 黃芩 芒消各壹兩

右肆味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子飲服叁拾圓日三稍加至四十九

生地黄煎主熱方

生地黄汁肆升 生地骨皮 生天門冬各二兩

生麥門冬汁 白蜜各壹升 竹葉切 生薑汁各壹升

石膏兩 栝樓伍兩 茯苓 姜蕤 知母各肆兩

右壹拾貳味咀以水一斗二升先煮藥取三升去滓內

地黃麥門冬汁微火煎五沸次內蜜薑汁煎取六升下之

服四合日二夜一稍加至五六合

治腸上熱方

茯苓 麥門冬各二兩 甘草各二兩 生地黄各二兩

右肆味搗三味為散內地黃全搗暴乾搗篩為散酒服方

寸匕日三候食了服之又服補益明目

治腹中虛熱舌本強直頸兩邊痛舌上有瘡不得咽食方

柴胡 升麻 梔子仁 芍藥 通草各肆兩

黃芩 大青 杏仁各二兩 生薑切 石膏各二兩

右壹拾味咀以水壹斗二升煮取六升分六服

頭痛身熱及熱風方

竹瀝 升麻各二兩 防風 生薑切 杏仁各二兩

芍藥 柴胡各半 石膏半斤 生葛各半

右芍藥吹咀以水壹斗煮取四升分四服日三夜一服以差為度

治腸上熱方

苦參拾兩 玄參參兩 麥門冬去心 黃芩十兩

右肆味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子以飲服十五圓日二食後服

歷熱第六方

金石凌主服金石熱發醫所不制服之立愈方

上朴消壹斤 上芒消壹斤 石膏肆兩 凝水石貳兩

右肆味熟沸水伍升漬朴消芒消令消澄一宿日取澄清

安銅器中懸擣寒水石石膏內其中仍內金五兩微火煎之頻以筋頭柱看著筋成凌雲為置銅器中留著水盆中凝一宿皆成凌停三日以上皆乾也若熱病及石發皆以蜜水和服半雞子大

七水凌主大熱及金石發動金石凌不制者服之方

朴消伍斤 芒消叁斤 滑石壹斤 玉泉石壹斤

石膏壹斤 國城伍斤 凝水石壹斤

右柒味各別搗篩

凍凌水伍升 霜水壹斗 露水伍升

寒泉水伍斗 雨水壹斗 東流水伍斗

右柒味澄令清銅器中內上件七味散極微火煎取柒升

一宿澄清內瓷瓶中淨更貯之以重帛繫口一百二十日皆如凍凌狀成如白石英有八棱成就或天如筋有長一尺者名曰七水凌有人服金石發熱者以井單水和五分已服之一服極熱即定傷寒發熱服一刀圭小兒發熱與

麻子許不可多用神驗買藥不得爭價皆上好者合藥以臘月臘日為上合時以清淨處先齋七日不復穢污黃孝

產婦之家及不得令雞犬六畜生婦六根不完具及多口饒言人見之不信教人勿與服之服藥得熱退之後七日

乃慎酒肉五辛等物勿復喜惡口刑罰仍七日齋戒持心清淨

紫雪主脚氣毒遍內外煩熱口生瘡狂叫走及解諸石草熱

藥毒發卒熱黃等瘡疫毒最良方

金壹斤 寒水石 石膏 礞石各壹斤

右肆味以水壹石煮取肆斗去滓內後藥

升麻壹斤 玄參壹斤 羚羊角兩 青木香

犀角兩 沈香各伍 丁香兩 甘草兩

右捌味吹咀於汁中煮取一斗去滓內消石四升朴消精者四升於汁中煎取柒升投木器中朱砂粉三兩麝香粉半兩攪令相得寒之二日成於霜雪紫色強人服三分已

服之當利熱毒老小以意增減用之一劑可十年用之

玄霜主諸熱風熱氣熱瘴熱瘧惡瘧毒內入攻心熱悶服諸

石藥發動天行時氣溫疫熱入腑藏變成黃疸蛇螫虎咬狐

狼毒所咬毒氣入腹內攻心熱須利病出用水三四合和一

小兩攪令消服之兩炊久當快利兩行即差小兒熱病服藥

許大即差方

金壹斤 寒水石 礞石各壹斤 石膏壹斤

右肆味以兩斛水煮取六斗澄清

升麻 玄參 羚羊角兩 犀角兩

青木香 犀角 沈香

右陸味切內上件汁中煮取二斗澄清

扑消末 芒消各壹兩 麝香壹兩子煙兩

右參味內汁中漬一宿澄取清銅器中微火煎取壹斗二升以匙抄看凝即成下經一宿當凝為雪色黑耳若猶濕者安布上日乾之其下水重煎水凝即可停之如初畢密器貯之此藥無毒又主毒風脚氣熱悶赤熱腫身熱熱瘡水漬少許綿貼取點上即差煩與兩服病隔上熱食後服腫下熱空腹服之卒熱淋大小便不通服一兩元有患熱者皆宜服之

論曰凡諸病發等方皆據胃肝金石大藥總發極難非諸草藥所能制者則用之若非金石發者則用草藥等湯散方制之不得雷同用霜藥方若用之則傷於太冷於後腰脚疼痛乃更後為所慮是消息之

主胃虛陽氣外蒸汗流口乾體吸吸苦渴氣喘嘔逆痰沫相連方

竹葉切伍

小麥壹升 麥門冬壹升知母

茯苓 石膏四兩 芍藥 栝樓

澤瀉 人參 甘草炙各

右壹拾壹味以水一斗煮竹葉小麥取一斗去滓內藥煮取肆升分四服

主久積痰冷有脇痞滿不受食飲渾渾欲吐血室空虛各陽通之令脉緊數重熱水蒸汗漏如珠四肢煩痛唇口乾燥渴升水漿方

厚朴炙

半夏洗 茯苓 白朮各四 枳實四枚

芍藥 黃芩壹兩 生薑切八兩 麥門冬壹升

桂心伍分 人參 甘草炙各

右壹拾貳味以水一斗伍升煮取五升分四服

主下氣胃中煩悶悶亂氣逆補不足方

竹葉壹把粳米 麥門冬壹升半夏壹升人參

當歸各二生薑切壹斤

右柒味以水壹斗伍升煮竹葉生薑取一斗內諸藥煮取八升分十服日三夜二

主下氣消渴止悶方

烏梅一升 香豉壹升

右二味以水壹斗煮烏梅取五升去滓內豉煮取三升分三服可常用之

主勞煩悸奔氣在胃中不得眠方

人參 茯苓 生薑切

芍藥 桂心各二 甘草炙一

右七味以水一斗二升煮人參取七升去滓內諸藥煮取叁升分三服

主虛煩短氣氣逆上熱下冷胃滿方

大棗壹拾 石膏壹兩 白礬 前胡

人參 防風各二 桂心 甘草炙各壹

右捌味以水柒升煮取三升分三服

主短氣欲絕不足以息煩悸氣上煩方

竹根一斤 小麥 粳米 麥門冬各壹升

右陸味以水壹斗煮米麥令熟去之內諸藥煮取二升七分分三服日二不能服者以綿漚口中

主傷寒及吐下後心煩之氣不得眠方

酸棗仁四升 麥門冬壹升 乾薑 芍藥

茯苓 知母 甘草炙各

右壹拾貳味以水一斗伍升煮取五升分四服

右柒味。以水壹斗貳升。煮取壹斗。去之。內諸藥。煮取叁升。分二服。

白薇散主虛煩方

白薇

乾薑

甘草各壹兩

桔樓貳兩

消石叁兩

右伍味。各別搗。先內甘草。中次內白薇。次內乾薑。次內桔樓。次內消石。搗三千杵。篩。以水服。方寸匕。日三。

千金翼方卷第十九

雜病中

消渴第一 方二十二首

桑根湯 主一年渴飲一石以上小便利若飲酒渴傷寒渴皆悉主之方

霜下桑根皮 壹斤 長

右一味以水一斗煮取三分分三服取差止

又方

栝樓根 甘草 黃連 黃芩

右三味咬咀以水五升煮取二升五合分三服

栝樓根 主胃反吐而渴方

茯苓 剉兩 澤瀉 剉兩 生薑 切 桂心

白朮 剉兩 甘草 壹兩

右六味咬咀以水一斗煮小麥三升減三升去麥內諸藥

煮取二斗五合服八合日再

消渴師所不能治方

生老棧 方 切 上好黃連 剉兩

右三味以上件汁煮黃連如使變細切日煮三次分三服

饒更浸如前日暴燥一飯前法往反汁煮盡黃連師鍊蜜

和飲服如梧子十九日三加至二十九病愈止百日慎生

冷醋滑酒五辛肉麵油膩永差無生者乾者九斤切以水

二斗煎取一斗和之如生者法

桑根白皮 切伍升 入地冬尺

右一味以水與根亦不限多少煮以味濃為度適寒溫飲之任性多少切慎鹽

猪肚 治消渴方

猪肚 壹枚 治黃連 伍兩 栝樓 肆兩 麥門冬 肆兩

知母 肆兩 代

右五味為散內猪肚中線縫安黃連中安栝樓麥門冬

木臼中搗可丸若硬加少蜜和丸如梧子飲服參拾九日

再新加至肆拾伍粒圓渴即服之

葛根 主消渴方

葛根 剉兩 栝樓 各壹兩 鈆丹 貳兩 附子 壹兩

右四味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子飲服十圓日三服治

大黃 主消渴小便多大便秘方

大黃 壹斤 栝樓 土瓜根 各剉兩 杏仁 五合 去

右肆味破大黃如梧子冷水漬一宿蒸暴乾搗篩為末鍊

蜜和圓如梧子大以飲服伍圓日參以知為度

酥 主消渴方

酥 壹升 白蜜 壹升 芒消 貳兩

右三味合煎欲渴即啜之日六七益氣力神效

羊脂 主消渴方

羊脂 剉兩 白蜜 貳合 甘草 壹兩

右叁味以水參升煮取壹升去滓內蜜煎令如飴

含之盡復含之

酥 主諸渴方

酥 壹升 蜜 壹升

右二味合煎令稠和服貳升當令下利藥出明日更服

壹升後日更服壹升即愈此酒及藥等

主諸消渴方

扶苓 貳斤 白蜜 肆升

右貳味於銅器中重金煎以兩並並白為候黃即煎熟先食服如雞子大日三

主消渴肌瘦羸瘦方服不能自止小便不禁悉主之方

木防己 壹兩 栝樓 貳升 黃連 貳斤

右肆味搗篩為散先食以苦酒壹升以水貳升合為羹服方寸匕日三服詎當強飲極令盈溢一日再服則憎水當不欲飲也

大渴百方療之不瘥方

鉉丹 胡粉 各半 栝樓 甘草 各貳

澤瀉 石膏 赤石脂 白石脂 各伍

右捌味搗篩為散水服方寸匕日叁壯人壹匕半壹年病一日愈二年病二日愈渴甚者夜兩服腹痛者減之圓服亦佳一服十圓傷多則腹痛也

治口乾燥方

酸棗 壹升半 酸石榴子 伍合末 烏梅 伍拾枚

麥門冬 貳兩 桂心 壹兩 栝樓 壹兩 葛根 各壹兩

右壹拾味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子飲服叁拾圓日貳稍以口有津液為度忌如禁治

王男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱方 巴郡太守奏

黃芩 陸兩 大黃 叁兩 黃連 肆兩

黃芩 陸兩 大黃 壹兩 黃連 柒兩

黃芩 陸兩 大黃 貳兩 黃連 叁兩

大黃 伍兩 黃連 壹兩

右叁味時令日搗為末鍊蜜和如大豆飲服伍圓日叁不知稍增主赤白痢一月病愈久服行及奔馬嘗試有驗

主消渴方

鉉丹 貳兩 栝樓 捌兩 茯苓 甘草 各半 麥門冬 捌兩

右伍味搗篩為散旦以漿服方寸匕日貳

膀胱冷小便數多每至夜偏甚方

龍骨 伍兩 茯苓 伍兩 黃連 伍兩 桂心 貳兩 赤石脂 陸兩

右柒味搗篩為散酒服方寸匕半日再服伍日中可作羊湯炙一劑十日外可作羊肉臠香味如常食飽與之尿黃壯蠟主內消小便數方

杜蠟 貳兩

右壹味以患人尿叁升煮取貳升分再服

治渴利方

豆壹升 脂肆兩 麥門冬 壹升 黃連 壹斤 知

右貳味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子飲服叁拾圓日貳稍加至肆拾圓神驗

大病後虛羸不足成渴方

取柒歲以上伍歲以下黃牛新者乳壹升以水肆升煎取壹升適寒溫稍稍飲之不得過多拾日服之不任佳二云渴即飲不限多少

又方

取自死雞大者壹枚以參升半白湯捉脚到細細淋之叁

柒遍拔毛置於湯中毛盡去毛取汁澄清湯即任性飲之

飲盡即愈其雞故殺作藥不過柒日其病倍發以後月藥

不可差候之慎之

主消渴延年益壽方

栝樓 柏根根 赤石脂 茯苓 天門冬 桂心 菊花

牛膝 乾地黄 麥門冬 葛蒲 雲母粉 澤瀉 卷柏

山茱萸 遠志 五加皮 杜仲 瞿麥 石韋 巴戟天

忍冬 菟絲 車前子 蛇牀子 石韋 巴戟天

鍾乳 署預 甘草 日參 拾氣味 擣篩為散 酒服方寸匕 日參 亦可圓服拾

圓日參

淋病第二 方二十首

治血淋熱淋方

以非桑葉燒令熟以手熟按熱掩尿處冷即易之可六七

度差

治熱淋方

白茹根 車前子

右桑葉切以水壹斗伍升煮取伍升每服壹升日參夜貳

治石淋方

車前子貳升續食粥以水捌升煮取叁升頓服之酒車當

下石石宿勿食服之良

又方

常煮桑葉根作飲服之石出

開格不通方

芒消 伍兩 芍藥 肆兩 木仁 肆兩 去皮尖

麻子仁 叁兩 枳實 伍兩 大黃 半斤 乾地黄 貳兩

治淋方

右桑葉咬咀以水柒升煮取叁升分叁服

車前子 壹把 榆白皮 壹兩 亂髮 雞子大

右桑葉以水陸升煮取叁升分再服

又方

黃芩 肆兩

右桑葉咬咀以水伍升煮取貳升分叁服

治淋方

榆白皮 切壹車前子 切伍葵子 壹升 滑石 捌兩

通草 捌兩 赤靈 壹升

右六味咬咀以水叁升煮取柒升去滓下蜜更煮取叁升

分叁服

治尿白稠方

露蜂房燒灰服方寸匕黃汁服亦佳

治小便不通方

滑石 貳兩 葵子 壹兩 榆白皮 壹兩

右桑葉為散濃煮麻子汁壹升半取壹升以貳方寸匕和

服兩服即通

治小便不通方

內薑黃末如豆許大小便孔中即通

又方

通草 猪苓 桑白皮 碎

右桑葉咬咀以水陸升煮取貳升分貳服

治丈夫女人胸膈不得小便八九日方

滑石 壹斤 寒水石 壹斤 葵子 壹升

右桑葉以水壹斗煮取伍升盡服即利

【卷之八】主小便多或不禁方

黃絲子兩 蒲黃金 黃連五兩 消石壹兩 肉蓯蓉五兩

右五味并雞臍腔中黃皮參兩為散服方寸匕日三行參

肆里又服方用五

治小便不利膀胱脹水氣流腫方

水上浮萍乾末服方寸匕日三

治小便不禁多日便壹貳斗或如血方

麥門冬去心 茯苓子 乾薑兩 甘草壹兩 乾薑兩

桂心兩 乾地黃兩 續斷兩

右柒味咬咀以水壹斗煮取貳升伍合分參服

又方

鹿茸長參 躑躅葉 桂心壹尺 韭子壹升

附子去皮 澤瀉五兩

右陸味為散服伍分日三稍加至壹寸匕漿水服之差

治大小便不通

當歸金 大戟壹升 牛膝壹升

右叁味切以水伍升煮取貳升以大豆伍升煎令汁盡豆

乾初服叁枚以通為度

【卷之九】王大小便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩迫短氣

汗出腹滿方

生葛根貳斤 猪膏貳升 大黃壹兩

右叁味咬咀以水柒升煮取伍升去滓內膏煎取三升澄

強人頓服贏人再服

霍亂煎方

好濃酒壹斗

右貳味和以酒內之少煎勿住手可圓得就鑊圓如小

滿大內肛腸中不過參必通如不通者數盡也神效

水腫第二 方二十六首并五不治者

凡水腫有五不治

一、面腫蒼黑是肝敗不治 二、掌腫無文理是心敗不治

三、腹腫無文理是肺敗不治 四、陰腫不起是腎敗不治

五、臍滿腫反者是脾敗不治

【卷之十】王虛滿通身腫利三焦通水道方

猪苓去皮 茯苓去皮 葶藶去心 人參 五味子

防風 澤瀉 狼毒 玄參 乾薑

白朮 桂心 椒目 大戟 遠志去心

甘草炙 女媧血 小豆貳合 桑葉壹分

右壹拾玖味搗篩為散酒服方寸匕日叁夜壹老小服壹

錢日叁以小便利為度

治百病諸邪狂走氣痞冷病歷年黃黑大腹水腫小兒丁

寒瘧疾經年霍亂中惡蟲尸及暴疾皆參主之方

芫青 巴豆去心 斑蝥去毒 天雄去毒

乾薑兩 烏頭去毒 細辛 蜀椒去目

附子去皮 躑躅 黃芩 桂心兩

右壹拾貳味細切以絹袋中盛酒壹斗漬拾日去滓服半

合日叁以知為度暴津作散酒服半錢日叁強人壹錢

傷寒中溫濕冷頭痛拘急寒熱瘧疾發頭風眩服壹錢已

厚取汗初服當吐清汁三四升許又主心疝婦人無子

服之煩悶不堪者飲冷水壹升即解

蒲黃酒 通身腫比風虛水氣小至是腫方

蒲黃 小豆 大豆各壹

商陸酒主風水腫方

取商陸切壹升以酒貳升漬參宿服壹升當下者減之從半升起日參盡更合服

又方

取大且壹升以水肆升煮取貳升去滓內上酒壹升合煎取壹升隨能杯飲之日參服常令有酒勢

主水腫大麤主薄與康公處得效方

茯苓

白木

椒目各壹

葶藶子壹兩

桂心參分

芒消

澤瀉

木防已各伍

甘遂參分

赤小豆

前胡

薤花各壹兩

右壹拾貳味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子蜜湯服伍圓日壹稍加以知為度

漢防已

澤瀉

石韋去毛

桑白皮

澤瀉

丹參

茯苓

橘皮

白木

生薑切兩

郁李仁伍兩

通草壹兩

右壹拾貳味搗篩為散以水壹升柒合內肆方寸匕煮取捌合頓服日貳小便利為度

第一之水先從面目腫遍一身名曰青水其根在肝大腹主之

第二之水先從心腫名曰赤水其根在心葶藶主之

第三之水先從腹腫名曰黃水其根在脾甘遂主之

第四之水先從脚腫上氣而數名曰白水其根在肺葶藶主之

第五之水先從足腫名曰赤水其根在腎連翹主之

第六之水先從面至足腫名曰玄水其根在膽羌花主之

第七之水先從四肢起腹滿大身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之

第八之水先四肢小其腹腫獨大者名曰石水其根在膀胱參根白皮主之

第九之水先從小腸滿名曰果水其根在小腸巴豆主之

第十之水先盛在虛下來下者名曰氣水其根在大腸赤小豆主之

右十一病皆藥等分與病狀同者則倍之白蜜和先食服壹圓如小豆日參飲下病者服參圓弱者當以意節之

治宿食流飲寒熱濕病水腫

郁李仁

右貳味以水肆升合煮取貳升頓服此粥日參度作服之

人強用十五枚羸者五六枚不知者稍加之以知為度

炙鯉魚主腫滿方

取鯉魚長壹尺伍寸以尿漬令沒宿平旦以木從口貫之至尾炙令黃熟去皮宿勿食頓服之不能者再服令盡神效

男女新久腫得惡暴風入腹婦人新產上瀉清風入臍腹中如馬鞭者噓吸短氣救嗽一味大豆煎方

大豆

右以水五斗煮之得壹斗參升澄清去下濁者內釜中以壹斗半美酒內汁中煎取玖升宿勿食日服參升溫覆取

汗兩食頃當下去風氣腫減慎風冷十日平復如故除日服之若急不可待除日逐急令服合時於清淨無人處令

童子壹人視之不用六畜婦人見之自度身中腫未盡更服參升差不了者勿服也神驗千金不傳

又方

楮皮葉

右壹味切以水壹斗煮取伍升去滓服之不過叁面腫乃

減雖得瘥常可服之肝金燥肺燥脾燥飲藥後飲粥

圖治水氣腫鼓脹小便不利山連治章司業得差司業
怪靈表所送云數用神驗

黃芩子黃芩子殺羊肺羊肺

右貳味湯微燉肺即薄切之暴乾搗末以三年大醋浸黃
芩子一伏時出之熬令變色就搗如泥和肺末蜜和搗作
圓食後一食久服如梧子肆圓麥門冬飲服之以喉中乾
口粘浪語為候數日小便大利即瘥

麥門冬麥門冬殺羊肺羊肺

右貳味以大合參合半水煮之米大熟去滓以下圓藥每
服常作

有人虛肌積年氣上似水病眼似腫而脚不腫方

穀精葉穀精葉

右壹味以水壹斗煮取陸升去滓內米煮粥亦以當水煮
羹等皆用之秋時多收以擬經冬用其水多少濃淡任人
勿拘此方慎黃芩子雞魚油膩重者參至服之永瘥輕者
壹年瘥

治水腫方

葶藶子葶藶子桂心桂心

右貳味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子飲服拾圓日二慎如
前法忌口味

圖主大腹水腫方

大腹大腹赤小豆赤小豆

右貳味取新精者仍淨揀擇以水淨洗去其水黃芩子使熟
暴令乾貯淨器中欲服取伍升麻子熟之令黃香惟須緩

火勿令焦細搗取末以水五升研取汁令盡淨器密貯之
明旦欲服今夜以小豆壹升淨淘漬之至曉乾漉去水以
和水煮未及好熟即漉出令乾內麻子汁中煮令大爛熟
為佳黃芩子腹冷意食日參其陳麴麻子並增其病慎勿用之
一切水腫皆忌飽食常須少飢後有灸三里絕骨作魚羹
法見千金中

圖主大水頭面遍身大腫瀉方

苦瓠苦瓠白穰實白穰實拾如大豆粒

右壹味以麴裹煮一沸空腹吞七枚午後出水壹升參肆
日水自出不止大瘦即瘥參年慎口味苦瓠須好無麴
者不甞有毒不堪用

圖主水腫方

檳榔檳榔桂心桂心

茯苓茯苓椒目椒目

厚朴厚朴乾薑乾薑

葶藶葶藶甘草甘草

右壹拾味搗篩為末鍊白蜜和圓如梧子飲服貳圓日
參加至肆圓不知又加貳圓可至拾貳圓此主老小水腫
虛腫大病客腫作喘者用之佳二云忌海藻必
風水通身腫欲利小便方

防風防風猪苓猪苓

澤漆澤漆白木白木

酒壹斗酒壹斗大豆大豆

右壹拾味白木以豆汁及酒合煮取柒升分陸柒服日
壹夜令盡當小便極利為瘥

圖主水通身洪腫四肢無塊或從消渴或從黃疸支

飲內虛不足。榮衛不通。氣不化。氣實皮膚中。喘息不安。腹中驚。腸脹滿。眼不得視。方

澤漆根拾兩 赤小豆貳分 茯苓參兩 鯉魚壹枚重斤

生薑切兩 人參 麥門冬去心 甘草貳兩

右八味以水壹斗柒升。煮鯉魚豆減柒升。去之。內藥。煮取肆升。伍合。去澤漆服三合。日三。弱人二合。日再服。氣下喘止。可至肆合。晡時。小便利。腫氣減。或小便下。若小便大利。還從壹合。始大。利止。若無鯉魚。鯛魚亦可。若水甚。不得目卧。不得轉側。加澤漆壹斤。渴。加杜樓貳兩。數加紫茄貳兩。細辛壹兩。款冬壹兩。桂心參兩。增魚汁貳升。

大豆湯 主風水通身大腫。眼不得開。短氣。欲絕。或欬。方

大豆壹斗 烏頭炮去 黃耆 澤瀉各壹

杏仁壹升去皮半夏 茯苓 白朮各伍

生薑切兩 麻黃去節 猪苓去皮 防風

木防已各肆 甘遂 甘草貳兩 酒壹升

右壹拾陸味以水肆斗。先煮大豆取壹斗。去豆。內藥。又酒合。煮取柒升。日肆夜叁。得快利。小便為度。腫減。便任。不必盡。若不得利。小便者。加生大戟壹升。煮藥。黃芩半。無不效。也。為不失一。

主風濕水疾身腫面目腫不仁而重方

麻黃去節 甘草貳兩

右貳味。以水伍升。煮取叁升。分叁服。重覆日。後貳次。汗出。不出。更合服之。慎護風寒。皮水用之。良。

治水腫方

以苦瓠穰壹枚。以水壹石。煮壹炊久。去滓。煎令可圓。服如大豆。小便利。後作小豆羹。乃飲食之。

又方

葶藶細兩 牽牛子 澤瀉 昆布洗

海藻洗 猪苓各壹兩

右陸味。末之。練蜜和圓。如梧子大。飲服拾伍圓。日叁。

主足腫腫小便黃官痛煩車骨筋解開痛方

石膽研 吳茱萸 天雄炮去 芫花熬

柏仁各壹 防風 葶花熬 杜仲各伍

芎藭 葶藶各伍 黃絲子各壹

右壹拾壹味。搗篩。為末。練蜜和。為圓。如梧子大。以飲服叁圓。日貳。

淡飲第四 方一十四首

治淡飲頭痛往來寒熱方

常山壹兩 雲母粉貳兩

右貳味。搗篩。為散。熱湯服壹方寸匕。吐之。止吐。不盡。更服。

主吐百病方

杜蘅 松蘿各壹 瓜蒂各壹

右叁味。切。以水酒各壹升。貳合。漬貳宿。去滓。分再服。若服已。即吐者。止。不吐者。更服之。每服相去。如人行十里。欲令藥力盡。食薑升。稀粥便定。老小用之。亦佳。金公酒壹升。

主寒熱方

赤石脂各壹 常山肆兩 甘草半兩

右叁味。以水壹斗。煮取貳升。去滓。內薑溫服。柒合。吐則止。不吐。更服。柒合。勿飲冷水。

又方

蜜貳合 醋捌合

右貳味。調和。旦頓服。須臾。復復然。欲吐。摘之。若意中不盡。

明目更服此藥不大服此藥不穩

白濁 主冷熱腸澼時頭痛悶亂欲吐不得方
葱白蠟燭 桂葉重把 烏頭炮去 眞珠

常山 甘草炙各

右陸味以咀以酒肆升水肆升合煮取參升去滓內眞珠服壹升得吐止

松蘿 主胃中痰積熱除之方

松蘿貳兩 烏梅煨赤 常山參兩 梔子貳兩 甘草炙 枳實貳兩

右伍味以咀以酒參升漬壹宿旦以水參升合煮取貳升伍合分再服得快吐便止不要傾盡貳服也

又方 松蘿壹兩 烏梅參兩 常山 甘草炙

右肆味以咀以酒參升漬壹宿在煮取貳升服壹升取吐止

五種飲 主五種飲壹曰留飲水在心下貳曰澀飲水澀在兩脇下參曰淡飲水在胃中肆曰逆飲水逆在膈上五藏間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫伍飲者皆由飲後傷寒飲冷水過多所致方

遠志去心 苦參 藜蘆 白木 烏賊骨

甘遂 大黃 石膏 半夏洗 紫菀

桔梗 前胡 芒消 枳實 五味子

茯苓 貝母 桂心 芫花熬 當歸

人參 茯苓 芍藥 大戟 葶藶熬

黃芩酒洗 附子炮去 常山 厚朴炙 細辛

署預 甘草炙 巴豆心 厚朴炙

右參拾參味搗篩爲末鍊蜜和圓如梧桐子大酒服壹圓日參稍加之

前胡湯 主胃中久寒澀實宿痰滿塞胃氣不通利二焦冷熱不調飲食減少無味或寒熱體重困不欲起方

前胡 人參 大黃 當歸

甘草炙 黃芩 防風 麥門冬去心

吳茱萸酒洗 半夏洗 生薑切 杏仁去皮

右壹拾貳味以咀以水壹斗煮取參升分參服日參

白朮散 主胃中結澀飲澀結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

白朮 茯苓 橘皮 當歸各參

附子炮去 半夏洗 生薑切 桂心各參

右捌味以咀以水壹斗貳升煮取參升分爲參服日參服

參劑佳藥師方有細辛

薑汁 主胃中積聚痰飲飲食減少胃氣不足欬逆嘔吐方

生薑汁 橘皮參兩 半夏洗 橘皮貳兩

茯苓 桔梗 桂心 附子炮去 甘草炙

右玖味以咀以水柒升煮取貳升伍合去滓內薑汁煎取

貳斗分參服兩劑佳若欲服大散諸五石圓必先服此

方乃進黃耆圓輩必佳

半夏湯 主淡飲澀氣去酸方

半夏洗 生薑切 附子壹兩 吳茱萸參兩

右肆味以咀以水伍升煮取壹升伍合分參服日參老小

服半合

生薑湯 主淡澀氣方

生薑切 附子壹兩 吳茱萸參兩

右貳味以水捌升煮取貳升分肆服日貳亦主卒風大良

論曰凡淡飲盛吐水無時飲其源爲冷食過度遂令相冷理

胃氣羸不能消於食飲食入胃皆變成冷水反吐不停者
赤石脂散 主之方

赤石脂 參斤

右壹味搗篩為散服方寸匕日叁酒飲並可下之稍稍漸
加至叁匕服盡參斤則終身不吐水又不下利補五藏令
肥健有人淡飲服諸藥不瘥惟服此壹斤即愈

瘕積第五

大五明復 主堅癖或在人胃或在心腹方

狼毒

乾地黃

杏仁

桂心

巴豆

乾薑

五味子

蜀椒

芫花

莽草

細辛

附子

漆頭

人參

當歸

半夏

厚朴

木防已

茯苓

當歸

右貳拾壹味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大以飲服貳圓
日貳夜壹以知為度

小兒驚風 主病與前方同

狼毒

附子

半夏

白附子

漆頭

茯苓

人參

當歸

右陸味搗為末鍊蜜和更梓伍千枚圓如梧子飲服叁圓
日貳稍加至拾圓

主積聚瘕瘕不能食方

礬石

雄黃

人參

杜衡

桂心

前胡

乾薑

大黃

乾薑

白芷

丹參

半夏

附子

巴豆

烏頭

右壹拾伍味搗篩為末鍊蜜和圓如小豆貳貳圓日貳可
至肆圓

治瘕癖乃至鼓脹方

取烏牛屎壹升微火煎如稠糖空腹服大棗詩壹枚當鳴
轉病出隔日更服忌口味

又方 人尿叁升煎取壹升空腹服如牛尿法

主暴癰堅結方

木防已

白木

鬼臼

芎藭

當歸

大黃

蜈蚣

蛇蟻

甘草

右壹拾壹味以水柒升煮取貳升去滓下芒消分爲
叁服日叁

治卒暴癰方

蒜

桂心

伏龍肝

大

右叁味合搗以淳苦酒和之如泥塗著布上掩病處叁日
消無驗亦得用也

又方

取商陸根搗蒸之以新布藉腹上以藥鋪布上以衣覆上
冷即易取差山數日之中晨夕勿息為之妙

主癰瘕方

三稜草

切取

右壹味以水伍石煮取壹石去滓更煎取叁斗於銅器中
重釜煎如稠糖出內密器中日以酒壹蓋服壹日貳服
每服常令酒氣相續

療十年瘕癖方

桃仁

去皮

蜀椒

法目

乾薑

右肆味先搗桃仁如膏合搗千枚如乾可入少蜜和搗令
可圓如酸棗大空腹酒服三圓日叁仍用發法○取新金
壹口受壹斗者鑽底上作叁拾餘孔孔上布椒叁合藏上

布鹽鹽上安紙兩重上布冷灰壹升冷灰上安紙灰壹升
熱灰上安紙灰火如雞子太常令盆大口熱底安薄鹽其
口以板蓋上以手捉勿令落仰卧安盆於腹上逐病上及
痛處自按連移樹之冷氣及積結皆從下部中作氣出矣
日壹易極滿三七日百病皆瘥乃止
江寧衍法師破癖方

白水 枳實炙 柴胡略炙

右參味咬咀以水伍升煮取貳升分叁服日叁可至叁拾
劑求瘥

三台圓 主胃中心下結堅食飲不消方

大黃壹兩 枳實貳兩 甘草貳兩 甘遂壹兩 黃連陸兩

右伍味咬咀以水伍升煮取貳升伍合分叁服

三台圓 主五藏寒熱積聚腹脹腸鳴而噎食不作肌膚甚
喘逆若傷寒瘧已愈今不復發食後腹脹圓飲多者吞拾圓
長服令人大小便調和長肌肉方

大黃壹兩 熟消石 葶藶陸兩 茯苓半兩 厚朴炙

前胡 附子炮去半夏洗 細辛兩 杏仁壹兩 桑白皮

右壹拾味搗篩為末別搗杏仁如脂次內藥末鍊蜜相和
令得所更持伍千杵圓如梧子大酒服伍圓稍加以芫花度

大黃湯 主虛羸胃滿方

桂心壹斤 半夏肆升 黃耆肆兩 生薑壹兩 芍藥

右肆味咬咀以水壹斗肆升煮取伍升分伍服日三夜貳

寒冷第六 方九首

鹿骨 鹿具 茯苓壹兩 防風 橘皮 芍藥

人參 當歸 龍骨 黃耆 附子 桂心

千金翼方 卷十九 雜病中

厚朴炙 乾薑 獨活 甘草炙

右壹拾肆味咬咀以水叁斗先煮骨取壹斗澄取清內藥
煮取叁升伍合分肆服日再

大桂枝湯 主氣逆又胃寒熱往來吸吸短氣惡聞人聲諸煩
酸夜逆不能飲食飲食不生肌肉弱黃瘦急絞痛氣上衝
發數胃管有熱雷鳴相逐寒冷厥逆傷損五藏諸言難喜直
視大便難方

桂心陸兩 當歸 細辛 黃芩兩 人參伍兩

厚朴炙 枳實炙 芍藥 芫藶兩 黃耆肆兩

麥門冬法吳茱萸 半夏壹兩 蜜伍合 附子壹兩 炮

生薑貳斤 五味子 飴糖半 甘草陸兩

右壹拾玖味咬咀搗生薑取汁叁升以水貳斗煮藥取陸
升去滓微火上煎內薑汁蜜飴糖相得煮取陸升壹服壹
升日一

大半夏湯 主胃中虛冷滿塞下氣方

半夏壹升 生薑貳兩 桂心伍兩 蜀椒參兩 口法

茯苓 枳實貳兩 大棗壹兩 附子壹兩 炮

當歸 人參 厚朴炙 甘草壹兩

右壹拾貳味咬咀以水壹斗煮取叁升分叁服
朱夏湯 主風冷氣腹中虛冷急痛飲食不消心滿少腹裏急
引痛手足逆冷胃中鬱鬱乾嘔欲吐逆短氣方

吳茱萸壹升 小麥 半夏壹兩 生薑貳兩 大棗壹兩 口法

桂心三兩 人參 黃耆 甘草貳兩

右玖味咬咀以水壹斗貳升煮取肆升分為肆服壹服壹
升日再

朱夏湯 主男子虛羸寒冷婦人寒勞氣逆及胃腹滿而

當歸

言窮

五味子

桂心

各藥

右壹拾叁味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大空腹酒服伍圓日貳以知為度

崔氏百病圓主百病消殺五勞七傷平胃氣令人能食小兒亦患冷者減大黃倍乾薑小便利者生用葶藶方

芎藭

大黃

葶藶

小葶

芍藥

當歸

桂心

乾薑

茯苓

麥門冬

芎藭

細辛

甘草

附子

各藥

右壹拾叁味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大空腹以酒服伍圓日再服七味

主十年嘔手足煩羸瘦面黃食不生肌膚傷飽食不消化方

人參

丹參

沙參

苦參

玄參

防風

蜀椒

各藥

附子

乾薑

葶藶

大黃

葶藶

巴豆

各藥

右壹拾叁味搗篩為末鍊蜜和圓如小豆大空腹服圓日叁服蒸大黃於伍升米下及熟切之日發乾

主數年不能飲食方

小麥蘖

七月七日

乾薑

烏梅

略四

右肆味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大空腹酒服拾九日再稍加至叁拾圓其寒在胃中及反胃者心皆瘳

主三焦上中下焦

合為三部

三焦道閉塞不通

留水在膈上不消化

名曰淡水積年不去

雖服藥下之不能

便去雖得小去隨復如故其病面目黃黑手足逆冷身體枯

燥肌膚甲錯身無潤澤吸吸氣喘或已嘔吐或大便秘或復重下起止甚難久或絞痛雷鳴時下利者悉主之方

茯苓

各藥

白朮

各藥

結梗

略伍

前胡 乾地黃 神麴 乾薑 桂心 各藥

右壹拾肆味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子食後飲服拾圓日再

大桂枝圓

主叁焦受寒

寒在中焦

即滿噎氣吞酸

或咽中不

下中冷胃不可下食

時復瀉不食

溫溫如醉方

桂心

附子

各藥

當歸

蜀椒

各藥

人參 乾薑 前胡 各藥 特生礬石 各藥

右玖味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大空腹飲服拾圓日

醋飲食不消方

桂心

乾薑

蜀椒

烏頭

附子

各藥

前胡

芍藥

白朮

防葵

吳茱萸

各藥

右壹拾味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子酒飲任性服叁圓日叁

大黃甘草圓

主久寒胃脇支滿

憂思傷損

奔氣膈氣

腸中虛

冷呼吸短氣不得飲食

淡氣腫聚

輒轉上下

眩冒厥絕

顏色

恍惚

夢寐不定

大黃 甘草 附子 乾薑 桂心 桔梗 略氣 白欬

防風

署預

石斛

芍藥

乾薑

各藥

紫苑 黃芩 蜀椒 附子 白朮 當歸

人參 茯苓 乾地黃 山茱萸 麥門冬 略氣

圓日參補加至參拾圓

右胃中寒溫不和心下死絕痛不可飲食氣滿嘔
吸乾噎吞酸胃背中冷兩脇急痛腹中有冷水抑抑作聲統
膈痛頭眩滿悶身體羸瘦方

附子炮去人參各兩 芎藭半兩 乾薑半兩 礬石二兩

皂莢炙 半夏洗 桂心 礬石各半兩 吳茱萸

茯苓 黃芩各三 當歸 細辛 蜀椒口許

芍藥各半兩 麥門冬法甘草 酸各半兩

右言拾捌味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子未食酒服貳圓
日三

人參主百病三蟲疝瘕成魚鱉蝦蟇令人面目枯無潤澤

精寒心腹方

人參 龍膽

杏仁去皮尖 與礬石各

曾青各分 黃石脂各兩

右陸味搗篩為末錫和為圓如梧子飲服貳圓日三亦可
作散服一乃主服藥一日白蟲下十日長蟲下有蟲皆相
隨下耐藥者二十日乃下

主胃中冷不能食或食已不消方

乾薑拾兩 赤石脂兩

右貳味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子服拾圓日三稍加至

參拾圓服不限食前食後

主消穀下氣神驗方

白朮 厚朴炙 人參 茯苓

吳茱萸 陳麴 麥蘖 芎藭各

右捌味搗篩為散食後酒服方寸匕日三

治虛勞飲食不消勞倦噎氣脹滿羸瘵不解人參散方

人參 茯苓

陳麴 厚朴炙

麥蘖 白朮

吳茱萸各 檳榔各

右捌味搗篩為散食後酒服方寸匕日貳服

主脾氣僻弱不下食服此以當食方

大麻子各半兩 大星黃各

右貳味和酒服方寸匕日四五任性多少

主不食心意冥然不憶食方

乾薑 乾乾 神麴 蜀椒口許 大麥蘖

右伍味各言升搗篩為散食後酒服方寸匕日三以食為度

論曰凡人食生冷雜物或寒時衣薄當風食不消化或夜食

冷則心腹脹滿煩急或連日不差若燒地令熱以席布上厚

覆取汗便愈其地沃水去大熱又坐卧於上一月日求差凡

食過飽煩悶但欲卧腹脹熱未令香酒服一方寸匕日五

六服大麥蘖益佳

雜療第八 方法一百二十首

鐵屑炒使極熱投酒中飲之療賊風瘰癧又裏以耐服療胡臭

有驗

石灰瘰癧止血大效若五月五日採紫葳為葉鹿脂草

葉為藥地黃葳葳耳青蒿葉人搗石末為團如雞卵暴乾不

以瘰癧生肌大神驗

桑新灰瘰癧子脫糞用葵小豆下水腫

青蒿灰燒蒿作之於灰燒木藥作之並堪蝕惡肉瘰癧主摩

乾濕癬極有效

芫荽葉搗傳腫服汁使一腫毒內消又下子死腹中主產

後血脹悶諸毒腫丹油等腫取汁如豆滴耳中主聾耳中鳴

蛇毒傳之良

柳木枝及木中蟲屑枝皮生煖熱淋可爲吐湯煮洗風腫痒

羊肝藥所風毒。目赤暗無所見生子肝七枚神效療頭風。

運悶欲絕者生飲宣升即活。牛鼻中木卷療小兒癰。草卷燒之爲膏。主小兒鼻下癰。耳中垢主蛇傷惡或毒瘡中毛主小兒久不行。白牛懸蹄主婦人崩中。漏下赤白。尿主霍亂。屎中豆主小兒癰。婦人產難。特牛莖主婦人漏下赤白。無子。烏牛膽主明目及甘濕以釀槐子服之。腦主消渴風眩。齒主小兒驚癇。尿主消渴黃疸水腫脚氣小便不通。馬毛主小兒驚癇。白馬眼主小兒脫母帶之尿中粟主金瘡。小兒客忤寒熱不能食。絳繩主小兒癰並煮洗之。狗骨灰主下痢生肌。傳馬癢。烏狗血主產難橫生血上搶心。下頷骨主小兒諸癰。陰卵主婦人十二疾爲交服之。毛主產難。白狗屎主丁癰水絞汁服。主諸毒不可入口者。鹿頭主消渴筋主勞損續絕。骨主虛勞可爲酒主風補虛。髓脂主癰腫死肌。溫中四散不隨風。頭通腰理角主貓鬼中惡。心腹疼痛。血主狂犬傷。草主打傷。陰痿補虛。上癰痛。主留血氣鼠癢心腹痛。

虎屎主惡瘡。眼睛主癰。尿中骨爲膏主火瘡。牙主丈夫陰瘡。及疽癰。草主癰疾。小兒驚癇。

狸屎灰主寒熱鬼瘻發無期度者。極驗。家狸亦好。一名貓也。兔皮毛合燒爲灰酒服。主產難後衣不出。及餘血搶心欲死。若頭皮主鬼疰毒氣在皮中。如針刺者。又主鼠癢。膏主耳聾。駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善。

猪耳中垢主蛇傷。猪腦主風眩腦鳴及凍瘡。血主奔豚暴氣。中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病。乳頭亦同發汗。十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋亥地百日主難產。脂脂一升著雞子拾肆枚更良。

獺四足皮主手足腫瘰。

狐肉及腸作腫食之主疥瘡久不差者。腸主生疥。燒灰和水灌之。

白雞距及腦主產難。燒灰酒服之。腦主小兒驚癇。鵝毛主小兒驚癇。極者又燒灰主噎。

鴨肪主水腫。血主解諸毒肉主小兒驚癇。頭主水腫通利小便。喉下白毛療小兒癰有效。

鷹屎灰酒服方寸匕。主惡酒勿使飲人知。

雀屎必蜜和爲圓飲服。主癰癰久痼冷病。或和少乾薑服之。大肥悅人。

胡鷲卵主水浮腫。肉出痔蟲。越鷲屎亦療痔。殺蟲去目。鷲蟬屎灰酒服方寸匕。主子死腹中。腦主女子面皯服之。令人不忘也。

龜取以釀酒主大風緩急。四肢拘攣。或久癰緩不收攝。皆差。鯉魚骨主陰蝕。便不出。血主小兒丹腫及瘰。皮主丹瘰。瘰。腦主諸癰。腸主小兒肌瘡。

蠱魚腸及肝主久敗瘡中蟲。諸魚灰並主哽噎。

乾鰾頭主消渴。食不消去。冷氣除瘡疹。其穿魚鱗主竹木屑入目不出。穿鮑魚鱗亦主。目去刺。煮汁洗之。

露蜂房亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕。日貳。主諸惡疽。附骨癰。根在藏。臍臍節腫出。丁腫惡脉。諸毒皆差。又水黃露蜂房一服五合。汁下乳石熱毒。癰。服之。小便中即下石末大效。水黃洗狐刺療服之。瘡上氣赤白痢尿失禁。

蟬殼主小兒癰。女人生子不出。灰服之。主久痢。

蚱蟬主小兒癰。絕不能言。

白殭蚕末之封丁腫。根當自出。極效。

鼈頭燒灰主小兒諸疾。又主產後陰脫下。膝戶。瘰。腹痛。

鯢魚膏療耳中痛者

蛇蟻主明目療青盲

蛇蟻主明目療青盲取之皮交療一腫惡瘡骨疽蛇皮主

身痒癢疥等

止嘔逆

蛇蟻鹽湯為汁療耳聾尿封狂犬傷毒出犬毛神效

蛇蟻為圓塞下部引痔蟲出盡永差

蛇蟻陳久者療反胃及失精

田中螺殼療口疰心腹痛又主失精水清飲汁止渴

麥葉拊熱癰瘡良

鷄主熱渴散血生肌久服令人心懽

栗噉生者塗瘡上療筋骨斷碎癰腫瘰癧其皮名扶搏為

散蜜和塗肉令急縮毛殺療火丹毒腫飼孩兒令齒不生太

白皮水煮汁主瘰癧

櫻桃葉拊付蛇毒絞取汁服防蛇毒內咬

梅根療風痺出土者殺人梅實利肝腎去脾

枇杷葉主欬逆不下食

火柿主殺毒療金瘡火瘡主肉止痛敷柿熟柿解酒熱毒止

口乾唇胃間熱

烏芋一名茨菰主百毒產後血悶攻心欲死產難衣不出搗

汁服一升

桃膠主下石淋破血中惡症性花主下惡氣消腫利大小腸

梨削貼湯火瘡不爛止痛易差又主熱嗽止渴葉主霍亂吐

痢不止煮汁服之

赤苣生赤痢又主射工沙蟲馬覓一名馬齒草主諸腫瘰癧

目擣指之飲汁主反胃諸淋金瘡血流皮血癰瘰小兒尤良

用汁洗腎面皯馬汗射工毒塗之差

蔓菁子療黃疸利小便水裏五升取濃汁服主癰瘰積聚少

飲汁主霍亂心腹脹末服主目暗

白芥子

射工及疰氣發無常厥九服之或搗為末醋和塗

之隨手有驗

首指莖葉平根寒主熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣取汁

服一升令吐利即愈

水蓼主破蛇傷擣傳之絞取汁服止蛇毒入腹心悶者又水

蓼漬腳持之消脚氣腫

胡施主諸惡或狐尿刺毒山溪中沙蟲射工等毒煮汁浸或

搗付大效

白藺荷根主諸惡瘡殺毒根心三指麥芒入目中不出者

以汁注目中即出

雞蘇主吐血衄血下氣消穀大效

苦瓠瓢主水腫石淋吐呀嗽囊結疰蟲瘕飲或服之過分令

人吐利不止宜以黍穰灰汁解之又煮汁漬陰療小便不通

胡麻生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡大效

小豆葉名藿止小便數去煩熱

大麥麴平胃止渴消食療脹

小麥麴止痢平胃主小兒癰消食痔又有女麴黃蒸女麴完

小麥為之一名麴子黃蒸磨小麥為之一名黃衣並消食止

洩痢下胎破冷血

粟米泔汁主霍亂卒熱心煩渴飲數升立差臭泔止消渴良

朱麥炒主寒中除熱渴解煩消石氣蒸朱麥熟磨作之一名

白英鬼目草也。蔓生葉似王瓜。小長而五。經黃白老龍葵子。生青熟黑。煮汁飲解勞。地黃子。將絞取汁。主赤白痢洗眼。去熱脂。雀盲濕痛。其虫反主痢亦善。

防風。又頭者令人發狂。又尾者發癰。疾子似胡荽子而大。調食用之。香而療風更佳。

石龍芻。主療蛇蟲及不消食。

絡石。生陰濕處。蔓延繞木石側。冬夏常青。十一月子黑而圓。名石龍藤。療產後血結。又主蝮蛇瘡。絞汁洗之。服汁亦去蛇毒。心悶。金瘡封之立差。

千歲華。莖大如椀。汁味甘。子味甘。酸似葡萄。其莖主噦逆大。善傷寒後嘔噦更良。

天名精。鹿活草也。主破血生肌。止渴利小便。殺三蟲。除諸毒。丁癰癰痔。金瘡內射身痒。癰腫不止者。指之立已。

葛根。未主狂犬傷人。并飲其汁。燒葛燒灰。水服方寸匕。止癰。苦參。十月採子。服如槐子法。又服輕身不老。明目有效。

蒼耳。三月以後七月以前。刈取日乾。為散。夏月水服。冬酒服。主大風癰癩。頭風濕痺。毒在骨髓。日貳服。圓服貳分。拾圓散。服壹貳。服滿百日。病當出如癰。疥或痒。汁出或斑。較甲錯。皮起後。乃皮落。肌如凝脂。令人省膳。除諸毒。殺甘。濕。又服益氣耳。目聰明。輕身強志。主腰膝中風。毒尤良。亦主癰。狗毒。管范。主衄血吐血。灸瘡。

王藤。主金瘡。破血生肌。肉止痛。赤白痢。補虛益氣。除脚氣。爵牀。療血脹下氣。又主枝瘡。汁塗立瘥。

蜀羊泉。俗名漆姑。葉主小兒驚。

惡實。根主牙齒痛。勞瘵。脚氣。風毒。癰疽。狀如傷肺。肺癰。疔瘰。積血。又主諸風。癰疽。冷瘡。子吞膏。拔出癰疽頭。

榆人醬。利大小便。無美醬殺三蟲。

凡山中石上草。中多有蛭。食人血入肉中。浸淫起方。用炙斷其道即差。

又方

常以臘月猪脂和鹽。塗脚及足指間。足跌上并難上。則不著人。

用術法

黃生。蜀中者。長。主。諸。中國人云。療。病。一箇。一。價。買。之。不。可。得。後。人。知。是。黃。更。不。敢。將。入。來。凡。黃。不。得。賣。之。損。藥。療。一。切。腫。初。覺。刺。取。末。和。水。塗。之。數。度。差。難。產。刮。取。一。箇。作。末。和。水。服。之。即。生。酒。亦。得。產。後。腹。中。不。淨。刮。取。末。水。和。服。之。愈。

馬胞。轉。割。取。末。筒。吹。半。大。豆。耳。鼻。中。即。通。此。藥。未。滿。月。孕。婦。勿。令。見。好。落。娠。慎。之。

貯黃法

以袋盛。置白米。大小麥中。袋中著少許米。懸乾。燥。勿。令。雞。犬。人。見。之。

雞犬人見之

造慶鹿二角膠法

二月九月為上時。取新角連事骨者。細到大盆中。浸一宿。即淘汰。使極淨。待澄去下惡濁汁。取上清水。還浸一宿。又淘汰。如前澄去下惡濁。取汁浸三宿。澄取清水。并所漬骨角微微火。煮大率角屑一石。水三石。去角澄取清汁。煎水盡至五升許。出貯銅器中。湯上煎之。二日三夜。如糖出。置盤上。待凝。以竹刀割為薄片。於淨布上暴乾成也。其黃角者。更細判之。加水一倍。煮成至三四升。內銅器中。重湯煎。如前法。服法。

炙膠使極黃沸騰篩為散每膠一斤末以大附子二兩炮
又一法取惟大者去皮細切炙令黃勝炮日空腹酒服方
寸已日再稍加至二匕不可過二匕補五藏六腑虛藏
瘦極便者為上

殺烏頭三建法

烏頭二月揀天雄附子側子並八月揀秦皇早秋玉環採
得淨去鬚毛其莖留二分先以大木桶內貯酒三斛酒糟
七升鹽之經三日後用次法一如次黃連至法畢

右以粟米一升淨洗搗作粉以烏頭安桶中厚三寸布令
平即按米粉令遍復加烏頭如前法又加米粉如次黃連
至滿桶去口三十斤止然後取糟汁去桶中一畔下又次

烏頭二寸以物蓋之九月即八九日若十月即經十日候
桶中汁上頭衣作紫色遍即出烏頭以刀刮截裏許白

黃脉斷即乾但看衣紫色即乾不須發疑即取白茅暴一
日得黃即得不得太乾於藏屋底乾地上布茅厚五寸漚

出烏頭今乾以布茅上勿令相重其上布茅厚五寸四
邊閉塞以茅令密經再宿三日從一邊却茅看之若衣勻

斑斑然即好若著白斑又更覆一宿以衣足為限即徐徐
去上茅更經一宿安徐取於藏下薄上布勿令相重經二

十一日後拾出日中暴之三日即成也

又法

烏頭四月 天雄 附子 側子八月

右先煎水作生熟湯治附子如前方法內著湯中密封勿
洩經半日出取自灰裏數易灰便乾日暴之其米粥及糟

麴等法並不及此法

服鹽藥法 煎藥之大法

成州鹽官第一

次綿州封井

次鹽州富因井

次益州貴平井

上四井鹽可服之

右法服先以大豆許鹽置口中勿咽之須更津液滿只令
近齒以方寸匕鹽內口中和津液一時咽之日一服

凡瘡新患者一服得快利即愈百日以上者五服差若一月
服之終身不發

諸下痢初患一兩服即差赤白久痢經年者一七二七服差

諸心腹痛癥結宿澼積聚吐逆食不化者一年以上三十
年不過三月服之其痢及諸病初服時痢益極者勿怪之也

諸氣滿喘逆不能食者一服即散日服之則根本皆除天氣
熱疾頭痛目眩四肢煩熱者一服得吐利差

諸頭面皮膚首節皆風一月服之差若初服十日內冒闇益
悶勿怪

諸淡飲數逆不能食息者一服差

諸虛勞傷損骨節疼痛起止失聲者二七日服之少氣乏力
面無顏色十日服之能三十日服佳也常以平旦空腹服之

率以三匕為節須得吐利者須一度多服三匕以上令人大
吐利終不傷人若覺煩熱數飲冷水若至他方異域不伏

水土到即服之得一升百事不懼鹽能補虛去冷熱若有宿
食不消變成霍亂一服即差

千金翼方卷第二十

雜病下

備急第一方二十七首 論一首

阿魏藥主一切尸疰惡氣瘰癧人有親近死屍惡氣入腹終身不愈遂至死亡醫所不療亦主一切疰神效方

阿魏藥如麻子大

右壹味以饒飽麝半兩熟煮吞之日三服之服滿二七日永差忌五辛油麝生冷酢滑以酒服之即差

主萬病皆用之

雄黃貳兩

八角附子貳兩炮

藜蘆貳兩

丹砂貳兩

礬石貳兩 巴豆仁貳兩

右陸味以王相日童子齋戒天晴明時合先持巴豆三千

杵次內礬石又三千杵次內藜蘆又三千杵次內雄黃又

三千杵次內丹砂又三千杵次內附子又三千杵次內白

蜜又三千杵訖更治萬杵佳無丹砂用真朱肆兩代之每

內藥即下少蜜恐藥飛揚盛蜜器中封之勿洩氣安清淨

處大人圓如小豆許服藥下病者宿勿食旦服一圓不知

者緩病飲發之在臍上者吐臍下者利或但噎氣而已即

愈一切萬病量之不過壹圓一圓莫不悉愈必以王相天

晴明日合之大有神驗若非此日合之極不中用從事章

主萬病方

礬石燒

皂莢皮去

雄黃研

藜蘆蒸

右肆味等分為散主交鬼打鬼掛鬼刺心腹痛吐下血便死不知人及臥驚驚脚腫不覺者諸惡毒氣瘰癧取藥如大二內竹管中吹鼻得嚏則氣通便活未嚏更吹之以嚏為度

主暴病脹滿方

大黃

乾薑

巴豆三枚

右叁味等分先擣大黃乾薑下篩研巴豆如脂內散中合擣一千杵即用之蜜和為圓亦佳蜜器中勿令歇主心腹暴病若中惡客忤心腹脹滿刺痛口噤氣急停屍卒死者以水若酒服大豆許三四枚捧頭起令得下喉須更不差更服三枚腹中轉鳴得吐利即差

主百鬼病風注毒與神交通邪病腹脹腹腫氣辛中忤方

礬石貳兩

附子貳兩炮

雄黃貳兩

真朱貳兩

巴豆仁貳兩

藜蘆貳兩

蜈蚣貳枚

麝香半兩

犀角半兩

參分

右玖味擣參千杵每一服二圓如小豆不知至叁圓五更

一點服至日中解解乃食白米粥忌熱食酒肉五辛一切

皆忌之

主諸風鬼注毒氣瘰癧所著方

真珠

雄黃

丹砂各半

乾薑壹兩

蜈蚣壹枚

桂心壹兩

天雄半兩

莽草半兩

細辛壹兩

蜀椒目閉口青

右壹拾味為散酒服方寸匕日再

主一切發尸鬼注風痺百劇痛如針刀刺痛嘔逆

避飲安七傷萬病方

附子壹分

烏頭壹分

蜈蚣壹枚

芫青八分

雄黃壹分

朱砂壹分

乾薑壹分

細辛壹分

蜥蜴壹枚

人參壹分

莽草壹分

鬼臼壹分

右壹拾貳味擣散酒服半錢匕日再

主諸惡瘰癧聚心下脹滿寒熱鬼疰長病

效逆唾噎辟除衆惡殺鬼逐邪氣思擊客忤中惡者中結氣

咽中閉塞有進有退繞臍絞痛側側隨上下按之挑手心

溫溫如有蟲狀毒疔相染滅門方

雄黃壹兩 羌青五枚 桂心壹兩 真珠壹兩 麝香壹兩

附子壹兩 烏頭壹兩 犀角壹兩 鬼臼壹兩 巴豆仁壹分

蜈蚣壹兩 人參壹兩 杏仁壹兩 射干壹兩

丹砂壹兩 蜈蚣壹兩 斑蝥壹兩 當歸壹兩 蘇合壹兩

大黃壹兩 犀角壹兩 犀角壹兩 犀角壹兩 犀角壹兩

右貳拾味味 搗末末 蜜丸丸 圓如小豆小豆 先食服二

圓日再服不知稍稍加以藥二圓著門上令衆惡不近傷

寒服之無不即愈若至病家及視病人夜行獨宿服二圓

衆邪不近亦可佩之

湯圓主癰堅水腫蟄尸通尸寒尸喪尸尸注骨血相注惡

氣鬼忤蛇毒邪氣往來夢寤存亡流飲結積虎狼所噬癰大

所咬鴆毒入人五藏服藥殺其毒即消婦人邪鬼忤之亦能

遣之方

蜥蜴壹兩 蜈蚣壹兩 地膽壹兩 杏仁壹兩

蠅蝦壹兩 虎骨壹兩 甘草壹兩 桃奴壹兩 犀角壹兩

巴豆仁壹兩 鬼督郵壹兩 赤桑壹兩 乾薑壹兩 款冬花壹分

甘遂五分

右貳拾味味 治巴豆杏仁如膏內藥末研調下審搗二萬杵

圓如麻子未食服三圓日壹不下加之不取吐下有壹圓

日壹有人風冷注癰堅二十年亦得愈

金牙散主鬼注風邪鬼語刀注或在腰脊背脇流無常處不

喜見人意志不定面目脫色目赤鼻張骨乾甲黃等並治之

方

蜈蚣壹兩 人參壹兩 雄黃壹分 徐長卿壹分

金牙散主南方瘴氣疫毒脚弱風邪鬼注方

金牙壹分 野葛壹分 附子壹分 毒公壹分 苦參壹分

石長生壹分 椒目壹分 大黃壹分 甘草壹分 羌青壹分

鬼督郵壹分 蜂房壹分 曾青壹分 真珠壹分 蛇脫皮壹分

丹砂壹分 烏頭壹分 狼毒壹分 斑蝥壹分 石膏壹分

蘭茹壹分 無美壹分 鬼前壹分 藜蘆壹分 狸骨壹分

雷丸壹分 狼牙壹分 乾漆壹分 亭長壹分 貝母壹分

凝水石壹分 牛黃壹分 胡鷲壹分 龜甲壹分 滑石壹分

右肆拾伍味味 爲散酒服二刀圭日再稍加如有蟲皆隨大

小便出矣

大金丹主南方百毒瘴氣疫毒脚弱腫痛濕痺風邪鬼症

金牙壹分 雄黃壹分 丹砂壹分 龍膽壹分 防風壹分

王支壹分 大黃壹分 曾青壹分 茯苓壹分 桂心壹分

松脂壹分 乾薑壹分 烏頭壹分 斑蝥壹分 商陸壹分

細辛壹分 消石壹分 野葛壹分 大戟壹分 附子壹分

蛇脫壹分 芫青壹分 鸛骨壹分 芫花壹分 蜀椒壹分

寒水石壹分 人參壹分 貫衆壹分 龍骨壹分 蜀椒壹分

露蜂房壹分 巴豆壹分 法皮壹分 蜈蚣壹分 礞石壹分

天雄壹分 狸骨壹分 石膽壹分 莽草壹分

右參拾玖味味 各等分爲散以絳囊佩帶之男左女右未食

以漿水或酒隨意服一丸以知爲度

金牙散主南方瘴氣疫毒脚弱風邪鬼注方

金牙壹分 女萎壹分 莽草壹分 乾薑壹分 桂心壹分

天雄壹分 細辛壹分 草解壹分 犀角壹分 烏頭壹分

麝香壹分 虎骨壹分 黃芩壹分 雄黃壹分 朱砂壹分

蜀椒壹分 附子壹分 黃連壹分 牛黃壹分 蜈蚣壹分

右壹拾玖味為散。內生黃芩者。更博三千杵。溫酒服壹錢。七日三夜。以知為度。帶之辟不祥。弔喪問親。臭鼻良。一云。用。良。一云。用。良。一云。用。

又大方廣方。主與前方同。傳屍骨蒸病家。主。

金牙。兩。大黃。壹兩。龍甲。壹兩。蛇子。仁。壹兩。鬼督郵。壹兩。

桂心。半兩。芍藥。半兩。射干。半兩。升麻。半兩。徐長卿。半兩。

為尾。半兩。由跋。半兩。蜂房。半兩。細辛。半兩。乾薑。半兩。

芒消。半兩。莽草。半兩。龍膽。狼牙。雄黃。

真珠。半兩。白木。半兩。射罔。壹分。羚羊角。半兩。骨。

馬目毒公。半兩。犀角。半兩。甘草。半兩。狼毒。半兩。

蛇蛻。半兩。地膽。半兩。檮雞。半兩。芫青。半兩。雷丸。半兩。

龍牙。壹兩。杏仁。壹兩。半兩。巴豆。壹兩。胡。去。

桃奴。拾。鐵精。壹合。赤小豆。壹合。烏梅。壹合。胡。壹兩。

雞骨。兩。石骨。兩。蛇脫。壹兩。斑蝥。壹分。法。子。壹兩。

右伍拾味。為散。酒服壹刀圭。加至兩刀圭。日三夜。以知為度。終。帶之。男左女右。一方寸。匕。省。病。問。夜。行。塗中。晨。露。亦。如。此。密。封。勿。洩。氣。清。齊。七。日。人。之。一。如。

法。童子。沐浴。寂靜。無。人。與。合。勿。令。人。知。之。買。藥。勿。爭。價。

太。主。腹中。癰。瘕。積聚。支滿。寒熱。鬼。疰。長。病。外。逆。吐。

血。殺。鬼。邪。氣。盛。注。背。中。結。氣。咽。中。如。有。物。宿。食。久。寒。方。

雄黃。兩。真珠。兩。丹砂。兩。藜蘆。壹兩。附子。壹兩。半。

斑蝥。兩。杏仁。兩。地膽。壹兩。特生。石。壹兩。

赤足。蜈蚣。兩。巴豆。壹兩。鬼。白。壹兩。特生。石。壹兩。

右壹拾叁味。下。篩。吹。咀。嚥。石。令。如。麥。大。桑。白。皮。如。錢。大。拾。

肆。枚。令。於。鐵。器。中。熬。桑。白。皮。焦。黑。上。擣。二千。杵。內。丹。砂。雄。

黃。諸。藥。公。擣。四。千。杵。白。蜜。和。為。圓。服。如。小。豆。大。終。不。知。病。進。退。遠。臍。相。逐。上。下。不。定。按。之。挑。手。心。中。溫。溫。如。有。熱。者。病。在。皮。中。相。次。即。取。壹。圓。摩。病。上。急。按。手。下。皮。青。不。青。當。白。黑。若。有。赤。病。死。皮。中。也。右。為。蜂。蛇。所。中。中。惡。服。壹。圓。一。圓。壹。圓。中。若。不。知。更。加。至。叁。圓。卒。得。飛。尸。腹。中。切。痛。服。三。圓。壹。圓。塗。之。上。惡。邪。氣。不。敢。近。人。卒。中。鬼。魅。狂。言。妄。語。一。圓。塗。其。脉。上。壹。圓。塗。人。中。即。愈。鬼。魅。逐。人。以。壹。圓。塗。兩。耳。上。鬼。不。敢。前。壹。圓。毒。病。一。宿。勿。食。明。旦。服。一。圓。不。知。增。至。三。圓。至。三。圓。以。知。為。度。癰。結。宿。物。勿。食。服。四。圓。但。飲。藏。酒。服。一。圓。日。三。病。下。如。雞。子。白。或。下。蛇。蟻。下。後。以。肥。肉。精。作。羹。補。之。狐。鳴。以。壹。圓。向。擲。之。狐。即。於。其。處。死。神。秘。不。妄。傳。

酒。解。方。菰。蘆。兩。白。豆。英。兩。巴。豆。仁。兩。桔。使。兩。附。子。兩。右。五。味。末。蜜。和。擣。萬。杵。飲。服。宿。勿。食。旦。服。兩。圓。如。梧。子。仰。臥。勿。眠。至。食。時。若。膈。上。吐。膈。下。利。去。惡。物。如。科。斗。蠶。蟻。子。或。長。壹。尺。貳。尺。下。後。大。虛。作。羹。補。三。四。日。將。養。病。不。盡。更。服。如。初。

主。十。種。注。氣。注。勞。注。鬼。注。冷。注。生。人。注。死。注。尸。注。水。注。食。注。土。注。等。方。

雄黃。壹兩。人參。壹兩。甘草。壹兩。藜蘆。壹兩。巴豆。壹兩。半。桔。使。壹兩。附子。壹兩。白。豆。英。壹兩。蜀。椒。壹兩。麥。門。冬。壹兩。右。壹。拾。味。末。之。蜜。和。空。腹。服。壹。圓。如。小。豆。大。日。貳。稍。加。以。知。為。度。極。效。

主。鬼。注。飛。尸。萬。方。

生麝香半兩 牛黃半兩 蜈蚣一條 丹砂半兩 雄黃壹兩

巴豆仁二枚 杏仁二枚 桂心半兩

地膽半兩 芫青半兩 赤枝半兩 杏仁二枚 蜈蚣一條 雄黃壹兩

大黃半兩 犀角半兩 礞石半兩 細辛半兩 藜蘆半兩

斑蝥半兩 鬼臼半兩 礞石半兩 附子半兩 眞珠半兩

右貳拾參味搗爲末蜜和搗三千杵飲服如小豆壹圓日

二蛇蜂蝎所中以此摩之愈一作蛇蝎

主惡注邪氣往來心痛微背脊或走入皮膚移動不定苦熱四肢煩疼羸乏短氣方

蜈蚣壹兩 牛黃壹分 大黃壹分 丹砂壹分 細辛壹兩

鬼臼壹兩 黃芩半兩 當歸壹兩 桂心壹兩 人參叁分

麝香壹分 附子一兩 乾薑壹兩

右壹拾參味咬咀以水壹斗煮拾壹味取叁升去滓下牛

黃麝香末攪令均分三服

在腹中或奄然而痛方

主通尸飛尸積聚腸下痛連背走無常處或在臍或在

鶴脰骨叁分 雄黃一兩 藜蘆半兩 野葛半兩

莽草壹兩 芒青拾兩 斑蝥拾兩 巴豆肆枚 去

丹砂貳分 牡蠣壹兩 桂心半兩 蜈蚣壹枚

右壹拾參味搗爲末蜜和搗三千杵飲服如小豆壹圓日

中久病若狀肌肉枯盡四肢煩熱咽逆不食傷寒時氣惡注

忤口噤不開心痛方

麝香壹兩 細辛貳兩 大黃壹兩 甘草貳兩 蜀椒壹兩

紫苑壹兩 人參貳兩 乾薑壹兩 茯苓壹兩 附子壹兩

眞珠壹兩 丹砂壹兩 烏頭壹兩 野葛壹兩 牛黃半兩

桂心壹兩 蜈蚣一條 雄黃壹兩 鬼臼壹兩 巴豆肆枚

右貳拾參味搗爲末蜜和飲服如小豆壹圓稍加至肆圓日

貳加瀕肝壹兩太良

大慶田主萬病與前同方

牛黃壹兩 大黃壹兩 雄黃壹兩 細辛壹兩 附子壹兩

眞珠壹兩 甘草壹兩 人參壹兩 射干壹兩 丹砂壹兩

鬼臼壹兩 莽草壹兩 鬼箭貳兩 桂心壹兩 蜀椒壹兩

紫苑貳兩 巴豆仁八枚 乾薑貳兩 野葛壹兩

蛇蝎壹枚 蜈蚣壹枚 地膽拾伍 芫青貳枚 獐雞壹枚

茯苓壹兩 麝香貳兩

右貳拾陸味搗爲末蜜和飲服貳圓如小豆日貳圓先食後

服之

細辛壹分

主風入五藏悶絕常自燥痛或風注入身冷注鬼注

飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或內或外針灸流移無

有常處驚悸腹脹氣滿又心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或

進或退陰下濕癢或大便秘有血小便赤黃房中勞極方

附子貳分 秦光叁分 人參叁分 牡蠣叁分 蜀椒叁分 去

乾薑五分 桂心伍分 茯苓壹兩 桔梗壹兩 防風壹兩

白朮壹兩 當歸壹兩 獨活壹兩 柴胡伍分 黃芩叁分

烏頭半兩 甘草貳兩 麻黃壹兩 羌活叁分 石南半兩

秦草半兩 牛膝半兩 天雄壹兩 杜仲半兩

細辛壹分

右壹拾陸味搗爲散仍別秤之合和也旦以清酒服伍

分以記如行十里勢欲歇更飲酒五合佳

芥子壹兩 通尸飛尸又主暴風毒腫流入四肢頭面諸風方

芥子壹兩

右宜味擗下篩以黃丹貳兩攪之分作兩處踈布袋盛之更蒸使熟以漚稍乾當更迭蒸袋常使熟漚之如此三五度即定

太醫局方 主卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼排及中蠱毒注吐血下血及心腹卒痛腹滿寒熱毒病六七日方

雄黃 貳兩 丹砂 壹兩 桂心 壹分 藜蘆 壹分 附子 壹分 蜀椒 半兩 口者 野葛 壹分 芫花 拾銖 巴豆 仁 壹分

右玖味惟巴豆別治如脂餘下篩以巴豆合和更擗之令至半錢也老小半之病在頭當車輒在臍上吐在臍下利在四肢當汗出此所謂如湯沃雪手下皆驗秘之千金非賢勿傳也

治暴心痛面無色欲死方

以布裹頭如彈子燒令赤置酒中消服之即愈

治主卒忤鬼擊飛尸諸毒忽氣無復覺或已死口噤揚口不開去齒下湯入口活不下者 分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡壹升須臾立蘇方

麻黃 貳兩 桂心 貳兩 甘草 壹兩 杏仁 貳拾枚 右肆味咬咀以水捌升煮取三升分參服

治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕方

雄黃粉以酒服壹刀圭日參血化為水

論曰凡諸大備急丸散等藥合和時日天晴明四時王相日合之又須清齋不得汚穢於清淨處不令一切雜人觸犬六畜及諸不完具人女人等見則藥無靈驗不可具言若不能如法則必不須合之徒棄財力用之與朽木不殊余以武德中合玉臺丸時值天陰其藥成訖後卒不中用終棄之此等

多是上古仙聖惡苦厄人遂造此方以救之皆云買藥不可爭價當知其深意云爾

蠱毒第一 論一首 方七首 灸法一首

論曰亦有以蠱涎合作蠱藥者食飲中與人者惟此一種令人積年乃死

治人中蠱人有行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當使呼喚將去方

凡中蠱之狀令人心腹切痛如物噉或吐血下血不急治食人五藏盡則死驗之法唾至水中沈者是也取敗鼓皮燒作末水服方寸匕須臾自呼蠱主姓名可誘令知則愈矣治人有中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝發熱常方

牡羊皮 伍斤 犀角 壹兩 芍藥 壹兩 黃連 壹兩 梔子 貳枚 薑 何 半兩 牡丹皮 一兩

治蠱毒方 右柒味咬咀以水五升煮取一升半分三服

治蠱毒方 擗木北陰白皮一大握長五寸以水參升煮取一升空腹服之即吐出

又方 燒蠟皮灰以水服方寸匕差

又方

擗木北陰白皮 桃根 蠟皮灰 亂髮灰 生麻子汁

右伍味先以水濃煮擗皮桃根取汁壹升和麻子汁著灰等一方寸匕令病人少食訖服一大升行百步須臾當吐出水中以雞翎撚吐水盆中當有如牛涎積胎及諸蠱形並出即愈

治蠱鬼方

燒臘月死貓兒頭作灰末以井華水服一錢七日立差

大驗

治貓鬼方

相思子一名巴豆燒燼草麻子一名朱砂半兩峭粉一名分

右伍味搗作末以蜜蠟和為圓帶之即不著人先著者酒

服麻子大一枚良

又方

多灸所痛處千壯自然走去甚效

藥毒第三 方一十二首

野葛毒方

雞子一枚打破併吞之須臾吐野葛

又方 黃甘草汁冷飲之

又方 服雞屎汁

解諸藥毒雞腸散方

雞腸草一名分 薺花

升麻一名宜 藍子一名合

甘草一名宜

右捌味搗為散水服方寸匕多飲水為佳若蜂蛇等衆

毒蟲所螫上血出者藥如小豆許於瘡中藥前所中削竹

如釵股長一尺五寸以綿纏繞水沾令濕取藥內瘡中越

瘡深淺令至底止有好血出即休也若服藥有毒水服方

寸匕毒解病愈

野葛毒口噤方

取青竹去兩節注臍上內冷水注中暖即易之立活忌酒

數易水

一切諸毒方

甘草一名 梁米粉一名 蜜半兩

右壹味以水伍升煮取貳升內粉一合更煎又內蜜半兩

服七合須臾更服之

釣吻衆毒因欲死而青口噤逆冷身痺方

薺花八兩

右壹味以水陸升煮取叁升冷如人肌服伍合日叁服夜

伍服

又方 黃桂汁飲之

又方 煮薺汁飲之

凡六畜五藏若草自動搖得諸醋鹽不變色及墮地不汗又

與犬不食者皆有有毒殺人

凡食飲有毒者遠地地墳起者殺人

凡肉汁在器中蓋密氣不洩者皆殺人

凡脯肉熟肉皆不用深藏密不洩氣殺人

若中此毒者皆大葉灰水服方寸匕良

治惡毒藥方

狗舌草一名肥去

右壹味以水伍升銅器中煮取汁搜麩作粥食之

藥毒不止解煩方

甘草一名 梁米粉一名 蜜半兩

右叁味以水叁升煮甘草取貳升去滓飲大熱內粉湯中

攪令調內白蜜煎令熟如薄粥適寒溫飲壹升

從高墮下第四 方一十一首

又方 主男子絕傷或從高墮下傷損五藏微者唾血者

吐血及全瘡傷經內絕者方

阿膠一名 艾葉一名 芍藥

當歸一名 乾薑

右捌味以水伍升煮取貳升內粉一合更煎又內蜜半兩

羸人三服此湯正主婦人產後及崩中傷下血多虛喘欲
死腹痛下血不止者服之良升金一方
墜馬及樹崩血腹滿短氣方

大豆 伍升

右壹味以水一斗煮取二升半一服今盡劇者不過三作

之千金云治人墜路車馬
之心腹積血吐血無數

治落馬墮車及諸跌折臂膊痛不止方

芎藭壹兩 澤蘭壹分 蜀椒去目及汗 當歸

桂心附子 地去皮 甘草參兩

右柒味微熬令香搗篩為散酒服方寸匕日三凡足傷至
骨皆服之十日愈小兒傷損亦同

又方

黃耆各參 芍藥各參 蜀椒合去目及汗 附子炮去

烏頭半兩去 大黃壹兩 當歸壹兩 乾地黃

乾薑各貳 桂心續斷 乾地黃

通草各貳 右壹拾貳味搗篩為散先食訖溫酒服一方寸匕日三

生地黃湯主因損小便血出方

生地黃兩 柏葉壹把 黃芩 阿膠炙 甘草各參

右伍味以水七升煮取三升去滓內膠取二升五合

分三服

治瘀血腹中臭瘀不出滿痛短氣大小便不通方

荆芥半兩 大黃 芎藭各參 蟅蟲各拾 桂心

當歸 甘草各參 蒲黃伍兩 桃仁各拾 桂心

右玖味以水一斗煮取三升分三服

治折腕瘀血蒲黃散方

蒲黃壹升 當歸貳兩

右貳味搗篩為散酒服方寸匕日三先食訖服之

又方

蟲蠹七足 牡丹皮等分

右貳味搗篩為散酒服方寸匕血化為水

又方

薤白壹兩 甘草壹兩 汁服之亦可散服之日三

又方

大麻根若葉 右壹味搗取汁數升飲之即下氣通蘇息無青者乾煮麥

汁亦得升金云治跌折骨痛不可忍 又方 茅根切 搗絞取汁溫和酒服一升日三良

金瘡第五方六十二首

金瘡止血散方

釣樟根參兩 當歸 芎藭 乾地黃

續斷各壹 鹿茸半兩 龍骨貳兩

右柒味搗篩為散以傅血即止酒服一錢日伍夜三

治金瘡箭在肉中不出方

白斂半夏 洗去滑

右貳味搗篩為散水服方寸匕日三淺者十日出深者二

十日出終不任肉中效

金瘡腸出令入方

礞石燒 滑石各參

右貳味搗細篩為散白飲服方寸匕日五夜二三日當入

治刀斧所傷及冷瘡牛領馬鞍瘡方

續斷 松脂各壹 鹿角 牛骨燒者 亂髮各

右伍味搗篩細為散以猪脂半斤并松脂合煎令和下鐺

於此內藥攪令冷凝用之。瘡有汁散傳之

金瘡煩悶方
白芷 芫蕒 甘草各各

右參味熬令變色。搗篩為散。水服方寸匕。日五夜二

消石散 主金瘡先有石發煩悶欲死大小便不通方

消石 寒水石 桔樓 澤瀉 白斂

芍藥各各

右陸味搗篩為散。水服方寸匕。日三夜一。稍加之。以通為度

琥珀散 主弓弩所中悶絕無所識方

琥珀

右壹味隨多少。搗篩為散。以童男小便服之。不過三服差

故敗弩筋五分燒 秦膠伍分 杜仲半兩 大棗叁枚

乾地黃兩 附子炮去 當歸兩

右柒味搗篩為散。以溫酒服一方寸匕。日三。稍加至二匕

以知為度

續斷散 主金瘡筋骨續絕方

續斷半兩 芫蕒 茯苓 當歸各各 細辛半兩

附子炮去 乾薑 蜀椒口 桂心各各 蛇銜草

乾地黃各各 芍藥 人參 甘草各各

右壹拾肆味搗篩為散。酒服方寸匕。日三夜一。千金方有杜衡

藍子散 主金瘡中藥箭解毒方

藍子伍合 升麻八兩 甘草各各 王不留行各各

右肆味搗篩為散。水服二方寸匕。日三夜二。水和方寸匕

如泥塗瘡上。乾易毒即解

洋關散 主金瘡內塞方

澤蘭 防風 石膏 乾薑 蜀椒口

附子炮去 細辛 辛夷 芫蕒 當歸各各

甘草各各

右壹拾壹味搗篩為散。酒服方寸匕。日三夜一。膿多倍甘

草。渴加桔樓半兩。煩熱加黃芩半兩。腹滿短氣加厚朴三

分。瘡中瘀血更加辛夷半兩

痛黃散 主被打腹中有瘀血方

蒲黃壹升 當歸 桂心各各

右參味搗篩為散。酒服方寸匕。日三夜一

甘菊散 主金瘡癰疽止痛生肉方

甘菊花 防風 大戟 黃芩 芫蕒

甘草各各 芍藥 細辛 黃耆 蜀椒口

大黃 杜仲各各 生地黃肆兩

右壹拾參味搗篩。以臘月豬膏肆升煎五上五下。芍藥色

黃膏成。綿布絞去滓。傳瘡上。日三

桃仁湯 主金瘡瘀血方

桃仁五拾枚 桂心半兩 蠱蟲去翅 水蛭各各

右伍味切以酒水各伍升。煮取貳升。服一合。日三服。明日

五更壹服

馬蹄散 主被打腹中瘀血方

白馬蹄壹合

右壹味搗篩為散。酒服方寸匕。日三夜一。亦主女人病血

消之為水

金瘡內漏方

還自取瘡中血。著杯中。水和盡服。愈

金瘡腹中有瘀血二物湯方

大蘇仁參升 葱白 嫩茶

右藥使數人各擣令熟著玖升水中煮取半頓服之若血去不盡腹中有膿血更令服之當吐膿血耳

金瘡內漏血不出方

牡丹

右壹味為散服三指撮五日尿出血

治金瘡因房驚瘡方

燒婦人禪襦作灰傳之

金瘡方

取馬鞭草擣篩薄瘡一宿都差又用乾葉末

麥門冬法石膏研 柏子仁 甘草參升 桂心 壹分

右伍味擣篩為散酸漿和服方寸匕日三夜一煩滿氣上

脹逆長服之佳

治金瘡出血多虛竭內補散方

茯苓

芍藥

當歸

芎藭

乾薑

人參

黃芩

厚朴

桑白皮

吳茱萸

黃耆

桂心

甘草

蜀椒

口肝

右壹拾肆味擣篩為散飲服方寸匕日三

治金瘡煩滿方

赤小豆壹升以苦酒浸之熬燥復漬之滿三度色黑治服

方寸匕日三

治金瘡苦不差方

白楊木白皮熬令燥末服方寸匕日三服又以末傳瘡中

即愈

治金瘡刺痛不可忍百方不差方

葱一把水三升煮數沸漬瘡即止

治金瘡煩痛大便不利方

大黃 黃芩 等分

右貳味擣篩為末鍊蜜和圓先食飲服如梧子七圓日二

凡金瘡出血必渴當忍噉燥食不得飲粥及漿犯即血出殺

人凡白血不止粉龍骨末於瘡上立止

又方 割取人見著鞋上有斷乳十枚布瘡上立止

又方 末雄黃傳瘡當沸汁出即差

又方 刮具子末服壹錢匕

又方 煮葛根食之如食法務令多

兵瘡方擣車前汁傳之血即止

又方 以人精塗之差

又方 以柳絮裹傳之血便止

又方 以熟艾急裏數日乃解

又方 以人尿屎相和絞取汁飲三升頓服令盡

金瘡驚而堅腫劇者殺方

擣生地黃蟬蟬蟲傳之燒瓦熨其外令溫地黃燥則易死

冷則易

凡刺在肉中不出方

牛膝根黃擣傳之即出雖已合猶出也

正觀中有功臣遠征被流矢中其背陷上矢入四寸舉天下

名手出之不得遂留在肉中不妨行坐而常有膿出不止求

微元年秋余診看余為歲之瞿麥丸方

瞿麥 黃芩 雄黃 乾地黃 王不留行 各伍

麻黃去節 茅根 敗醬 防風 雀李根皮

牛膝 大黃 藍實 石龍芮 蓋微根皮

右壹拾肆味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子酒服十圓日貳

稍稍加至貳拾圓以知為度忌猪魚生冷等可直斷口味

凡箭鏃及折刺入身中四體皆急當合此藥服之令四體

皆緩緩則其鏃必自跳出余常教服此藥與斷肉逐日日

漸緩其鏃遂跳出韋戴衣不得行因即錯却乃得行動

已覺四體大緩不比尋常終冬至春其鏃不拔自然而落

取而量之猶得三寸半是以身必須斷口味令瘻肉緩刺

則自出矣故以記之

又方 礪石末傳之止痛斷血

凡金瘡深不用早合若合則以滑石朱粉則不合治凡竹木

刺在肉中方

以羊矢和猪脂塗之出矣

又方 鹿角末水和塗之即出

治因風水腫方

卒刺涉水成腫取非并塩擣置上以火炙藥上熱微即愈

火燒磨方 取新牛矢或熟塗之

又方 燒桃葉塩和煮作湯洗之

又方 以醬汁塗之立愈

又方 桑灰水傳乾則易

又方 井底青泥塗之佳

又方 青羊髓塗之佳

治灸瘡及湯火所損晝夜啼呼不止兼減熱方

羊脂半兩 猪脂壹分 松脂半兩 蠟壹分

傳之松明是服松木節也

治灸瘡膿壞不差方

臘月猪脂壹斤 雄白拾枚 胡粉壹兩

右參味先煎雄白黃去之綿裹石夾壹兩煎去之入胡粉

膏中令調塗瘡上貼之日三度

又方 白蜜壹兩 烏賊魚骨

右貳味搗末相和塗上三五度差

治火瘡方 柏白皮半兩 竹葉壹兩 甘草貳兩

右參味以猪膏壹斤煎三沸二上三下藥成去滓待冷塗

之瘡驗有地

治漆瘡方

湯漬芒消伍兩令濃塗乾即為勿住

又方 取市上磨刀石槽中泥津塗之

又方 取礬石內湯中洗之

又方 羊乳汁塗之

又方 漆姑草接傳之

又方 末貫衆塗之

沙蟲第六方 方三十一首

治沙蟲毒方 以麝香太蘇合搗以羊脂和著小筒中帶之

又方 雄黃 朱砂 常山等分

右參味五月五日午時童子合之

又治水毒方

凡水毒中人似射工初得之惡寒頭微痛目眦疼心中煩
懊四肢振慄腰背百節皆強助急兩膝疼或吸吸而熱但
欲睡旦醒暮劇手足逆冷二三日則腹中生蟲食人下部
肚中有瘡不痛不癢令人不覺急治之過六七日下部出
膿潰蟲上食五藏熱盛煩毒下痢不禁八九日名工不能
醫救矣覺得之當早視若瘡正赤如截者為陽毒若瘡如
鱗魚齒者為陰毒猶小緩不過二十日殺人欲知是中水
毒當作五六升湯以小蒜五升吹咀投湯中消息勿令大
熱去滓以浴若身體發赤斑文者則非他病也

水毒方

搗蒼耳取汁服一升以綿沾汁塗臍下部中日三

又方 取藜一把搗取汁服一升不過三服

又方 取藍一把搗水解以洗面目身令遍

又方

取大莓根末飲之并導下部生蟲者用汁夏月常多賣此
藥屑入水浴以方寸匕投水上流無所畏又辟射工凡洗
浴以少許投水盆中即無復毒也

蠟螻瘡方

取茱萸東引根土以醋和塗

又方

燒鹿角末和醋傳上已有瘡汁出者燒道邊故蒲席傳之
瘡表裏相當一名浸淫取猪牙車骨年久者槌破燒令脂
出熱塗之

蠟螻瘡方

取小豆末醋和塗之乾即易小兒以水和

又方

取棟木枝若皮燒灰傳上乾者膏和亦治小兒未及諸惡瘡

又方 取槐白皮半斤切醋浸半日去垢洗之日五六
狐尿刺方

凡諸螭蛇之類盛暑之時多有孕者諸物上必有精汁
其汁乾又則有毒人手觸之不至相之間則成其疾名曰
狐尿刺日夜疼痛不識眠睡百方治之不差但取僕公英
葉根中斷之取白汁塗之令厚壹分塗即差神驗
凡熱傷瘡及狐尿刺腫痛不可忍并風寒者皆馬屎若生桑
木趣得煙多熏之汁出即愈

惡刺方

五月蔓菁子搗末和烏牛乳封之無即凡牛乳亦得

又方 取野狐矢燒灰臘月猪膏和封孔上

又方 取桑灰汁熱漬冷即易

又方 以針砂和膠清塗之

又方

取故鞋網如棗大婦人中衣有血者如手掌大到勾棘針
二七枚三味合燒作灰以臘月猪膏和塗之蟲出

又方

蔓菁子 伍升

右壹味微熬末研小兒尿壹升合內瘡口中周回厚一寸

以燂火燒一升投內瘡於中漬之立愈

又方 煮槐白皮取湯漬之

又方 以苦瓠煮作湯漬之

又方 取五月五日蛇皮燒灰臘月猪膏和傳之

又方 取故鞍轡獅燒灰臘月猪膏和封之蟲出

又方 取樗根白皮切一升。泔漬炙三沸。內乳中。亦可漬之。
肉刺方 割頭令血出。內銚丹如米許。暴之。
又方 以刀割却。以好墨塗遍差。

狗齧方

即以冷水洗瘡。任血出。勿止之。水下血。斷以帛裏。即愈。

蛇咬方 以人屎厚塗。以帛裏縛。登時毒消。

蛇毒方 重臺末。啞和封。差大驗。

蛇蜂毒方

取瓦子。摩其上。啞二七。然後拋瓦子。却安舊處。

瘰癧第七方九首

治五癭方

取鹿厭酒漬。令沒火炙乾。內於酒中。更炙令香。含咽。汗味盡。更易。盡十具。即愈。

又方

小麥麩壹斤。特生礬石十兩。海藻壹斤。

右參味。取三年酢一升。漬小麥麩。暴乾。更浸。令酢盡。各搗為散。每服兩方寸匕。日四五服。藥含乃咽之。忌薑辛猪魚生菜。辛菜吹火。讀誦及大語。用氣。

又方

昆布參兩。海蛤貳兩。松蘿壹兩。海藻參兩。白欬貳兩。

通草貳兩。桂心貳兩。

右參味。搗為散。每以酒服。方寸匕。日三服。

又方

小麥壹升。鹽壹斤。昆布壹兩。海藻壹兩。

右參味。搗為散。食後飲服。方寸匕。日三。以差為度。

又方

右參味。搗為散。食後飲服。方寸匕。日三。以差為度。

昆布壹兩。海藻壹兩。海蛤貳兩。半夏壹兩。細辛壹兩。土瓜壹兩。松蘿壹兩。通草壹兩。白欬貳兩。龍膽貳兩。右壹拾味。搗篩。酒服。方寸匕。日再。不得作生活勞動也。

又方

昆布貳兩。

又方

海藻壹斤。小麥麩壹升。

右貳味。以三年酢一升。以波麩末。暴乾。往反令酢盡。大搗散。酒服。方寸匕。日三。忌怒。

陷脈散。主二十三十年瘰癧。及骨瘤。石瘤。肉瘤。膿瘤。瘰癧。或大如杯。五十年不差。致有漏。漬令人骨消。肉盡。或堅。或軟。或潰。令人驚惕。寐卧不安。體中掣縮。愈而復發。治之方。

烏賊魚骨。燼白石英。半兩。石硫黃。壹分。紫石英。半兩。

鍾乳壹兩。

乾薑壹兩。

丹參壹分。

琥珀壹兩。

大黃壹兩。

蜀附子壹兩。

右壹拾味。搗為散。財以韋囊。勿令洩氣。若瘰癧。即傳。無汁者。以猪膏和。傳之日三四。以乾為度。若汁不盡者。至五劑。十劑止。勿惜意。不作也。著藥。令人不疼。痛若不消。加芒消二兩。益佳。

治瘰癧方

昆布貳兩。海蛤壹兩。白欬壹兩。續斷壹兩。海藻壹兩。

松蘿壹兩。桂心壹兩。蜀椒壹兩。附子壹兩。羊脂壹兩。

神麩壹兩。半夏壹兩。倒挂草壹兩。

右壹拾味。各搗下篩。以醬清。牛半。隨脂丸之一服。三九。如梧子。日一服。

陰病第八方一十四首

治丈夫陰下癢濕方

以甘草一尺水五升煮洗之生用

又方 以蒲黃粉之不過三

治丈夫陰腫大如斗核中痛方

雄黃研粉 礬石研粉 甘草生用

右參味以水壹斗煮取二升洗之神良

治丈夫陰頭癰腫師所不能醫方

鹽甲壹枚

右壹味燒焦末之以雞子白和傳之

治丈夫陰頭生瘡如石堅大者方

刀刮虎牙及猪牙末猪脂煎令變色去滓日三塗之

又方 烏賊魚骨末粉之良

治妬精瘡方

丈夫在陰頭節下女人在玉門內似甘瘡作白蝕之大痛

其甘即不痛以銀釵絲纏臘月猪脂重黃火上煖以釵烙

瘡上令熱取乾槐枝誦塗之以麝香傳瘡上今香黃藥膏

藥末傳之小便後即傳之不過三度

治男女卒陰中生瘡瘡濕方

黃連 梔子略 甘草壹兩 蛇牀子二兩 黃蘗壹兩

右伍味下篩粉之乾者以猪脂和塗上深者懸裏內中日三

治下部痛癢生瘡槐皮膏方

槐白皮伍兩 赤小豆合 白芷兩 蛇實伍兩

桃仁伍拾枚 去皮 甘草壹兩 當歸貳兩

右柒味切以苦酒漬一宿旦以猪膏一升微火煎白芷黃

即成去滓摩上日再并內下部中三寸差

治陰莖頭瘡方

當歸參分 黃連半兩 桃仁貳兩 小豆壹分

槐子半兩

右伍味作末粉瘡上日三

治陰頭生瘡方

蜜煎甘草塗之即差大良效

治陰瘡黃汁出方

黃蘗壹斤 汁冷漬傳蛇牀黃連末極效

又方

桃仁二七枚熬令黃去皮尖雙仁末之酒服良

又方

生地黃一把并葉搗取汁飲之良

總療萬病第

論曰後主志學者少但知愛富不知愛學臨事之日方知學
爲可貴自恨孤陋寡聞所以聽其如此忘懷與食討幽探微
緝綴成部以貽未悟有能善斯一卷足爲大醫凡囑上冷少
腹滿腸鳴腸脫有氣冷利者當加利藥服訖當利出泔澀青
黃水青泥輕者一兩度加利藥去病即止重者五六度加利
藥得日二頻大利方得盡其根源病乃永愈其利法至已時
以來兩行三行即定亦自如舊終不成利病也凡病在上膈
久冷痰積聚成癥癥結宿食堅塊欬逆上氣等固病終日
吐唾逆氣上衝骨脅及咽喉者此皆胃口積冷所致當吐盡
乃差輕者一二度重者五六度方愈其吐狀初唾冷沫酸水
次黃汁重者出赤紫汁若先患注人當出黑血下吐藥大吐
吐時令人大悶須臾自定不久又虛脫得冷飲食已耳不虛
顫手足不攣亦有人當吐時咽中有一塊物塞喉不能得出
者飲一二合藥酒須臾即吐出一物如拳許大似段雞子中
黃重者十塊輕者五六枚

右件等疾狀病之根本若今日不出此根本之疾雖得名醫與一二劑湯藥押定於後食觸其病還發善醫者當服此藥一出根本卽終身無疾矣

凡長病人

虛羸人

老人

貴人

此等當少服。積日不已。病當內消。也不須加吐利藥。凡加吐利藥。傷多。吐利若不止者。水服大豆屑方寸匕。即定。卒無豆屑。嚼藍葉及爲豆葉亦得定。丈夫五勞七傷。陽氣衰。

千金翼方卷二十一 萬病

損羸瘦骨立者服之即差旬月之間肌膚充悅腦滿精溢仍加補藥加法在後章中。

用藥多少法

歷節酒去風

賊風

熱風

大風

同寺

備屈 張退

以上風皆帶熱

外治藥

與屋壹拾貳

濕屈

腹中堅硬者

月資

口喎面笑一目

口肆兩

起即頭旋

頭面

心悶欲嘔吐項

因瘡得風口瘰

病方

積冷淡癯瘦者

宿食吐逆

癰痔瘰癧欬

壹貳區別壹陸兩

卒中惡忤心腹

瘡氣老服蟲蠱

冷海壹月半

答一拾貳兩

卷之六

以水不周目前

月方不言人月
客身後病六兩

此其所以貴也

1174

大醫王一切風冷等萬病方

芫花	狼毒	繆刺	天雄	去皮五加皮
麻花	白芷	紫苑	烏頭	去皮附子
莽草	茵芋	桔樓	荆芥	赤車使者
莽花	大戟	王不留行	石南	署預
麻黃	石斛	半夏	人參	牛膝
長生	藜蘆	分狗脊	獨活	車前子
秦元	蛇床子	芫絲子	藜蘆	藜蘆
柴胡	牡丹	五味子	芫絲子	芍藥
吳茱萸	桔梗	杜仲	桂心	橘皮
續斷	茯苓	細辛	乾薑	厚朴
茯神	山茱萸	防已	黃耆	蜀椒
巴戟天	高良薑	紫葳	黃芩	當歸
昌蒲	乾地黃	通草	黃芩	當歸

右六十七味。勿熱鑊。直置振去塵土。即搗麝篩下藥三兩。黍米三升。麴末二升。上酒壹斗伍升。淨洗米。以水伍升。煮米極熟。停如人肌下。麴末熟。瀝次下。散獨如前。次下酒。攪之。自通。貯不津器中。以布片蓋之。一宿。旦以一斤枝子攪。三十。四。五。更溫。一盞服之。以四服。頭面習習。為度。勿輒加減。非理造次。必大吐利。欲服散者。以絹篩下之。一服方寸匕。只一服。勿再也。水飲藥酒。皆得服之。尤服者。蜜和服。如梧子。七。九。惟不得湯服也。須補者。藥少。服令內消。即足補也。千。金。方。有。白。木。食。米。黃。無。麻。花。半。夏。赤。車。使。者。高。良。薑。三。味。散。後。加。成。法。中。有。越。志。也。

○凡服此藥。法先多服。令人大吐下利。三五度後。乃少服。

方奇得金。其加增藥法如左。

麻花	烏頭	王不留行	赤車使者
麻黃	茵芋	芫花	五加皮
白芷	莽草	附子	桔樓
天雄	芫絲子	藜蘆	巴戟天
細辛	獨活	署預	乾薑
厚朴	防已	黃耆	乾薑
桔梗	牡丹	山茱萸	大戟
秦元	芫絲子	狗脊	藜蘆

右三十六味。並王風多者。患之者。准冷熱加減之。

茯苓	芫絲子	天雄	附子	王不留行
桔梗	當歸	天雄	附子	王不留行
茵芋	當歸	天雄	附子	王不留行
狗脊	當歸	天雄	附子	王不留行
葛蒲	署預	石南	牛膝	細辛
柴胡	車前子	桂心	柏子人	五加皮
杜仲	黃芩	黃芩	黃芩	黃芩

右三十二味。主濕痺腰脊患之者。准冷熱加減之。

秦元	芫絲子	天雄	附子	王不留行
石南	芫絲子	天雄	附子	王不留行
石斛	芫絲子	天雄	附子	王不留行
附子	芫絲子	天雄	附子	王不留行

右十六味。主急痺患之者。准冷熱加減之。

莽草	防已	藜蘆
右三味。主身痒疥癬患之者。准冷熱加減之。		

紫苑 牡丹 茯苓 茯神 柏子人

葦花 人參 遠志 細辛	右五味主驚癇患之者準冷熱加減之	蜀椒 長生 躑躅	右五味主驚癇患之者準冷熱加減之	紫苑 芫花 藜蘆	右五味主驚癇患之者準冷熱加減之	高良薑 桔梗 芫花 山茱萸 茯苓	人參 柴胡 牡丹 葦花 茯苓	巴戟天 芍藥 乾薑 附子 烏頭 去皮	麻黃 茯苓	右壹拾味主癰冷積聚腹痛堅實患之者準冷熱加減之	厚朴 橘皮 桔梗 太戟 藜蘆	半夏 乾薑 藻本 人參 吳茱萸	右壹拾味主腹痛脹滿吐逆患之者準冷熱加減之	茯苓 厚朴 芫花 半夏 細辛	烏頭 黃芩 柴胡 山茱萸	右玖味主痰實患之者準冷熱加減之	厚朴 乾薑 紫苑 茯苓 桔梗	葦花 烏頭 人參 細辛 柴胡	右壹拾味主消滿痛患之者準冷熱加減之	紫苑 署預 石解 細辛 巴戟天	牡丹 當歸 人參 葛蒲 五味子	桔梗 柏子 人參 吳茱萸 山茱萸 乾地黃	右壹拾伍味主補五藏虛損患之者準冷熱加減之	柏子 續斷 黃耆 署預 芍藥	巴戟天 五味子
----------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------	------------

右七味主六氣患之者準冷熱加減之	肉苁蓉 蛇床子 五味子 附子 天雄	萆薢 桔梗 署預 遠志 巴戟天	菟絲子 牛膝 柴胡 車前子 細辛	茯苓 杜仲 五加皮 石解	右壹拾玖味主益精髓患之者準冷熱加減之	乾地黃 菟絲子 天雄 附子	右肆味主補骨髓患之者準冷熱加減之	當歸 藜本 白芷 乾地黃 五加皮	石解 菟絲子 署預 五味子 厚朴	右壹拾味主長肌肉患之者準冷熱加減之	五加皮 杜仲 續斷	右叁味主陰下濕痒患之者準冷熱加減之	茯苓 人參 桔梗	右叁味主消渴患之者準冷熱加減之	桔梗 茯苓 芍藥 橘皮 秦朮	山茱萸 車前子	右柒味主利小便患之者準冷熱加減之	葛蒲 桔梗 山茱萸	右叁味主便利患之者準冷熱加減之	人參 細辛 菟絲子 狗脊	右肆味主明目患之者準冷熱加減之	昔翳 白芷	右貳味主止淚患之者準冷熱加減之	細辛 遠志 人參 補心	右叁味主補六氣患之者準冷熱加減之
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------------------	------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------	----------------------	------------------

石南 草解 狗脊 車前子 石斛

右伍味補養腎氣患之者準冷熱加減之

蜀椒 當歸 麻黃 桂心 吳茱萸

紫苑 芫花 藜蘆 附子 半夏

烏頭 芫蒲 遠志 細辛 芫花

五味子

右壹拾陸味主咳嗽上氣患之者準冷熱加減之

蛇床子 石斛 細辛 署預 橘皮

右伍味主下氣患之者準冷熱加減之

附子 乾薑 人參 桂心 橘皮

厚朴

右陸味主霍亂患之者準冷熱加減之

黃耆 通草 厚朴 山茱萸 茯苓 牡蠣

紫苑 當歸 白芷 黃芩 蛇床子 熟地

右壹拾肆味主月閉患之者準冷熱加減之

麻黃 枯樓 柴胡 桂心 芍藥 附子

通草 芫蒲 遠志 人參 附子

黃芩 乾薑 蜀椒 附子 伏苓

苦窮

右壹拾陸味主嘔調如膠患之者準冷熱加減之

論曰所加之藥非但此方所須普通諸方學者詳而用之

阿加陀藥主諸種病及特息服法又服益人神色無諸病方

紫檀 小藥 葛根 鬱金 胡椒 胡椒 胡

右伍味擣篩為末水和內臼中更擣一萬杵圓如小麥大

陰乾用時以水磨而用之

諸咽喉口中熱瘡者以水煮并麻取汁半合研壹圓如梧子

大日服之貳服止禁酒肉五辛宜冷將息

諸下部及隱處有腫以水煮牛膝乾薑等取汁半合研壹圓

如梧子大日服之四服止禁酒肉五辛生冷醋滑

諸面腫心悶因風起者以水煮防風取汁半合研壹圓如梧

子日服之貳服止不須隔日禁酒五辛醋肉

諸四體酸疼或寒或熱以水煮麻黃取汁半合研壹圓如梧

子日服止禁酒肉及麪五辛

諸腫下部有瘡云壹圓如梧子大又煮艾槐白皮取汁半合

研壹圓灌下部一度禁酒肉

諸卒死服者多活者其人手脚頭面腹腫觀顏色無定若有

此色而加刺者並不堪治以冷水弱半合研貳圓如小豆灌

口一服不差更與一服若指得食白粥者禁酒肉五辛

諸被壓傷當心常帶壹圓又以水一盞煮壹圓如小豆

服之參服止無所禁忌

諸被蛇及惡獸等毒若夫被其毒直須辟除諸毒行便即

遠離入草已被毒者以麝香壹相思子大又以水壹盞煮

共藥壹圓如小豆於水內研服并以紫檀以水研取汁用

藥塗其瘡毒處禁酒肉五辛

諸被一切鬼神及龍毒氣者其人飢渴寒熱時來時去不知

痛處或恍惚龍毒者其人昏昏似醉膚體斑駁或青取藥壹

圓如梧子以水酸棗許共藥研灌鼻及服貳服止無所禁

諸被鬼縛失心癲狂莫問年月遠近以艾汁壹酸棗許研

藥貳圓如小豆服之若無青艾取乾艾水浸擣取汁用亦得

肆服止并帶壹圓當身隨身口味無所禁忌

諸傳刀復連夢想顛倒身體瘦損不知病所起者先以水研雄黃梧子大取汁酸棗許研貳圓如小豆大服之貳服止并挂壹圓暑病者房門上及帶壹圓隨身口味無忌諸消渴者以朴消少許以水攪消取汁半合許研貳圓如小豆服之柒服止禁五辛酒肉麪諸患淋不閉遠近以豉消少許以水攪取壹酸棗許汁研藥貳圓如小豆大服之便止禁酒肉諸患一腫以水膏升煮亥亥取汁研藥服叁服止又以水半合研亥亥根取汁和藥塗下叁遍不須隔日惟食白粥飯自外鹽以上皆不食諸卒心膈熱眼暗口臭以水煮苦竹葉取汁半合研藥壹圓如梧子貳服止禁酒肉諸難產以漿將一七水煮取汁半合研藥壹圓服之若無漿將研薑黃取汁研藥壹圓服之亦得將息如產時諸熱瘡無問遠近以水煮大黃取汁半合研藥壹圓如梧子服之貳服止又水研大黃取汁以藥壹圓研塗瘡上日叁遍禁房數五辛宜令將息諸吐血若因熱吐者不問遠近服之並差冷吐者不治以葛蒲汁壹酸棗許研藥貳圓如小豆服之肆服止須微暖將息忌酒肉五辛諸鼻中血不止以刺薊汁壹酸棗許研貳圓如小豆服之并研灌鼻貳服止若無刺薊之時取乾者水煮取汁依前法服壹酒肉五辛諸噎病以水研枯樓取汁壹雞子大研藥壹圓如小豆服之肆服止忌生冷諸赤白帶下以牡丹皮刺薊根各貳分以水貳升煮取壹升

分伍服研藥壹圓如梧子服之伍服止禁生冷五辛酒肉後補法地榆貳分桑螵蛸貳分右貳味水貳升煮取汁壹合日分作貳服取汁壹合研藥壹圓服之諸得藥每以冷水半合研藥壹圓如梧子服之貳服止禁酒肉五辛宜五日冷將息諸卒得惡忤以人乳汁半合研藥壹圓如梧子大灌鼻以水半合研藥壹圓如梧子灌口三日禁食諸寒瘧以水一升煮恒山壹兩取汁半合研藥壹圓如梧子大服之貳服止先取藥如麻子大以冷水研灌鼻中二四定病者垂頭卧便得痛痒又更灌一邊令相續然後服藥七日少食禁如前諸蠶豆濕以生犀角白檀香以水煮取汁壹雞子殼許研藥貳圓如小豆并蚬蛇膽壹圓共研服之叁服止若耳濕藥及蚬蛇膽各圓以綿裹內於下部中叁度止諸卒神志除諸瘧疾每以白蜜如棗核大研藥壹圓如小豆服之叁服止禁房數五辛如前諸草藥毒迷悶以泥裹之瓜燒絞取汁半合研藥壹圓如梧子服之叁服止禁房數五辛諸惡瘡常以藥壹圓如梧子夜卧安頭邊不得著身每夜欲卧服壹圓如梧子以水一升煮牡蒙貳分取汁半升分叁服七日慎食諸心勞虛弱以水煮茯神人參取汁半合研藥壹圓服之拾服以上止慎生冷諸心風虛熱以竹瀝漬防風攪絞取汁半合研藥壹圓如梧子

服之渠服慎酒肉五辛醋麪。

諸心驚戰悸以水壹升切茯苓牡蠣各壹分煮取汁半升分參服壹服研壹圓服之伍服止。

諸多忘恍惚以水煮人參取汁半合研壹圓服之伍服止亦可染服慎煎劑。

諸溫疫時氣以水煮玄參取汁壹合研壹圓如小豆服之肆服壹圓宜緩急惟得食粥及冷食餘皆禁。

若患勞家過相湯黃服時并取艾作炷灸長參寸門關當心灸赤壯即解。

諸嘔吐水煮白檀生薑取汁半合研壹圓如梧子服參服止七日慎食如前。

諸噎病水壹升煮通草橘皮各半兩取汁參合分再服研貳圓如小豆服之貳服止慎生冷。

諸小兒驚啼以水煮牡蠣取汁半合研壹圓如梧子塗乳上令兒飲乳母慎酒肉五辛。

諸產後血結以生地黃汁半合研壹圓如梧子服之貳服止血便消下忌食酒肉。

諸熱風痺風氣相擊今皮膚厚澀關節不通以防風牡荊子各壹分昇攪壹分以水壹升煮取汁參合分參服每曰壹服研壹圓如梧子大服之拾服止慎酒肉五辛。

諸熱風上衝頭面一痒鼻中痒兼時行寒熱若食嘔吐以人參壹分防風生薑各貳分以水壹升伍合煮取汁參合分參服取汁壹合研壹圓如梧子服之柒服止慎如上法。

諸黃疸病以黃芩苦參各貳分以水壹升煮取伍合分參服壹服研壹圓如梧子服之若渴內按茶格樓各貳分依前以水煮服惟得飲粥。

諸卒失暗不語以防風壹兩和竹瀝攪絞取汁半合研壹圓如梧子貳服止即語重者不過伍服禁酒肉醋麪生冷等諸懷孕三月以上至臨產不問月日多少忽染種種疾或好傷落及至水腫天行時氣此醫人不許服藥惟得此藥參服以上重者不過拾服即差母子不損平安分解煎劑諸病可作湯研藥服之甚良。

諸產後先刺鮮血後雜膿及腹中絞痛橘皮桔梗各貳分生薑壹兩水壹升煮取半升分參服壹服研壹圓如梧子服之七日慎生冷油膩醋麪。

諸小兒新得風癇以竹瀝半合研壹圓如梧子服之貳服止慎煎劑。

諸女子數傷胎帶壹圓如酸棗大夜即解安頭邊不得著身每日服壹圓如梧子三日止無忌。

諸卒腹脹水煮當歸取汁半合曰服壹圓如梧子貳服止慎生冷。

諸膝下絞痛以水煮當歸取汁半合研壹圓如梧子參服止七日慎食生冷。

諸蛇蠍蜈蚣毒以水磨鬱金取汁半合研壹圓如梧子服之貳服止并研壹圓如小豆遍塗瘡上忌煎劑。

諸霍亂因宿食及冷者吐逆腹中絞痛吐利若冷者以桔梗乾薑以水煮取汁壹圓如小豆貳服止因熱者用梔子仁以水煮取汁依前法服皆慎生冷。

諸注病以水煮細辛取汁壹圓如小豆貳服止五服止冷者溫將息。

諸中惡以水煮甲香取汁壹圓如小豆貳服止。

考婆治惡病第二論 漆首

論曰疾風有四百四種總而言之不出五種即是五風所攝云何名五風一曰黃風二曰青風三曰白風四曰赤風五曰黑風其風合五臟故曰五風五風生五種蟲黃風生黃蟲青風生青蟲白風生白蟲赤風生赤蟲黑風生黑蟲此五種蟲食人五臟若食人脾語變聲散若食人肝有瘕瘕若食人心遍身生瘕若食人肺羣柱倒垂中生息因若食人腎耳鳴喉乾或如車行發之聲若食人皮皮膚頑癢若食人筋肢節墮落五風合五臟蟲生至多入於骨髓來去無礙壞於人身名曰疾風疾風者是癰病之根本也病之初起或如針錐所刺名曰刺風如蟲走名曰遊風遍身掣動名曰瞤風不覺痛痒名曰頑風肉起如桃李小瘰核從頭面起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風如連錢團圓赤白青黑斑駁名曰瘡風或遍體生瘡或如疥癬或如魚鱗或如榆莢或如錢孔或瘡或瘻黃汁流出肢節癢癢悉為膿血或不痒不痛或起或滅青黃赤白黑變易不定病起之由皆因冷熱交通流入五臟通徹骨髓用力過度飲食相違房室不節虛動勞極汗流遍體因茲積熱風熱散五臟飲食雜穢蟲生至多食人五臟骨髓皮肉筋節久不壞散名曰癰風是故論曰若欲療之先服阿魏雷頭散生蟲者其形狀青黃赤白黑然後與藥療千萬無有不差胡云逆風遊病此醫拱手無方對治名曰正報非也得此病者多致神仙往往人得此疾在家室財物入山遂得疾愈而為神仙今人患者但難妻妾無有不瘥

阿魏雷頭散方
紫雷丸 雄黃 紫石英 煅金
朱砂 滑石 石膽 丹砂 雄黃
白蠟 犀角 羚羊 斑蝥 麝香 羌活 獨活 各

牛黃伍分 紫銅壹兩

右膏拾伍味搗篩為散空腹服壹錢匕清酒貳合和藥飲諸天飢即食小豆羹飲為食莫多食但食半腹許即止若食多飽則蟲出即遲日西南空腹更壹服多少如前若覺小便似淋時不問早晚即更服藥多少亦如前大飢即食若覺小便時就盆子中出看之蟲從小便出當日即出或二日三日乃出或四日五日出或殺藥人七日始出其蟲大者如人指小者大如小麥或出三四枚或五六枚或七八枚或十枚或三二十枚黃蟲似地黃色赤蟲似碎肉凝血色白蟲似人涕唾或似魚腦或似薑豉汁青蟲似綠或似青黃色黑蟲似墨色或似爛椹又似黑豆或似蟲得藥者死死者即從小便中出大便中亦有出者不淨不可得見若出黑蟲即是黑風不可理之無方可對若出黃蟲即是黃風當用小便七八升大盆盛之如龜法安寢不津者盛小便中常令使暖入中浸身一日再三度一入中坐浸如炊二三次米頃若心悶即出湯數食莫令飢虛則於人無力七十四十九日即為一歲以差為度或一年二年忌房室房室脈通其蟲得便病即更加其患非冷熱風治如此此是瘕病非正報也若出青蟲即是青風患起由冷風至多其蟲皆青即是東方木中毒風青蟲宜服自小便亦名花水亦名清湯亦名還中水服法空腹服一七日一服六合旦起日初出即服服不過一升飢即食不得食五辛猪肉雞犬穢食臭惡之食人噴怒房室皆忌之服法第一忌之至二七日一日再服服別四合服小便常取空腹服之則不過一升二七日一日三服至四七日小便出即服乃至周年以差為度服之不通一升百日外小便至少一日之中止可一度二度服之服

大者美好如美如藥忌法三年犯則難差不犯永愈青蟲如此是橫痃非正報也出白蟲者即是白風亦蟲者即是赤風同為一等療二風由熱為根蟲皆赤白乃是南風西風入五藏通微骨髓成患為疾此之二風與苦參消石酒飲之除患最疾熱去其患即愈

苦參消石酒方浸酒法

苦參

消石

好清酒

右三味先與清酒下消石浸之二七日或三七日然後與苦參同入酒瓮中盛浸之七日漸漸服之飲法空腹服之一日三服初七日中一服如半雞子許七日後可飲一升任情飲之多則為善患去則速風動亦多勿使醉吐寧漸少飲不用多飲赤白二風此藥至日無有不愈餘非難治何以故熱為根本故苦參能治熱消石除熱消蟲赤白二蟲但聞消石氣皆變為水能去熱根本若患赤白二風不問年月多者五年以外加黃消石加酒苦參乃至三司人無有不愈乃至三十年無單柱肢節墮落者但非黑蟲皆悉未愈第一忌房室大瞋怒大熱食禁粘食五辛生冷大醋酪白酒猪魚雞犬驢馬牛羊等肉皆為大忌自餘不禁此為對治非正報也若人頑痺不覺痛痒處者當作大白膏藥摩之一日三四度七日微或二二七日微乃至七七四十九日名曰一大微頑痺即覺痒平復如本即止摩若不平復但使摩之以差為限不過兩大微三大微無有不愈針刺灸燒割劫亦不及摩之為良乃至身上多有瘡痕生摩之悉愈

大白膏方

白芷

白朮

前胡

吳茱萸略一

苦菊仁

蜀椒

細辛略三

當歸

桂心略二

苦酒酒

右膏拾味以苦酒浸藥經一宿取不中水猪脂十斤銅器中煎令三沸三上三下候白芷色黃膏成財以瓶中隨病摩之即愈若遍體生瘡膿血潰壞當作大黑膏摩之

大黑膏方

烏頭

芫薺

雄黃

胡粉

木防已

升麻

黃連

雌黃

藜蘆

礬石略半

杏仁去皮

巴豆略細

黃藥

松脂

亂髮略如雞

右一十五味搗篩為末以猪脂二升合藥煎亂髮消盡膏成用塗瘡上日三傳先以鹽湯洗然後塗之勿令婦女小兒雞犬見若患人肩膊墮落不生者服藥後經一百日外即以鐵漿洗其肩膊處所一日二度洗之生毛則速出一大微眉睫如本與不患時同也

浸酒法

苦參去上黃皮薄切暴乾搗令散莫使作末秤取三十斤取不津甕受兩斛者甕底鑽作孔甕中底頭著二三十青石子如桃李雞子許大過底孔上二三十然後下苦參下消石末酒一時著甕中遺童子小兒年十三四者和合調俛然後即與五六重故紙繫甕口用小甕口合上泥之莫使漏氣取酒服時法孔中出酒服之一日一服或再服亦得還如法密塞孔勿漏洩不得開甕口取酒酒欲盡時開甕口取苦參浮急絞取酒其滓去却其酒密處盛之莫使漏氣服酒法一一如前無有不愈若患不得差除者皆由年久十年者更作此藥酒至兩劑無有不愈依法如前雖用良醫治之亦須好酒須行忠直不得不孝不義患除則

速矣

論曰苦參處有之至神良黃消石出龍窠其狀有三種一者黃消石一者青消石二者白消石其形如鹽雪體濡燒之融似曲蟻入鹽為水消石真者燒鍊皆融真偽可知三種消石黃者為上青者為中白者為下用之殺蟲皆不如黃者最良黃消石立殺人身中橫蟲去蟲至速除大風大強藥青消石者至神大藥出在鳥場國石孔中自欲流出氣至惡大臭蜂蛇飛蟲皆其宗之其氣殺蟲消石與苦參酒相入治熱至良去風至速方稀有用時乃勝於白消石此青消石體狀也如似世間膠漆成時亦如陳蜜亦如餛飩少必枯體澤又似塵汗脂蜜氣味至惡此藥道士責服則去人身中橫蟲不能得用時先與二三升酒浸之二十日多日為佳其勢倍效皆大驗然後與苦參同浸

論曰黃青白消石等是百藥之王能殺諸蟲可以長生出自鳥場國採無時此方出者參醫方論治疾風品法中黃力三歲詳後演七卷治疾風品法云服藥時先令服長壽延年符大驗蕩除身中五藏六腑游滯惡氣皆出盡然後服藥得力其疾速驗無疑符力亦是不思議神力先服藥者無有不效又生治藥入定中時令童子小兒和合訖即告符書鎮藥符鎮在元腹令藥不壞又久為好一切神鬼不可近之矣

論曰疑師不治病疑藥不服之服之即不得力決意不疑者必大神驗一切藥有從人意即神疑人必失及久多必損不疑又者有益治病當有愈醫論如此說是以令知服藥先服藥符大驗遣諸惡氣藥勢必當有效朱書空腹服之訖即服藥如前說



朱書此符

先服此符然後服藥一服之後更不須再服盡符用六合日勿令小兒女子六畜雞犬等見之符成不忌

論曰病起從上者名為順病病則易治治則病疾愈從下起者名為逆病難治倍藥可差

論曰患在五藏骨髓者非湯藥不愈患在皮膚肉脉中者針刺可差湯藥益人精神久有益患易除愈盡其根源針灸雖得目下解急於人神濁者性延年要是湯藥非針灸之所及也湯丸散酒延年益壽燒灸針刺於身不利

論云疾有多種所患不同有蟲癩疥癩風癩全癩木癩水癩火癩土癩酒癩癩此皆作癩

蟲癩者得即生瘡膿血潰爛眉髮墮落三年爛壞蟲如馬尾此患難治加藥乃愈

疥癩者狀如癬癩身體狂痒十年成大患加藥乃愈

風癩者風從體入或手足刺痛風冷痺癢不療二十年後成大患加藥乃愈

金癩者是天所為為功德崇初得眉落三年食草草柱朋倒難治加藥乃愈

木癩者初得先落眉腰面目痒如復生瘡三年成大患宜急治之加藥乃愈

水癩者先得水病因知留停風癩發動落人眉落且急治之經年病成加藥乃愈

火癩者先於身體生瘡如火燒瘡或斷人肢節七年落眉腰八年成大患難治加藥乃愈

土癩者身體瘡癩如雞子彈丸許宜急治之六年成大患加藥乃愈

落連治可差

乃愈
凡三十九種病或面起身腫頑痺不覺痛痒或目圓失光或

言音難重或眼蒙多眵或從腰窩或從足腫種種不同莫能識
病非一般或所得各異若肩臂墮落皆由風冷因濕得之或
因汗入水冷氣太過或飲酒大醉濕地而臥或立當風衝樹下
露坐或房室過度流汗極體取冷風入五藏遂成斯患是故論
此患之所根本藥之分劑未來病者按而用之無有不愈
浸湯方

桃柳各十

荻葉

藜蘆

烏頭去皮

茵芋

丹參

楮葉

白羊羶

柏葉

梨皮

大黃

鬼扇

桑甲

棠本

棠葉

松葉

食茱萸條二

鹽瓶

右一十八味細剉內大金中以水七斛煎取汁四斛去滓內
槽中令病者卧浸日三食時便出日中時復入日西後出其
湯常欲得暖以自消息出湯即用十種粉粉之不得使風入
被覆温卧使身汗流病即差若風多可加藥如左

薊藿

艾葉

瓜根

虎掌

兔絲

木防已

狐骨

礬石

大鹽

馬牙消

右壹拾味持篩為散出湯用粉粉身使風不入諸癩病生瘡
一切諸癩瘡止用粉粉之立差矣

又作酒法

茵芋

烏頭去皮

天雄去皮

附子去皮

蜀椒

防風

石南

乾薑

桂心

躑躅花

莽草

甘草

右壹拾貳味吹咀絹袋盛清酒壹斗漬之春秋七日夏五
日冬十日一服三合日三服以知為度不知漸增禁如藥法
仙人黃靈先生用大真百畏丸治一切癩病方

淳酒

丹砂

水銀

桂心

乾薑

藜蘆

烏頭

蜀椒

荻葉

柏子

右壹拾味持篩為散內酒中訖投下淳漆二升攪令相得可
九如梧子作九百九日服一九日二十日肩臂生三十日便
本也

九膏君治十種大癩不可名狀者服之病無不愈方

用三月庚寅日取薑青花四斤陰乾末之五月辛酉日取

兩井水

附子末

藜蘆末

乾漆末

桂心末

附子末

藜蘆末

乾漆末

石榴末

右五味藥末攪使相和煎令成丸如彈丸大服一九即愈若
不差者不過三四九即愈大驗此方出九膏君守朴經

仙人治癩病神驗方

取松葉不問多少煮三五遍令苦味盡暴乾搗末如麴先

食服二方寸匕日三漸增之或可至四兩隨人多少至壹

斤飢即服之能愈萬病又益壽延年殺三蟲食人五臟動

發若病難忍四肢重不仁婦人產後餘疾月水往來不得

續男女老少者藥主之

礬石醃酒方

礬石

代赭

恒山

蜀椒口石 遠志去皮 狼毒 半夏洗

芒消 礞石錄 玄參 麻黃去節

防風 桔梗 秦艽 石南

石草去毛 黃連 莽草 乾地黄

煖水石 芎藭 甘草炙 白石英精

杏仁煖

右二十五味橋歸盛置囊中以時麴三斤米三斗作酒酒熟合藥封之冬十日春七日夏三日秋五日出藥去滓服酒如一雞子酒勢盡復進之所治無有不愈日再十日知三十日愈百日面白如桃李花色耳目聰明邪氣蕩除去魂還復服藥當暴戒有效驗矣

躡麴療冷第四方

鹽麴主一切風冷氣等萬病方

麴末五升 鹽末五升

右二味熟搗分作五袋旦取二袋炒令熱以薄袋各受一升內藥於中更逆盛之於室內臥以脚躡袋以被覆之以注其藥冷即易初一日一夜限以十度炒之於後連日連夜炒頻躡不得暫停其藥既易多無力即棄之別取新者候魚體汁盡其病方差特須細心多日久候汗盡乃止未盡時間數有悶亂惟食香粥特忌生冷所臥床上教白熟羊皮刺風汗並盡然後乃補之三部脈微弱者勿用之

石草十兩 石南三兩 仙靈脾計日 細辛五兩

石四味切和以水一斗煎取二升去滓經宿登杏仁一升去皮尖及雙仁搗以水八升研取汁煎取二升半經一宿以二汁合之計得四升半以乾麴一斗五升先以五加皮汁浸麴

停一宿其次下石草等汁一時合和以上黍米七升分爲七酸三日下酸凡三十九日即熟取麻子一升淨擇炒令香熟搗作末以絹袋盛內酒中經三日量力稍稍服之以知爲度其補日與躡麴日等盡補以來大小便不得出忌房室喜怒若犯忌後發難差其無酒可補者別補方如左

羊肚肝腎心肺白餘生細切以酒熬牛酥

胡椒 畢撥各一兩 豉心半升 葱白三兩

右五味合和以水六升緩火煎取三升絞去滓和藥等并餘汁並內吐中以繩急繫口更別作絹袋一口稍小於羊肚更之若熱更熱出以刀子并絹袋刺作孔瀝取汁空腹服令盡餘者任意分作羹粥食之其無五藏可得用羊骨以補之其方如左

生羊膏補

右以水一石微火煎取三升依食法任意作羹粥食之其不

食肉者以油麴補之方如左

生烏麻油外折梗米汁清汁一升

右二味合和微火煎盡油清汁惟有油在即止停冷以用作食補法如左

以上油三合 鹽汁七合

右二味先以鹽汁和油攪令鹹淡得所即用以漉麴一升依常法作餅飽煮五六沸漉出置令水中更漉出置盤上令乾後更一葉葉擲盆中又煮如常法十度煮之麴盡乃盡以油隨意多少和鼓令味足以澆食大好

內藥法主婦人絕產及冷結氣宿食不消男子五勞方

生地黃五兩 熟地切 麴末二升

右二味合和內小麴子中密塞口勿洩春夏秋三十日冬埋

入地三尺四十九日出之暴乾搗篩以糯米作粥一升以散
二方寸匕和服之日三任意服之不限時節便以為常食取
飽足而已更不得餘食也服盡以來其病並差七日後任如
常食

飛鍊

飛鍊研製鍾乳及和草藥服療第一訪方

鍊鍾乳法

鍾乳無間厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不堪用一斤置金銀器中可鎮心益氣無者用瓷器亦得大鑊中著水置乳器於水令浸之常令如魚眼沸水減更添若薄乳三日三夜若厚齒及厚肥乳管者七日七夜俟乳色變黃白即熟如疑生更煮滿十日為佳若訖出金銀器其鑊內水盡黃濁棄之勿令人服若服此水便戟人咽喉傷人肝肺令人頭痛又令人下利有犯者噉猪肉即止并此黃汁更著清水還內上件乳器煮之半日許出之其水猶清不變即止乳無毒矣

研鍾乳法

取所鍊鍾乳於瓷器中用玉鉈搗令碎著水研之水盡更添常令如稀汁狀乳細者皆浮在上麤者沉在下復繞鍾研之易碎滿五日狀如乳汁至七八日其乳效白尤非常可愛取少許置臂上拭之狀如搃書中白魚滑自然白光出便以水洗之不隨水落便熟若得水而落者即生更須研之以不落為度熟已澄取暴乾之散任意服之

崔尚書乳煎鍾乳主治積冷上氣坐卧不得并療風虛勞損腰脚弱補益元悅強氣力方

鍾乳

右壹味研如麩以夾帛練袋盛稍寬容緊繫頭內牛乳壹大升中前之三分減一分即好去袋空飲乳汁不能頓服分為再服亦得若再服即取晚間食消時服之如能頓服即平旦

盡之不吐不利若稍虛冷人即微下少鴨瀉亦無所苦明旦又以一大升牛乳准前煎之依法餌之其袋于每煎訖即以少許冷水灌之不熱氣不通洩如此三十度以上四十度以下即力盡其袋中津和麩飼母雞取其生子食亦好不然用浸藥酒亦得若有欲服白石莖並依此法若患冷人即用酒煎熟熱人即用水煎之若用水及酒例須減半乃好若用牛乳三分減一分補益虛損無以加之永不發動忌食陳久敗物不可噉熟麩猪魚蒜等

服鍾乳酒方

鍾乳取鹿乳上者

右一味以無灰新熟清美酒一斗於不津器中相和密封開冬七日夏三日空腹溫服三合日再漸加之以知為度十五日六日可盡將息節食忌如前法

草鍾乳方

曹公方主五勞七傷損肺氣急主療丈夫衰老陽氣絕手足冷心中少氣髓虛腰疼脚痺身煩口乾不能食服之安五藏補腸胃能息萬病下氣消食長肌和中左

鍾乳煉令細

石斛鹽

吳茱萸半兩

右四味別搗篩為末鍊蜜丸如梧子空腹服七丸日再服之訖行數百步溫清酒三合飲之復行二三百步口內熱熱如定即食乾飯豆醬過一日食如常暖將息不得聞見尸穢等無亦不用食蠶豆陳惡食初服七日不可為房事過七日後任性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相續服三劑終身更無所患多房者加雄蠟二十枚若失精者加茯苓參兩服軟生乳方鍾乳名

此乳力減者倍服之末不凝其乳長半寸以來水浮者上研依法令極細即於倉米飯下蒸之飯熟即出在甕中多少一無禁忌服乳者更石得服餘石當令人却致不和

飛鍊研菱五石及和草藥服藥方

服白石英方

白石英州者

右壹石先以生絹袋盛於七升米飯下甕中蒸四五遍然後細搗以密絹篩之用玉礎研令細入肉者澄取清水飛取更以白練袋盛急縫裏飯中蒸三遍取豬脂壹斤水浸十日兩度易水赤脉盡則休剥去薄膜微火鍊出以白石英末和之攪令相入和酒服一匙日二服其飛石水以取用黃稷米甕任性喫酒多少每酒覺有酒氣為佳

燒白石英方

白石英州者

右以坩土鍋子盛石蓋頭炭火燒之先取一甕器貯二升無灰酒燒石令赤即投酒中待冷任酒性多少飲之好石可三兩度乃棄之安甕中即二甕十兩令人年七十氣力可共三二十時無別

白石英和金銀人參煮服方

白石英州者

銀州者

人參州者

右四味取金銀洗即下前藥於金中先下水參大升立置杖入金中令至底水所浸者即刻記至更下水參大升立乘升水通前計參大升煎之如魚眼沸漸減之杖所刻處即停火急取濕土置釜底取其汁貯以不津器中金銀石等澆出收取其人參煎藥汁細細喫之其汁每朝空腹服參大合

至春服貳大合每服之後隨性飲多少酒使藥氣行欲作食餌亦任忌倉米停滯陳臭之食自外自無所忌

石英和磁石浸酒服方

白石英州者

磁石州者

右貳味各別搗令碎各用兩重帛練袋盛之以好酒壹斗置不津器中挂藥浸經六七日以後每日飲三兩至常令體中微有酒氣欲加牛膝丹參杜仲生地黃吳茱萸黃耆等藥者各自量冷熱及所患并隨所有者加之仍隨所加有忌者即禁之餘自無忌中年以後則鬚髮變黑腰疼耳聾寒差其酒三五日後即漸添一二升常令瓶滿所加草藥疑力盡者任換之經三四箇月疑石力稍微者即更出搗碎還以袋盛經半年後即棄之準前更合

煮石英服方

石英州者

右壹味打碎如小豆蕎麥許大去細末更於水中淘洗令淨重帛練袋盛之以繩繫頭取五大升清水於不津鐵鍋中煮之煮時石袋不用著鍋底恐沙石煎壞先以一枝橫鑊口挂石袋著杖上去底二三分許煮取一升汁置甕中經宿澄取清平旦空腹頓服之若以此汁煮稀粥服之亦佳每服後可行三五百步升飲三兩盡清酒又依前煮經二十度者石即無力可以布裹之埋於南牆下深三尺滿百日又堪用依前服之然終不如新者

服地黃石英酒作丸補益方

生地黃州者

石英州者

右以坩土鍋盛石英燒令極赤內著酒中去石以地黃內酒中浸之經二日出之暴乾復內酒中以酒盡為度惟留壹升

許江博地黃為末以壹升殘酒和末作丸熟搗為佳日二服
任食以意消息極押熱補益百無禁忌亦不發動秘之心膈
矣地黃取肥大者佳

牛乳養石英服方

石英二大兩 牛乳脂大 水壹大

右先下牛乳於鑊中即以生密絹四重作袋盛石英繫頭下
著乳中即勿令袋著底以扶則之為記訖然後下水以炭火
消消煮之水盡乳在還以前扶則之至刻即休出石袋以水
濯之其乳以綿濾之令接調適每朝空腹細細服之若患冷
氣宜加八顆昇散和煎之大善或以乳養弱嬰亦佳如具經
二十日服即停大補益身心服者乃自知之

紫石英

紫石湯主心虛驚悸寒熱百病令人肥健方

紫石英 乾薑 赤石脂

白石脂

右伍味皆完用石英等各取壹兩石脂等三味各取叁兩以
水三十升微火煎取二升宿物食分為四服日三夜一服至
午時乃可食日日依前秤取以昨日滓仍置新藥中其煮乃
至藥盡常然水數一準新藥大藥皆盡訖常添水煮滓服之
滿四十日止忌酒肉藥水皆大秤取汁亦大升服湯訖即
行在坐卧令藥力遍身百脉中行若患大冷者春秋各四十
九日服之冷疾退盡極須登青服之
論曰此湯補虛除固令其過於此但能用之有知及掌然後學
者謂是常方輕而侮之若一劑得差則止若傷多者令人太熱
復須冷藥押之宜審用之未可輕也

石英汁作薑鼓服方

白石英 臘大 肥豬肉 各斤

右以水捌升煮石英取五升量煮猪肉得爛熟為度取猪肉
汁下煮或切肉作薑鼓食之一劑可六七日與令盡一兩石
英二度煮之第一度全用第二度中破第三度搗碎煮之每
煮皆用昂練袋盛之石經三度即換新者一月以前八月以
後皆可作之

猪肚養石英服方

白石英 豬肚 生薑 切 生薑 切

人參 未各貳大兩 猪肚 切 葱白 切 新糯米 合

羊肉 半斤 細切 蜀椒 四十九顆 去

右壹拾味藥并石英袋內著猪肚中急繫口勿使洩氣及水
入以水二斗煮取八升即停以藥肚著盤上使冷然後破之
如熱破恐汁流出先出石袋訖取煮肚汁將作羹服之每半
三度服每服石英依舊餘藥換之分數一依初法每服隔一
兩日不用食木耳竹筴又人年四十以下服二大兩年四十
五十乃至六十以上加二兩常用四月以後服之者以石性
重服經兩月後石力若發即接入秋氣石力下入五藏腰腎
得力終無發理也

石英銅特牛取乳服方

白石英 大 亦得

右壹味藥細研經三兩日研了取壹特牛十歲以上養橫
者性瘦其佳每日秤一大兩石末和劉豆羹服經七日即得
取乳每日空腹熱服一升餘者作粥任意食之百無所忌以
五月上旬起服大良如急要亦不待時節終無發也其牛羹
糞地隨意種菜還供服乳人與之亦佳

石英糞地種菜食方

白石英 伍大斤以下亦可

右壹味搗研末如前取糞地種枸杞牛膝豆菜等食之大益人。

鍊白石英方

白石英 伍小兩為一劑

右壹味搗石英使碎著研鉢鉢中以水浸石濕遍不須多著水即研令細如粉訖更著水使石上厚半寸許攪之使渾渾定瀉澄水於一淨器中餘雜者乃更細研之還以水如前法以細為限最下者即是惡石不堪用棄之揔了又更一遍飛之了可著日中及物藉之安熱灰上即乾每以酒服二匕訖酒能使石不用和餘藥

服白石英粉方

白石英 伍多少並淨者

右研飛石如前成粉訖膏之不礫搗之入肉者為細不然不堪服以四兩為一劑取好白蜜和之分為二十一丸暴乾帛練袋盛之每先食三五匙梗米粥即含咽一丸令消細末以漱口咽之服訖須倍二十日將息不得食臭穢在長安日依此法服至春初頭痛額角如裂即服兩葉許紫雪立止者婆大士治人五藏六腑內萬病及補益長年不老方

紫石英 伍兩

白茯苓 伍兩

麥門冬 伍兩

防風 伍兩

芍藥

甘草 伍兩

右六味治擇搗篩為散麥門冬搗令如飴和散更搗十杵又內少許蜜更搗一千杵令可丸如梧子酒服七九日二服服之一年萬病皆愈二年骨髓滿實三年筋化為骨肉變為筋身輕目明除風去冷辟鬼神良服之不絕則壽年千歲不老不衰而致神仙然服忌慎須持五戒十善行慈悲心救護一

切乃可長生此等六藥應六時合陽養陰常須服之之有疾病者依檢六味之藥即合服之檢勘諸經此六味之藥相生如母子和也服之久久在人腹耳

五石腎氣丸治諸虛勞亦與前同治方

白石英

紫石英

鍾乳焙

赤石脂

禹餘糧

署預

遠志

細辛

茯苓

菟絲子

附子

海蛤

乾地黄

乾薑

桂心

五味子

白木

石解

杜仲

澤瀉

人參

續斷

牛膝

天門冬

蛇床子

桔梗

甘草

鹿耳

鹿耳

當歸

甘草

右三十一味

稍加至三十九以酒下佳

五石烏頭丸治男子五勞七傷諸積冷十二風痺骨節沉重四肢不舉食飲減少羸瘦骨立面目焦黑時時或腹內雷鳴勝脫常滿或下青黃經時不止婦人產後惡血不盡腹內堅強諸勞少氣百病間發或時陰腫或即脫肛及下出痰痛方
鍾乳 研 紫石英 研 白石英 研 白木 研 附子 研 烏頭 研 乾地黄 研 芍藥 研 麥門冬 研 山茱萸 研 天雄 研 龍骨 研 桂心 研 遠志 研 茯苓 研 禹餘糧 研 菟絲子 研 乾薑 研 桂心 研 五味子 研 白木 研 石解 研 杜仲 研 牛膝 研 天門冬 研 蛇床子 研 桔梗 研 甘草 研 鹿耳 研 當歸 研 甘草 研 右三十一味
乾地黄 七分 芍藥 五分 麥門冬 五分 山茱萸 五分 天雄 五分 龍骨 五分 桂心 五分 遠志 五分 茯苓 五分 禹餘糧 五分 菟絲子 五分 乾薑 五分 桂心 五分 五味子 五分 白木 五分 石解 五分 杜仲 五分 牛膝 五分 天門冬 五分 蛇床子 五分 桔梗 五分 甘草 五分 鹿耳 五分 當歸 五分 甘草 五分

雲母粉

甘草 炙各壹兩半

右參拾肆味。搗篩為末。鍊蜜和丸。如梧子大。酒服十九日。三不知增之。可至二十九。以心熱為知力也。

三石腎氣丸

鍾乳

白石英

赤石脂

禹餘糧

海蛤

乾地黃

石斛

白朮

桔梗

五味子

寄生

山茱萸

杜仲

牛膝

澤瀉

天門冬

蛇床子

當歸

人參

署預

遠志

細辛

菟絲子

茯苓

茯苓

附子

鹿茸

桂心

甘草

鹿茸

乾薑

桂心

右參拾味。搗篩為末。鍊蜜和丸。如梧子大。酒服十五丸。稍加至三十丸。日二。忌如藥法。

五石更上

治男子五勞七傷。虛羸者。不能治。服此無不愈。惟久病者。服之。其年少不識事。不可妄服。之明於治。理能得藥。通可服之。年三十勿服。或腎冷脫肛。陰腫服之尤妙。

紫石英 白石英 赤石脂 鍾乳

石硫黃

海蛤

防風

桔梗

白朮

人參

桔梗

細辛

乾薑

桂心

附子

細辛

右壹拾伍味。搗篩為散。酒服方寸匕。日二。中間節量。以意裁之。萬無不起。熱煩悶。可冷水洗面及手足。身體亦可渾身洗。若熱欲去。石硫黃赤石脂。即名三石。更生一方。言是寒食散。方出何侯。壹兩分作三薄。日移一丈。再服二丈。又服一丈。愈。治虛勞百病。癰疽。逆短氣。骨間有熱。四肢煩。

疾或腸鳴腹中絞痛。大小便不利。尿色赤黃。積時繞臍切痛。

急。眠眩冒。悶惡寒。風痺。食飲不消。消渴。嘔逆。胃中脅下滿氣。不得息。周體浮腫。彈重。不得屈伸。唇口青。手足逆。齒牙疼痛。痛。百病皆治。不可悉記。其良能。久服。則氣力強。壯延年益壽。

紫石英

白石英

赤石脂

鍾乳

石硫黃

海蛤

乾薑

白朮

海蛤

桔梗

乾薑

白朮

人參

桔梗

乾薑

白朮

黑附子

桂心

防風

右壹拾伍味。皆取真新好者。各異搗篩。已乃出散。重三兩。為一劑。分三薄。淨溫酒服。一薄。日移一丈。再服一薄。如

此三薄盡。須更以寒水洗手足。藥力行。者。彈便自脫。衣冷

水極。冷藥力盡。行。周體涼了。心意開明。所患即差。羸困者

床皆不終日愈矣。人有強弱。有耐藥。若人羸弱者。可先小

食。乃服藥。若人強。不須食也。有至三劑。藥不行者。若病人

有宿癖。宜先服消石大黃丸。下之。乃可服散。服藥之後。宜

牽發。若羸者。床不能行。者。扶起行之。常當寒食。寒臥。寒衣。

能極寒。益善。若寒藥未發。者。不可浴也。浴則於寒。使藥藥

不發。令人戰慄。當溫酒飲之。起跳。踊春。摩出。力。溫乃浴。解

則止。勿過多也。又當數令食。無晝夜。一日可六七食。若失

食飲。亦令人寒。從食。則溫矣。若老小。上氣及產婦。卧不能

起。頭不去巾。帽。厚衣。對火。若服藥之後。便去衣巾。將冷如

法。勿疑。虛人易治。與此藥相宜。實人勿服也。此藥雖良。令

人氣力兼倍。然其難將。隨大要在善。將。自。節。惠。寧。心。低。按

不可失意。當絕人事。惟久病者。床醫所不治。患厥病。精意

者乃可服耳。小病不能自勞者必廢失節。虞慎勿服之。若傷寒大下後乃可服之。便極飲冷水。若產婦中風身體強痛不得動搖者。使溫酒服一劑。因以冷水浴取差。已浴之後身有小痺。便以寒水浴。使周遍初得小冷。當小惡得水之後。自當快之。當數食飲酒於意復悄悄不可快者。當復冷水浴以病甚者。水略不去體也。若病偏在一處。偏煩偏熱。偏冷偏痺。及眩心腹滿者。便以冷水逐洗於水下即可矣。如此晝晝夜洗。藥力盡乃止。凡服此藥不令人吐也。病痛皆自冷。若膈上滿欲吐者。便鋪少冷食即安矣。服藥之後大便當變於常。或小青黑色。此藥功耳。勿怪之。若大溫欲吐不可禁者。當吐不可令人極也。明旦當更服。若洗浴晚者。藥必失勢不行。則冷不可強也。凡洗浴太早則藥寒。太晚則吐亂不可失適。寒則出力。乃溫洗吐則速令洗冷。食若以飢爲寒者。食自溫常。當將冷不可熱。向火若誤更衣。卧卽爲逆。凡服此藥食皆須冷。惟酒令熱自從。或一月而解。或二十日而解之。當飲酒令體中重。重不絕。當以淳酒。若飲薄酒及白酒。令人變亂。若病癰服者。重當更下。乃可服藥耳。

三石散主風勞毒冷補益諸病悉治之方

紫石英

鍾乳

白石英

白朮參兩半

防風

桂心

牡蠣煮半兩

桔梗 壹兩

細辛

茯苓

人參

附子去皮

枯樓

蜀椒

杜仲灸

乾薑各三兩

右壹拾陸味。擣伍千杵。酒服方寸匕。日三行百步。

更主世治男子女人宿寒虛羸骨節逆滿手足煩熱四肢不仁飲食不消身體疾病下寒下熱極著著床四五十服衆

藥不差此治萬病無不愈者悉主之方

鍾乳

白石英

海蛤

赤石脂

防風

各樓各

乾豐

白木

桔梗

細辛分各

人參

附子

桂心各參

右薑拾叁味皆須新好州土者搗篩爲散囊盛四兩爲八薄溫酒和服一薄須更起行隨力所往還欲坐卧隨意著衣乃卧適體中所便食時乃冷不得熟食只得大冷忌食猪肉羹臠湯麵不得房室諸禁忌之物皆不得食服藥後二十日復飲熟食及房室可漸隨意惟服藥時不得耳若頭面中憤憤者散髮風中梳百餘遍一日三飲五合酒訖日下晡湯便飲酒啜脯飯常令體中蕙蕙有酒熱手足煩熱可冷水洗之加硫黃卽卻新散也

服諸石藥及寒食散已過失節度發病療之法合四十

五條第三 論三首

論曰服石丸散及酒亦有單服黑石者既見未即有效謂不得藥力至後發動之日都不自疑是石不肯作石法將息乃作異治多致其患略述將息節度法如後

頭痛欲裂者。由熱食作癖故也。急下之。即差。

或惡食臭如死物氣由溫食作瘳故也急下之下不差仍

還冷食強行差

或兩目欲脫者。由犯熱在肝故也。急下之。自止。

或咽中痛鼻塞涕出者由衣厚近火故也但脫衣當風

取冷石熨咽嚥即止不須洗之

以腰痛欲折者。由衣厚體溫故也。宜水洗石熨。

大便難腹中堅如盤蛇由犯溫積久有乾糞不去故也

宜消飲蜜膏通寒濕服一二升津腹中即下若不可更下乃止

七或頭眩嗜欲蹶者由衣厚犯熱故也宜針頭冷水洗即止
八或淋下不得小便者由坐久下濕乘騎下熱入膀胱故也
但冷食飲冷水洗髮以冷石三兩度即止若不止可下之
不下殺人

九或脚疼欲折者由久坐下濕故也宜卧單床行役冷水洗
止

十或患寒頭掉不自支任者由食少氣行於肌膚五藏失
守百脉搖動與正氣競故也乃強飲熱酒以和其脉強食
冷飯以定其藏強行動以調其關即強洗以宣其擁滯酒
行衝通關機調柔則了了心明也

十一或腹脹欲死者由久坐下熱衣濕失食失洗不行故也
宜冷水洗當風取冷即差亦宜冷食

十二或失氣不可禁止者由犯熱不時洗故也但冷洗之即
差

十三或心痛如刺者由應食而不食應洗而不洗寒熱相擊
氣結不通聚在中心故也宜任性但飲熱酒令酒勢得行
氣息通達氣得已行以冷水淹布手巾著所苦處溫復易
之須臾自解仍速冷食能多為善諸痛之中心痛最惡急
宜速救之惟熱酒為善起於滯於血脉之中故當任力自
溫更以冷水洗即差

十四或遺糞不自覺者由下濕熱氣上入胃腹故也冷水洗
即止

十五或氣絕口噤不得開者由冷熱交競故也病者不自知
當須傍人救之要以熱酒灌之口中寒盛酒入必還出但

頻灌出復內乃至半日許得酒下差不可必死

十六或食便吐出不得安任者由脾故也急下之不下殺人
十七或小便稠數者由熱食及煎炙物餅果肉之屬故也
宜以冷水洗少服梔子湯差

十八或下部臭爛者由坐薦厚下熱故也坐冷水中即止

十九或耳鳴如風聲又有汁出者由自勞出力過度房室不
節氣上奔耳故也但數數冷食禁房室即差

二十或目痛如刺者由熱入胃肝脾眼故也但數數冷食清
旦以小便洗之二日即止

二十一或口中傷爛舌強而燥不得食味者由食少穀氣不
足藥氣積在胃管中故也以梔子湯三劑即止

二十二或脚指間生瘡者由著履襪太溫故也當復冷地冷
水洗之即止

二十三或手足偏痛諸骨節解身酸疼及瘡結核者由寢
處久不自移徙暴熱偏在一處故也若堅結極痛甚
者難發如覺便以冷水洗之冷石熨之飲熱酒散極熱數
日以冷水洗不絕乃差之無限要差為期若乃不差取
磨刀石如手許大燒令赤以投苦酒中石自裂細搗以冷
水和塗之日二三止

二十四或嗜卧不能自覺者由久坐熱悶故也急起冷水洗
冷食自差

二十五或夜不得眠者由食少熱在內故也服梔子湯冷食
止

二十六或飲酒不解食不得下下寒下熱不洗便熱洗之復
又寒甚者數十日輕者數日晝夜不得寢息愁悲志驚
悚恐懼恍惚忘誤者由犯溫積久寢處未即食熱作癖內

實便熱與藥併行寒熱交競故也雖以法救之終不解也昔皇甫謐曾如此對食藥湯援刀欲自割未及得施賴叔親見迫事不得行退而自思乃努力強食飲冷水先即止禍不成矣當困時舉家親知莫能救解賴三兄士元拔方得三黃湯令服大便下即差自此常以救以急也

二十七或脫衣便寒者衣便熱者由脫著之間無適故也當小寒便著小熱便脫又洗之則醒勿忍不依此者便發病也

二十八或兩腋下爛由兩臂相近故也以物隔之冷水洗之冷水敷之止

二十九或嘔逆咽中傷損清血出者由卧溫食熱故也飲冷水冷水石敷咽即止

三十或鼻中有氣如斷雞子鼻者由熱衣溫食故也但脫衣冷食冷水洗即止

三十一或齒齦腫爛牙疼煩噪者由犯熱不時解故也但當對風張口使冷水入咽熱冷水漱口三度叩齒三十六通止

三十二或遍體患腫痛不能自轉徙者由久停久息久不飲酒藥氣沈在皮膚之內血脈不通故也但飲熱酒冷水洗自能行差若極不能自行使人扶強行令服節調香乃止

雖行又不得令過過則失度熱復洗之要者酒為佳

三十三或目暗無所見者由飲食熱居處太溫故也但冷食冷水洗脫衣目自明也

三十四或下痢如寒中者由食飲犯熱所致故也人多疑是卒疾又帶瘕作者皆由犯熱所為慎勿疑也速脫衣冷食飲熱酒即差

三十五或百節酸疼者由厚衣被溫故也但卧單床薄被著單故衣差雖冬寒常須帶髮受風冷石敷若犯此者但緩衣帶冷浴勿及病而與浴也

三十六或競戰惡寒或發熱如溫瘧者由失食忍飢失洗不行又由食具穢故也急冷食冷水洗之數行止

三十七或關節強直不可屈伸者由厚衣坐久停息不煩勞藥氣不散漸侵筋血故也當任力自溫便以冷水洗飲熱酒差令行動出力使勞發熱非厚衣近火又仍不遍則失度熱復洗差

三十八或患食冷不可下者由久食冷口中不知味故也當作白糜酒和酥熱食一兩度若熱悶者還冷食飲止

三十九或傷寒溫瘧者由犯熱故也亦可以常藥治之無咎但勿服熱藥傷寒瘧疾皆除熱破瘧不與寒食相妨可通服也

四十或藥發輒脫卧不識人者由熱氣盛食少不充邪忤正性故也但飲熱酒冷食冷水洗自勤勞以水淹布巾蓋頭溫易之仍自差

四十一或肌肉堅如木石不可屈伸者由食熱因溫作瘕久而不下五藏隔閉血脈不通故也但下須冷食冷飲冷水洗自勞行差

四十二或四肢面目皆浮腫者由食溫久不自勞藥與正氣相隔故也但飲熱酒冷飲自勞行洗差止

四十三或身內痛楚終轉不在一處如似遊風者由犯熱故也非是風宜冷水洗冷水石敷即止

四十四或寒熱累日張口吐舌眼視高睛不與人相當日用水百餘石洗差不解者由不能自勞行飲冷酒食熱故也

譬如喝人心下更寒以冷水救之愈劇者氣結成冰再熱
便飲則冰消氣通喝人乃解藥氣聚心乃更寒宜急飲
熱酒令四肢通暢然後以冷食冷水洗之即止

四十五或臂脚偏急痛由坐卧溫處不移徙熱入腹附骨
故也當以冷水淹布巾以搏之溫即易之不過三日止

右凡服石之人有病要須先以解石法消息之若不效者
始可用餘方救之前所列凡四十五條元是服石九散

違失節度發病由狀亦有消息得差者今之世人多有
單服鍾乳鑿石桃花石紫石亦有會和草藥服之此等

雖非五石亦是五石之例至於將息慎忌然發動病由
消息損益亦同例人既見單石而不稱意乃便輕之惟

以散散及至發動乃致困危其服單石者理宜將息若
違犯禁忌但看病狀與上微同者依前法消息必定痊

除

論曰服石發動將息事雖衆多指而言者要當遵人理反
常性可依易者將息所謂六反七急八不可三無疑

言六反者
重衣更寒二反 飢則生食二反 極則自勞三反

溫則濡溺四反 飲食當寒五反 腫瘡水洗六反

言七急者
當洗勿失時急 當食勿飢急 酒必清薄熱三急

衣溫便脫四急 食必須冷五急 食不患多六急

卧必底薄七急

言八不可者
冬寒欲火一不可 飲食欲熱二不可

千金翼方 卷二十二 飛鍊

極不欲行五不可 飲食畏多六不可
居食重席七不可 所欲從意八不可

言三無疑者
務遵常理一無疑 委心棄本二無疑

寢處必寒三無疑

右凡服石之人若能依此六反七急八不可三無疑者雖
不得終斷此疾復常無病可以清旦暮之暴也

解石及寒食散并下石第四論六首

論曰凡是五石散先名寒食散者言此散宜寒食冷水洗取
寒惟酒欲清熱飲之不爾即百病生焉服寒食散但令將息

即是解藥熱實大盛熱服二黃湯也

治石發動上氣熱實不解心腹滿小便赤大便赤不利
痞逆衝胃口中焦燥目赤方

大黃 壹兩 黃連 黃芩 芒消 甘草 各

右伍味以水伍升煮取二升半再服凡用大黃芒消
臨湯熱內之

治石發熱舊小三黃湯殺石熱勝前方除實不及前方

大黃 黃連 黃芩 枳實 枳殼 芍藥 各

右肆味以水六升先煎藥數沸後內枳實取二升分
二服取差止

治熱殺石氣下去實兼發汗解肌中風熱氣湯方

大黃 黃連 黃芩 枳實 枳殼 芍藥 各

右陸味以水九升煮取五升內諸藥煮取四分
內散三滿分三服得下止

湯方

黃芩貳兩

梔子貳兩

蔥白壹握

豉續裹

右肆味咀咀以水柒升。煮取三沸。去滓。內諸藥。煮取三升。分二服。不止。更爲之。

治虛勞下焦有熱。骨節疼痛。肌急內痞。小便不利。大便數而少。吸吸口燥。少氣折石熱湯方。

大麻子貳合

去皮

豉續裹

右貳味。研麻子。碎以水四升。合煮。取一升五合。分三服。服三劑。即止。

大黃湯。治石發煩熱。脹滿。身生瘡。年月深久。治不差者。石虛熱生瘡方。

大黃叁兩

麥門冬壹兩

梔子貳兩

黃芩

芒消

甘草貳兩

右陸味咀咀以水七升。煮取二升五合。分爲五服。得下止。治石發熱。熱結生腫。堅起。始作腫。宜下之。升麻湯方。

升麻

枳實貳兩

芍藥

大黃貳兩

當歸

黃芩各壹兩

右陸味咀咀以水捌升。煮取二升。分三服。得下。腫消。上熱甚。倍加黃芩。一方有甘草一兩。

治石發熱。盛變作癰腫。初欲成。急治之方。

石燕子柒枚

右壹味。以水三大升。煮之。取二升。數用淋洗之。以差爲度。治石發頭痛。背脹滿。或寒或熱。手足冷。或口噤。或口爛。生瘡。乾燥。惡聞食氣。前胡湯方。

前胡

芍藥

黃芩

大黃

甘草貳兩

大棗貳枚

右陸味咀咀以水八升。煮取二升五合。分三服。若心骨堅滿。加茯苓三兩。背滿塞。加枳實一大兩。灸連吐背。中冷不飲食。加生薑三兩。胃虛口燥。加麥門冬三兩。去心。尼欲加藥者。則加水一升。

治石發身如火。燒漸邵黃芩湯方。

黃芩

枳實貳兩

梔子貳兩

枳殼

厚朴貳兩

芍藥

甘草貳兩

右柒味咀咀以水七升。煮取二升五合。分三服。治石毒。或十年二十年三十年而發者。或標標如寒。或飲食或不欲食。若服紫石英發毒者。熱閉。滑滑喜。起上無氣力。或寒皆肺氣所生。藏氣不和。若石發熱者。燥而戰。石疏黃發熱者。變變如熱極者。身並破裂。華佗黃芩湯方。

黃芩

枳實貳兩

梔子貳兩

枳殼

厚朴貳兩

芍藥

甘草貳兩

枳殼

黃芩

枳實貳兩

梔子貳兩

枳殼

人參

藍子

黃芩

甘草貳兩

右捌味咀咀以水壹升。煮取二升。分三服。得下。治石發熱。取二升五合。分三服。若虛弱者。倍人參。減黃芩。若氣上倍。

茯苓

芍藥

甘草貳兩

枳殼

黃芩

枳實貳兩

梔子貳兩

枳殼

治桃花石發。即心噤。身壯熱。頭痛。覺者。溫清酒飲之。隨多少。酒熱行。即差。亦可服大麥。變不解。服此麥奴湯方。

大麥奴

麥門冬

甘草

枳殼

黃芩

枳實貳兩

梔子貳兩

枳殼

右陸味咀咀以水八升。煮取三升。去滓。分溫三服。若無麥奴。以麥三升。淨淘洗。先煮。使熟。去滓。添水滿八升。然後內諸藥。煮取三升。分三服。

治一切雜石發動方。

麥門冬

人參

甘草

枳殼

右參味博節為末鍊蜜和九如彈丸。一服三九忌如前法
治心胃肝熱方

人參

黃芩

梔子

麥門冬

桂心

甘草

右參味切以水六升。煮取二升分三服

治熱折石皇甫梔子湯方

梔子

黃芩

豉

右參味咬咀以水六升。煮取三升去滓。內豉煮取二升分
二服

治石發煩熱脹滿。身體生瘡。年月久遠者。黃治諸藥乳石發
動方

麻黃

甘草

灸各壹兩

右貳味咬咀以水二升。煮取半升。內清酒五合。煎取軟一
升。其患者先須火邊炙令熱微欲汗。因即熱服之。令盡溫
覆。須臾大汗出。即差

治一切石熱發方

但飲淳美熱清酒。冷食自勞。冷洗差

治乳石痢及常服壓石方

取好豉沙令黃香。待冷攪餅。心未熟更炒待冷還攪。若
心熟皮即焦苦。所以須再炒。日別空腹再服二大匙。以
冷水服之佳

治石痢方

淡煮真好茶汁。服二三升。重者三服。輕者一二服。即差
解散。石發動諸藥不治。單服酒豉方

清美酒

壹升

好豉

生白糯米

右貳味和羹三五沸。熱飲壹升。使盡大良

治一切石發單方

痛生冬瓜汁三升分為三服

治癰石發單方

煮葱白汁服亦解

單煮枳白皮汁服亦解

單煮胡荽汁服亦解。又煮根飲之

單煮薤白汁飲亦解

解散熱消最良方

葱白不過一斤

胡荽

薤白

枸杞

不越半斤。皆單煮取汁飲之

又單煮肉汁服解大散良

豬膏

解大散方

右貳味以水三升。煮取汁一升。內豬膏服之。合日三服

石人飲宜清冷。不宜熱。熱即氣難。石惟酒一種須熱也

若為食者。米臭肉動。乳者。必須葱豉湯細細服之。可立五六
度即差

若食飲損者。於葱豉湯中。內當歸一兩。煮之。去滓。分溫三服

便差。仍未除者。可作後薑根湯服之方

薑根

地榆

五加皮

各壹兩

右參味咬咀以水三升。煮取一升。去滓。一服。即差。此湯力
快。小可者。不須服之

若得四時節氣。冷熱不調。動乳者。皆是寒熱所致。其狀似腫

久久不瘳。令人傾命。縱服諸藥。必終不差。必須作生熱湯。以
冷之方

以大器盛湯。若大熱。投少冷水。即入湯中。坐勿動。須臾

百節開寒熱之氣皆從毛孔中出變作流汗若心中熱悶者還服少許熱湯即定良久乃出湯便厚衣覆蓋卧然覺醒平復如患大重者不過三二度即差

人參湯 解散數發動煩悶嘔逆

人參 白朮 枳椇 甘草 黃芩 薑 二升 五味咬咀以水七升煮取二升去滓分爲三服溫服

治服石及散發背癰疽方
取烏豆二升水六升煮令稀稠如薄餹量減取三大合匙抄細細內患人口中審聽腹中作聲如欲利即停須臾必利利後即差忌熱食陳臭等

治石氣發身腫微腫面上瘡出方

紫雲 湯成下 黃芩 各二兩 姜 二升 麻 各壹兩半

治石氣發身腫微腫面上瘡出方

右桑葉咬咀以水五升煮取一升八合絞去滓內紫雲分

溫三服每服如人行六七里又服利三行爲度仍用後方

塗瘡忌熱麪猪肉海藻等

治石熱面上生瘡方

取寒水石以冷水於白瓷鉢中研令汁濃將塗瘡乾即

點之勿令停

治諸石發動口乾寒熱似鬼神病方

麥門冬 大黃 苦參 各等分 姜 二升 麻 各壹兩半

升麻 各壹兩 黃芩 二升 麻 各壹兩半

右壹拾貳味搗篩爲末鍊蜜和丸如梧子每食訖少時以

蜜水服十四丸漸稍加至二十九以意加減忌諸熱食及

海藻猪魚多肉蒜麪等

治石等毒發熱困苦方

猪脂 成鍊 葱白 伍合 芒消 壹兩 豉 壹兩

右肆味以水二升煮葱白取一升五合絞去滓下猪脂芒

消分溫三服每服如人行三四里進一服快利爲度忌熱

麪及炙肉蒜粘食陳臭等物

黃芩湯 治石發因不可解者方

麻黃 貳兩 枳椇 枳實 香豉 壹升 甘草 壹兩半

右肆味咬咀以酒伍升漬一宿加水二升煮取三升一合

分三服忌如藥法

又方

大黃 別置 黃芩 甘草 各貳兩半

右叁味咬咀以水五升煮取二升分溫三服

治金石發熱及諸熱消丸方

朴消 成鍊者壹斤

右一味研令成粉以白蜜和調作丸如梧子每食訖以蜜

水服三十九服金石經年以來覺身中少熱即以丸壓之

每至夜欲卧時服三十九或至四十九取胃腸涼冷爲度

此用之極有效若有時患及發者即取一大匙粉和水服

之空腹服之得一二兩行利即差如不利加服之以利爲度

凡朴消取不著風者黃者殺人赤者傷人白者爲佳

又方是藥冷熱俱治押石主大秘瀝

凡朴消煮麥子汁和服一大兩半有芒鈹者亦煮赤

眼用水服後子量六

治女子先因月經不通研生石服即今見患胃熱衝頭面

腰膝冷極宜服此方

茯苓 姜 二升 麻 各壹兩半

大黃 別置 生薑 各兩 大棗 各壹兩

石膏六兩 芍藥 黃芩 人參

芒消二兩 甘草二兩

右壹拾壹味切以水一斗煮取二升八合去滓分三服每服相去如人行十里又進之快利五行以來病即差忌生冷熱麪猪魚蒜等

治石發動心胃熱毒萎蕤湯方

萎蕤 黃芩 乾薑 生薑各二兩

政諸大台 芍藥 升麻 黃連

柴胡略 枳實 石膏二兩 芒消二兩

右一十二味咬咀以水一斗五升先煮石膏減一升次下諸藥煮取二升八合去滓下芒消攪令散分溫三服每服相去如人行十里進之利五六行當自止忌如前

治石發熱困宜下石方

露蜂房燒升

右壹味切以水三升煮取一升一服五六合日二服石從小便下如細沙盡停無所忌

又下石方

萎蕤 升麻 薤白 人參略

大黃二兩 黃芩 葛根 紫草略

犀角兩 枳實 芒消二兩 銀屑二兩

猪脂五斤 露蜂房燒升 甘草二兩

右壹拾陸味切以無灰酒八斗煮經十日其猪脂用酒一升煎鍊取三兩脂與銀屑和研內藥中每日空腹服之量

力多少忌熱麪炙肉海藻等

治發背竹葉黃湯方

淡竹葉 黃芩 前胡 生薑略

右壹拾伍味咬咀以水一斗煮取二升八合去滓分三服每服相去如人行十里又進之快利五行以來病即差忌生冷熱麪猪魚蒜等

治石發熱困宜下石方

露蜂房燒升

右壹味切以水三升煮取一升一服五六合日二服石從小便下如細沙盡停無所忌

又下石方

萎蕤 升麻 薤白 人參略

大黃二兩 黃芩 葛根 紫草略

犀角兩 枳實 芒消二兩 銀屑二兩

猪脂五斤 露蜂房燒升 甘草二兩

小麥一斗 黃芩 茯苓 枳實二兩 麥門冬二兩

枳實二兩 麥門冬二兩

右壹拾伍味咬咀以水一斗六升先煮竹葉小麥取一斗

二升去竹葉麥內諸藥煮取四升一服一升日二夜一

治男子癰始欲發背不甚往來寒熱竹葉黃湯方

淡竹葉 小麥略 黃芩 升麻 乾地黃

芍藥 黃芩 通草 知母二兩 大棗二兩

黃芩二兩 生薑二兩 茯苓 芒消二兩

枳實二兩 麥門冬二兩 甘草二兩

右壹拾捌味咬咀以水壹斗柒升先煮竹葉小麥取壹斗

貳升去滓內諸藥煮取肆升分溫伍服日三夜二忌如藥法

治癰發背諸客熱腫始作竹葉湯方

淡竹葉 小麥略 生薑二兩 太棗二兩 茯苓

麥門冬二兩 枳實二兩 芍藥 人參略 黃芩

前胡 乾地黃 升麻 射干 黃芩

右壹拾柒味咬咀以水一斗七升先煮竹葉小麥取一斗

二升去滓內諸藥煮取四升分五服若熱盛秘澀不通者

加大黃二兩已下勿加也

治患大熱癰發發難或在於背或在陰處生地黃湯方

生地黃二兩 竹葉二兩 小麥一斗 枳實二兩 大黃二兩

人參 當歸二兩 黃芩 黃芩 通草

升麻 芍藥 前胡 茯苓 甘草二兩

右壹拾伍味咬咀以水二斗煮取一斗二升去

滓內諸藥煮取四升分四服日三夜二不愈常服

千金翼方 卷二十二 飛錄

二六九

治發背黃耆湯方

黃耆

黃芩

麥門冬

遠志

各二兩

大棗

人參

芍藥

乾地黄

芍藥

當歸

生薑

桑螵蛸

雞臍

雞臍

右壹拾參味咬咀以水一斗先煮雞臍臍令熟可食去之內諸藥更煮取四升五合分服九合日三夜

治發背黃耆湯方

黃耆

麥門冬

芍藥

黃芩

人參

甘草

石膏

當歸

半夏

生薑

生地黃

大棗

淡竹葉

切

切

右壹拾參味咬咀以水一斗先煮竹葉取九升去竹葉內諸藥更煮取三升分四服如人行二十里又服良久進粥消又進消息

消又進消息

甘草

炙

各壹兩

右壹拾參味咬咀以水一斗五升先煮竹葉去竹葉內諸藥更煮取三升五合分四服日三夜

治癰腫黃耆湯方

竹葉

小麥

生薑

乾地黄

桂心

大棗

芍藥

甘草

乾地黄

茯苓

升麻

當歸

甘草

乾地黄

茯苓

右壹拾參味咬咀以水一斗七升煮小麥竹葉取一斗一升去竹葉內諸藥更煮取三升五合分四服如人行七八里再服

治男子發背助結塊氣或經一月苦寒熱枳實湯方

枳實

芍藥

乾地黄

前胡

黃芩

通草

知母

芍藥

右壹拾參味咬咀以水一斗七升煮小麥竹葉取一斗一升去竹葉內諸藥更煮取三升五合分四服如人行七八里再服

治發背黃耆湯方

黃耆

黃芩

麥門冬

遠志

各二兩

大棗

人參

芍藥

乾地黄

芍藥

右壹拾參味咬咀以水一斗先煮雞臍臍令熟可食去之內諸藥更煮取四升五合分服九合日三夜

治發背黃耆湯方

黃耆

麥門冬

芍藥

黃芩

人參

細辛

茯苓

黃耆

人參

甘草

各二兩

右壹拾參味咬咀以水一斗一升煮取三升五合去滓分四服

治發背虛熱大盛腫熱侵進不住內補湯方

乾地黄

升麻

當歸

人參

芍藥

大棗

生薑

麥門冬

芍藥

大棗

黃芩

黃芩

遠志

茯苓

大黃

黃芩

黃芩

黃耆

黃芩

麥門冬

芍藥

大棗

黃芩

右壹拾參味咬咀以水一斗三升煮取五升去滓分爲五服

治發背黃耆湯方

生地黃

黃耆

黃芩

茯苓

芍藥

甘草

大棗

芍藥

當歸

通草

甘草

甘草

人參

當歸

通草

甘草

甘草

甘草

右壹拾參味咬咀以水一斗三升先煮竹葉取一斗五升去滓內諸藥更煮取四升去滓分五服

治發背癰腫服生地黄黃湯取利後服此方

黃耆

芍藥

乾地黄

枳實

枳實

枳實

小麥

黃芩

柴胡

麥門冬

淡竹葉

切

遠志

升麻

當歸

當歸

淡竹葉

切

大棗

升麻

當歸

當歸

淡竹葉

切

右壹拾參味咬咀以水一斗八升先煮竹葉小麥取一斗一升去滓內諸藥更煮取三升去滓分三服日三

治癰節近肺愈此多虛故不宜用大黃若欲得下但其間數服此方

黃芩

前胡

枳實

芍藥

芍藥

芍藥

麥門冬

知母

乾地黄

淡竹葉

切

切

右壹拾參味咬咀以水一斗八升先煮竹葉小麥取一斗一升去滓內諸藥更煮取三升去滓分三服日三

治癰節近肺愈此多虛故不宜用大黃若欲得下但其間數服此方

黃芩

前胡

枳實

芍藥

芍藥

芍藥

麥門冬

知母

乾地黄

淡竹葉

切

切

小麥壹升 黃耆 升麻 甘草炙

右壹拾貳味咬咀以水一斗八升先煮竹葉小麥取一斗

去滓內諸藥煮取四升去滓分爲四服日三夜一

治背脊癱節舉身壯熱已行薄貼此方數用有驗連翹湯方

連翹 漏蘆 射干 白欬

升麻 梔子 芍藥 羚羊角屑

黃芩各 生地黃兩 寒水石兩 甘草各

右壹拾貳味咬咀以水一斗煮取四升去滓分四服

治大虛客熱發背上苦牽痛微有腫脹氣來去黃耆湯方

黃耆 乾薑 當歸 桂心各

大棗各 麥門冬各 芍藥各 半夏各

生薑各 人參 芎藭 甘草各

右壹拾貳味咬咀以水一斗二升煮取四升去滓分五服

日三夜二

治癰發背及在諸處竹葉黃耆湯方

竹葉切 黃耆 芍藥各 當歸各

大黃各 升麻 黃芩 前胡

知母 麥門冬各 甘草各

右壹拾壹味咬咀以水壹斗七升煮取九升去滓下

諸藥煮取二升八合分三服利兩三行佳也

治癰發背內補芍藥湯方

芍藥 乾地黃 桂心 當歸各 生薑各

黃耆各 茯苓 人參 麥門冬各 甘草各

右壹拾貳味咬咀以水一斗煮取三升分三服

治發背腫即驗前胡建中湯方

前胡 生薑 茯苓 黃芩各

桂心壹兩 人參壹兩 當歸 芍藥

右壹拾壹味咬咀以水壹斗煮取四升分四服

治癰發背漏蘆湯方

漏蘆 白欬 黃芩 芍藥 枳實各

白薇 甘草各 大黃 別頭黃耆各 升麻各

右壹拾貳味咬咀以水一斗先煮麻黃去上沫然後下諸藥

煮取三升分三服

治男子背脊上發腫時覺牽痛內補黃耆湯方

黃耆 當歸各 乾地黃 麥門冬各

生薑各 大棗各 芍藥 芎藭

人參 甘草各

右壹拾貳味咬咀以水一斗煮取三升五合分服七合日三

治發背黃耆湯方

黃耆 乾地黃 茯苓 大棗各

芍藥各 生薑各 當歸各 人參

甘草各

右玖味咬咀以水壹斗貳升煮取肆升分肆服日三夜一

加黃芩貳兩佳

治腫癰發背芍藥甘草湯方

芍藥 乾地黃 黃耆各 甘草各

人參各 茯苓 麥門冬各 生薑各

右捌味咬咀以水八升煮取二升五合分三服

治毒腫發背黃耆湯方

黃耆 白欬 玄參 黃芩

大黃 甘草各 竹葉各

右桑味咬咀以水九升。煮取三升分三服。一日令盡。忌豬肉。
治癰腫始覺即令消。其腫五色。並為發背。痛欲死。腫上加灸。
不差腹內虛悶。麥門冬湯方。

麥門冬法兩升麻

葛根各參丁香精兩

零陵香略藿香略

右桑味咬咀以水九升。煮取二升五合分三服。

治發背初欲作腫及癰。便服此方。

大黃別浸黃芩

甘草炙升麻貳兩

施子貳兩

右伍味咬咀以水九升。煮取三升五合去滓。分三服。得快

下數行利便止。不下更作。

治發背腫如杏核。雞子青木香湯方。

青木香貳兩麻黃法節各升麻參兩

右桑味咬咀以水六升。煮取二升。去滓。分參服。一日令盡。

暖卧取微汗。避風。以粉粉身。

治癰發背升麻湯方。

升麻參兩

右壹味咬咀以水三升。煮取一升。分三服。昔何道靜母在

建安夜得發背。至曉半臂黑。上熱如火。噓吸煩悶。時無三

兩升麻。惟一兩以水三升。煮得一升如上法。一服覺如小

寬。再服熱差。乃得眠。至暮服盡。轉佳。明日視背色還復遂

愈也。

瘡癰上

黃父相癰疽論第一

九江黃父相癰疽論黃帝問於岐伯曰余聞腸胃之氣上焦出氣以溫分肉而養骨節通腠理中焦出氣以養五臟上注於谷而養脈中之氣下焦出氣以養骨髓此三者皆謂之氣血也乃注於經脈陰陽已張因息乃行行有綱紀周有道理與天合同不得休止切而謂之從虛去實寫則不足疾則氣減留之先後從實去虛補則有餘血氣已調形神乃持余已知血氣之平與不平未知癰疽之所從生成敗之時死生之期或有遠近何以度之可得聞乎岐伯曰經脈流行不止與天同度與地合紀故天宿失度日月薄蝕地經失紀水道流溢草薺不成五穀不植徑路不通民不往來巷聚邑居別離異處血氣猶然請言其故夫血脈榮衛周流不休上應星宿下應經數寒氣客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫也寒氣化為熱熱勝則肉腐肉腐則為膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空骨空不得洩瀉則筋骨枯虛枯虛則筋骨肌肉不相登離經脈敗漏重於五藏癰傷故死矣

診癰疽發起要第二方一首

黃帝曰癰疽之形與忌日名岐伯曰略說癰疽極者有十八種

癰發於中名曰狂疽不急治則化為膿膿不瀉則爛肉而死其化為膿者膿瀉已則含家膏無食三日已發於頸名曰天疽其粗大而赤黑不急治則熱氣下入脾肺前傷任脈內熏肝肺則十餘日而死

陽氣大發消腦流項名曰腦癰其色不紫一作項痛如刺以鍼心煩者死不可治

發於背及脇名曰疵疽其狀赤黑不急治此令人汗出至地不害五藏發四五日逆燒之佳是

發於腋下一赤堅者名曰朱疽治之用灸五壯而後去之達以家膏六日已勿衰其疽堅而不潰者為馬刀瘡則急治之

發於臂名曰井疽其狀如大豎三四日起不早治下入腹中不治七日死

發於臍名曰井疽其狀如穀實瓜棗常苦寒熱急治之去其寒熱不治十歲死死後膿自出

發於脅名曰改營改營者女子之病也久之其狀大癰膿其中心乃有生肉大如赤小豆治之方

坐陵癰草及根各一斗以水壹斗陸升煮取貳升即服飲厚衣坐釜上令汗出足已

發於股肱名曰股脫疽其狀不甚變色癰膿內搏於骨不急治三十日死

發於股陰名曰赤弛不急治六十日死在兩股內者不治發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死

發於膝名曰批疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石之石之即死須其色黑赤乃石之生也

諸癰發於節而相應者不可治也

發於陰者二十日死

發於陰者二十日死

發於膝名曰兔齧其狀如赤丘至骨不急治殺人發於踝名曰走緩其狀色不變數石其輪而止其寒熱不死

發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治百日死

發於足傍名曰癰疽其狀不大初從小指發急治之去其黑

者不消輒益不治百日死

發於足指名曰脫疽其狀赤黑則死不赤黑不死治之不衰

急斬去之活也不斬去者死

黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯曰榮氣稽留於經脈之

中則血泣而不行不行則衛氣歸之歸之而不通壅遏不得

行故曰熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷肌

膚於骨髓骨髓不為焦枯五藏不為傷故命曰癰何謂疽

曰熱氣純盛下陷肌膚骨髓骨肉內連五藏血氣竭盡當其

癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者其上皮天癰以堅如

牛領之皮癰者其上皮薄以澤此其候也帝曰善

帝曰有疽死者奈何岐伯曰身有五部伏兔一腓一脛一

二五藏之輸四項五五部有疽死也

帝曰身形應九宮奈何岐伯曰謹言身形應九野

左足應立春其日戊寅巳丑

左臂應春分其日巳卯

左手應立夏其日戊辰巳巳

膺喉頭首應夏至其日丙午

右手應立秋其日戊申巳未

右臂應秋分其日辛酉

右足應立冬其日戊戌巳亥

膺尻下窮應冬至其日壬子

六府及膈下二藏應中州大禁太一所在此日及諸戊巳也

凡候此九者善候八正所在之處所主左右上下身體有癰

腫者欲治之無以其所直之日潰治之是謂天忌日也

凡五子日夜半

五卯日日出

五午日正中

五酉日入

五丑日雞鳴

五辰日食時

五未日日昃

五戌日黃昏

五寅日平旦

五巳日禺中

五申日晡時

五亥日人定

右以此日時遇發癰者不起也

候癰疽色法第三

論曰夫癰疽初發如微人多不以為急此實奇患惟宜速治

之治之不速病成難救以此致禍能不痛哉且述所懷以悟

後賢謹按黃父癰疽論論癰所者緩急之期如左

發皮肉淺腫高而赤貼即消不治亦愈

發皮肉深腫下而堅其色或青黃或白黑或復微熱而赤宜

急治之成消中半發附骨者或未覺肉色已缺已缺者癰疽

之甚也

發背外皮薄為癰皮厚為疽如此者多見先兆宜急治之皮

堅甚大者多致禍也

夫癰壞後有惡肉者當以猪蹄湯先去穢次傳食肉膏散惡

肉盡乃傳生肉膏散及摩四邊令善肉速生當絕房室慎風

冷勿自勞動須筋脈平復乃可任意耳不爾新肉易傷傷則

重潰發則禍至慎之慎之

診知是癰疽法第四

癰疽之發未辨是非飢渴為始始發之時或發白瘡或似小

節或復大痛或復小痛或發米粒大白膿子皆具微低且善

察之欲知是非重按其處是即便隱痛復按四邊此方得失

審實之是即灸第一便灸其一二三百壯又灸四邊一二百

壯小者灸四邊中者灸六處大者灸八處壯數不慮多也亦

應即薄貼令得即消內須服解毒冷藥令毒氣出外外須薄

貼熱法當發開其口令洩熱氣故也

診癰疽有膿法第五

凡癰疽之大堅者未有膿半堅半軟者半有膿當上薄者都有膿有膿便可破之不爾侵食筋骨也

破之法應在下逆上破之今膿易出用銀針膿深難見由厚而生者用火鍼若不別有膿者可當其寸數按之內便隱痛破堅者未有膿洩去熱氣不爾長速則不良

候人年得疽法第六

岐伯曰赤疽發於額不寫十餘日死可刺也其膿赤多血死未有膿可治人年二十五 三十一 六十 九十五人神在額不可見血見者死

好疽發項若兩耳下不寫十六日死其六日可刺其色黑見膿而癰者死不可治人年十九 二十三 三十五 四十

九 五十一 五十五 六十一 八十七 九十九神在兩耳下不可見血見者死

蜂疽發背起心俞若有鵠二十日不寫死其八日可刺也其色赤黑膿見者死不治人年六歲 十八 二十四 三十五

五十六 六十七 七十二 九十八神在背不可見血見者死

刺疽發肺俞若肝俞不寫二十日死其八日可刺發而赤其上肉如椒子者死不可治人年十九 二十五 三十三

四十九 五十七 六十八 七十三 八十一 九十七神在背不可見血見者死

俠癰疽發背起若兩肘頭二十五日不寫死其九日可刺發赤白間其膿多白而無赤可治人年十六 二十六 三十二

四十八 五十八 六十四 八十九 九十六神在背不可見血見者死

勇疽發股起太陰若伏菟二十五日不寫死其十日可刺發青膿赤黑者死白者尚可治人年十一 十五 二十一 三十一 四十三 四十六 五十九 六十三 七十五 九十一神在尻尾不可見血見者死

標疽發熱同肩髃後六十日腫如水狀如此可刺之但出水後乃有血血出即除也年五十七 六十五 七十三 八十九 九十七神在背不可見血見者死

旁疽發足跌若足下三十日不寫死其十二日可刺發赤白膿而不多其大上痒赤黑死不可治人年十三 二十九 三十五 六十一 七十三 九十三神在足不可見血見者死

相五色疽死生法第七

禽疽發如軫者數十處一云四日腫食飲疼痛其狀若錢半日可刺其內發方根寒齒如嚙俞若坐如是十五日死

釘疽發兩有此起有所逐惡血結流內外榮衛不通發為釘症三日身腫痛甚七日嚙如瘡狀十日可刺不治二十日死

陰疽發背若陰股始發膏肓內不能自止數飲不能多五日堅痛如此不治三歲死

脉疽發環項一云始痛身隨而熱不欲動惰惰或不能食此有所大畏恐怖而不精上氣欬其發引耳不可以腫二十日可刺不刺八十日死

龍疽發背起胃俞若腎俞二十日不寫死其九日可刺其上赤下黑若青黑者死發血膿者不死

首疽發背發熱八十日大熱汗頸引身盡如蚊身熱同如沸者皮澤頭腫處淺刺之不刺入腹中二十日死

行疽發如腫或復相往來可要其所在刺之即愈

衝疽發小腹脹而振寒熱冒五日消消六日而變 十日死

發癰兩指頭若五指頭十八日不寫死其四日可刺其發而黑癰大者亦過即治

瘰癧發下若臂兩掌中振寒熱而咽乾者飲多則嘔煩心煩者少飲及有合者此則可汗不汗當死

筋疽發背俠脊兩邊太肋其色蒼八日可刺其癰在肌腹中九日死

陳乾疽發兩臂三四日痛不可動五十日方身熱而赤六十日可刺如刺脉無血三四日死

蚤疽發手足五指頭起即已不覺十日之內可刺過時不刺後為食癰在腋二歲死

倉疽發身癰後痛此故傷寒氣入藏為發倉疽九日可刺九日死

赤疽發身腫堅核而身熱不可以坐不可以行不可以屈伸成膿刺之即愈

赤疽白軀發膊若肘後癢目痛傷精及身熱多汗五六日死赤疽發背可治

赤疽發解體六月可治不治出歲死赤疽發陰股堅死瀉可治

赤疽發掌中者可治赤疽發脛死不可治

黑疽發腫在背大骨上八日可刺過時不刺為骨疽膿出不可止出碎骨六十日死

黑疽發腋淵死黑疽發耳中如米此名文疽死黑疽發有死

黑疽發缺盆中名曰伏癰死

黑疽發肘上下不死可治黑疽發腋腸死

黑疽發臑臑堅死瀉可治黑疽發臑臑上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死黑疽發膝上堅死足下久癰色赤死

鍊松脂法

取大麻人三升研之令細水三升淘之生布絞去滓松脂二升以水三升半煮令消盡及熱新布絞令脂出內麻汁中待小冷取松脂牽挽令白乃依法秤取

採松脂法

取深山大松木有露根脂自流出白粘者佳火燒黑燭者不堪用亦可五月六月大暑時破作痕三五日待出取之須多者多破根取之

升麻薄主癰疽方

升麻

大黃

黃耆

芍藥

龍骨

白及

黃芩

白斂

牡蠣

甘草

右二十味搗篩為散以蜜和之如泥塗布薄攤上乾即見愈痛微用此令消方

黃耆

青木香

梔子

乾地黃

升麻

龍骨

大黃

黃芩

黃芩

麻黃

黃連

芍藥

生年

取末

白斂

右壹拾伍味等分

搗篩為散以醋和之如泥塗故布上開

口如小豆以洩熱氣乾則易之

差止

白斂薄主癰疽方

白斂

大黃

黃芩

黃芩

黃芩

右三味搗篩為散以蜜和之如泥塗布上薄攤上薄乾

則易之亦可以三升水內三升水中煮三沸綿注汁

拭腫上數十遍以蜜水方末和塗腫上以紙覆之乾則易

之數以黃汁拭之日夜二十易

食惡肉散方

旨采

熱盧

諸

蘭如

半兩

馬錢子

馬錢子

馬錢子

馬錢子

馬錢子

馬錢子

馬錢子

馬錢子

硫黃

雄黃

鹿茸

右七味搗篩為散粉瑤上亦可膏和傅之著先瘡孔中佳

生肉膏主癰疽金瘡方

大黃

黃耆

芍藥

獨活

當歸

白芷

雞白

生地黃

右八味搗篩為散切雞白以地黃汁成煎豬膏三升煎之

二上三下以綿布絞去滓以傅瘡多少隨人意

升麻薄主癰疽結核種種色不異時時牽痛或經年腫勢不消方

升麻

青木香

白斂

芒消

當歸

黃芩

桂心

芍藥

大黃

芍藥

乾葛

秦草

右二十四味搗以酒和令調微火熬令黃以薄腫上日再

易乾者添酒更搗之隨後薄腫上

寒水石

黃芩

黃芩

黃芩

寒水石

石膏

石膏

石膏

右捌味搗篩為末粉瑤和如泥塗故布上薄攤上薄乾

則易之

當歸則諸腫方

當歸

當歸

黃芩

黃連

大黃

芍藥

白芷

白斂

白及

右八味搗篩為散消膠汁稍稍和如泥塗紙上乾則

易之

有患癰破下膿訖著先藥塞瘡痛煩悶因極有人為去先藥

以椒葉土重貼之以布帛裹令緩急得所日再二易之痛悶

即止腫消此極甚大良無比勝於眾貼此主癰疽潰後及凍

瘡有刺不出者用之甚良又無刺者用之亦佳時以鹽湯沃之令藥用之亦佳薄削白皮用亦佳其後不復煩悶腫消膿膿血惡汁出瘡陷下漸差

治腦癰諸節諸癰腫牢堅治之方

削附子令如棗子厚止著腫上以少唾濕附子艾炙附子公熱微附子欲乾輒令唾濕之常令附子熱微附子欲乾輒更氣入腫中無不愈者此法絕妙不傳

治萬種癰腫方

疾癰瘡淨洗二十載之取得一斗以水三升煮取二升去滓內銅器中煮取一升內小兒常煎之稠糖下取漆瘡腫上大良

治癰腫方

伏龍肝以大醋和作泥塗布上貼之乾即易之消矣又和蒜搗如泥塗之

凡癰無問大小亦覺即取膠葶片如掌水清令軟納納然心開一孔如錢孔大貼腫上若已潰者膿當被膠急撮皆出盡若未有膿者當自消矣

又方

燒鯉魚作灰醋和傳之一切腫用之皆愈以差為限至良蛇銜生肉膏主癰疽金瘡敗壞方

蛇銜

當歸

生地黄

黃連

黃耆

苦參

大黃

續斷

芍藥

苦參

莽草

附子

蛇去

細辛

蜀椒

白及

雞白

甘草

各

右膏拾捌味切以大醋漬兩宿以臘月猪脂七升煎三下白芷黃下去滓傳之

又方

生肌膏

雞白

玉兩

辛夷

苦參

獨活

當歸

黃耆

白芷

續斷

芍藥

黃耆

大黃

各

右膏拾貳味切以臘月猪脂四升煎白芷黃下去滓傳之野葛貼主癰疽疔瘡惡瘡婦人妬乳瘡方

野葛

芍藥

雞白

通草

當歸

附子

右六味切之醋浸半日先煎猪脂八公升煙出內藥半兩令消盡下令熟定乃內於脂兩端半兩更著火令熱乃內諸藥令沸三上三下去滓入之泥常去垢貼腫上乾即易之春去附子其亂髮淨洗去垢不爾公瘡腫

又方

煎地黃汁如膠作餅貼之日四易三日差癰腫紫葛貼癰腫方

紫葛

大黃

白芷

玄參

黃連

黃耆

田朮

升麻

榆白皮

青木香

赤小豆

各

右膏拾壹味搗篩為散以生地黄汁和之如泥傳之乾即易之大醋和亦得

治癰疽瘡久不差方

松脂

黃連

黃耆

諸瘡腫方

取芥子細末猪脂和如泥塗病上日三

燕青子封癰腫方

取藥膏子膏升機作細末大醋和如泥封之乾則易之
芥子亦大佳

又方 提子半升慎火草一把擣細水和塗之

又方 諸藥具汁服一雞子以洋封腫上候即易之頭面腫更良
意白粉難理者敷孔積年不差方

葱白膏斤細切擣如泥淨洗瘡拭乾封塗之厚一分日
三夜一取差止

八味黃膏薄方

黃耆

芍藥

大黃

黃連

莽草

黃芩

枳子

芍藥等分

右八味為散以雞子白和如泥塗布上隨腫大小薄之燥
則易之瘡上開孔令得泄氣

搗湯主丹癰疽始發微熱浸長進方兼主小兒丹長忌近陰

升麻

黃連

大黃

芍藥

羚羊角

當歸

甘草

黃芩三兩

右八味以水一斗煮取五升去滓又煮中內芒消參
上火令一沸則帛搗腫上敷之腫熱便消王叔和

休秘之

搗湯方

大黃

黃芩

白欬

略三芒消

右四味以水六升煮取三升以故帛四重內汁中以搗腫
上候便敷晝夜為之

又方 凡腫以梁上煮艾葉等分醋和傅之乾則易之
石脂堅如石不作膿者方

生商陸根貼在帛貼之敷易之亦可搗傅燥即易癰當
消

金翼方 卷二十三

疥癬上

論曰諸癰狀多種不同無問久近皆五香連癰湯主之先刺
去熱小豆薄之其間敷數鍼去血若已失瘡潰爛者須常服
五香湯藥等湯下之當下大鍼入五分者則速愈凡癰高而
光者不大熱其肉正平無尖而紫色者不須治但以竹葉黃
膏湯申其氣耳其肉正平為無膿也癰空痛用人物黃膏薄
大癰七日小癰五日其有堅強者診寧生破發背及發乳若
熱手不可得近者內先服王不留行散外摩發背膏若背生
破無苦在乳者宜令極熱熱之候手按之隨手即起者便熟
須鍼之鍼法要得著膿以意消息之背背不可過一寸酌量
不得膿以食肉膏散著允頭內癰口中如人熱熱氣散服不
占斯散五日後癰欲差者服排膿內塞散凡破癰之後病人
便綿微欲死內寒外熱腫自有以癰而非者當以手按腫上
無所連即是風毒耳勿鍼可服升麻湯
上留三分近下一分鍼惟令極熱熱便不痛破後敗壞
不差者作猪蹄湯洗之日再夏湯二日可用冬六七湯半
劑亦可用胃中痛短氣者當入閭中以手中指按左眼視若
見光者胃中有結癰若不見光者癰疽內發鍼傷脈血不出
住實不寫當成癰也凡脈來細而沈時直者身有癰疽成來
大漸小者陰結亡肌肉痺癰即尋寸口如此求大而漸小也
漏蘆湯方

漏蘆

白欬

黃芩

枳實

芍藥

升麻

麻黃

甘草

黃芩

右九味以水一斗煮取三升以故帛四重內汁中以搗腫
黃下之一方白微貳兩

連翹五香湯方

連翹

青木香

黃蔞香

麝香

冰香

二七九

射干 獨活 桑寄生 通草 升麻

丁香 薑 兩 大黃 兩

右壹拾壹味 咀以水九升 煮取減半 內竹瀝貳升 煮取

參升 分參服 未差 中開常服 住

王不留行 散土 癰疽及諸雜腫 已潰 皆服之方

王不留行 子 桴 五 龍骨 貳 兩 野葛皮 半 分 枯樓 合

當歸 貳 兩 乾薑

右柒味 搗篩 為散 食訖 溫酒服 方寸匕 日三 以四股習習

為瘡 不知 漸稍 加之 此 活 仲 堪 方 隋 濟 開 梨 所 名 為 神 散

癰腫 即 消 極 安 穩 能 治 諸 癰 腫 下

黃耆 竹葉湯 治 胃 背 勞 熱 癰 疽 方

黃耆 參 兩 生 地 黃 貳 兩 甘草 貳 兩 芍藥 參 兩 黃芩 參 兩

人參 貳 兩 麥門冬 貳 兩 石膏 貳 兩 當歸 貳 兩 生薑 貳 兩 大棗 貳 兩 半 夏 貳 兩 淡竹葉 貳 兩 切 壹

右壹拾肆味 以水壹斗 貳升 先煮竹葉 取九升 去滓 內諸

藥 煮 取 參 升 分 肆 服 相 去 如 人 行 二 十 四 間 食 旦 夜 之 服

黃耆 湯 主 癰 腫 熱 盛 口 乾 除 熱 止 渴 方

黃耆 升 麻 枯樓 乾地黃

麥門冬 法 各 黃芩 芍藥 各 貳 兩 枳實 貳 兩 枳實 貳 兩

右八味 咀以水壹斗 煮取參升 分參服

溫中湯 主 癰 疽 取 冷 過 多 寒 中 下 利 食 完 出 方

甘草 乾薑 附子 兩 各 壹 兩 蜀椒 仁 兩 酒

右肆味 咀以水陸升 煮取貳升 分參服

黃耆 散 主 癰 疽 撮 臍 方

黃耆 五 分 小豆 壹 分 乾薑 貳 兩 芍藥 貳 兩 枳實 貳 兩 附子 貳 兩 黃芩 貳 兩 甘草 貳 兩 乾地黃 貳 兩 升麻 貳 兩 當歸 貳 兩 生薑 貳 兩 大棗 貳 兩 半 夏 貳 兩 淡竹葉 貳 兩 切 壹

枯樓 貳 兩 白飯 貳 兩 不合 藥 之

右六味 搗篩 為散 食訖 溫酒服 方寸匕 日三 以四股習習

聖散 主 諸 癰 潰 及 未 潰 癰 中 疾 痛 膿 血 不 絕 不 可 忍 之 方

聖散 白芷 黃耆 當歸 細辛

芍藥 芍藥 薏苡仁 赤小豆 兩 壹

右九味 先以清酒漬豆 出於銅器中 熬之 乾後 漬酒 熬五

過 止 然 後 治 未 之 合 下 篩 溫 酒 服 方 寸 匕 日 夜 各 五 三 日

後 痛 者 肌 肉 生 一 方 以 苦 酒 漬 小 豆 多 痛 倍 聖 散 未 開

倍 白 芷 膿 多 倍 黃 耆 薏 苡 仁 芍 藥

黃耆 湯 主 癰 腫 虛 弱 方

黃耆 四 兩 升麻 三 兩 桂心 貳 兩 黃芩 貳 兩 竹葉 貳 兩 切 壹

茯苓 生薑 切 廿 五 兩 切 貳

右八味 咀以水貳斗 煮取參升 減五升 去之 澄取九升 內

諸藥 煮 取 參 升 去 滓 分 參 服 日 二

諸惡腫 失治 有膿 者 方

燒刺 榆 鐵 作 灰 水 服 之 經 宿 即 出 膿 作 瘡 頭 多 氣

多 頭 無 刺 榆 者 燒 蛇 蛻 皮 交 水 和 封 上 一 日 即 孔 出 仍 口

別 服 五 香 湯 以 筋 作 縱 任 孔 中 勿 令 合 使 引 膿 血 若 已 成

大 瘡 去 血 盡 黃 小 兒 舖 塗 之 上 著 乾 薑 末 以 漸 自 消

五 利 湯 主 年 四 十 已 還 疆 壯 常 大 患 熱 癰 疽 無 定 處 大 小

便 不 通 方

大黃 升麻 各 三 兩 黃芩 貳 兩 枳實 貳 兩 芍藥 貳 兩

右伍味 咀以水伍升 煮取參升 肆合 去滓 下芒消 分肆

服 快 利 即 止

癰疽 潰膿 大 多 裏 虛 方

黃耆 麥門冬 法 各 生薑 切 貳 五 味子 四 兩

桂心 芍藥 茯苓

遠志 志

當歸

人參各二兩 大棗三十兩 甘草各二兩

右壹拾貳味 咬咀以水壹斗 煮取肆升 分陸服

乾地黃丸主壯熱人長將服之終身不發難疽令人肥悅耐勞苦方

乾地黃丸 天門冬 大黃 三兩 巴戟天 肉苁蓉

枳椇 人參 各二兩 芍藥 桂心 當歸

黃芩 薑黃 遠志 去心 石斛 甘草 各二兩

右壹拾伍味 搗篩為末 鍊蜜和丸 如梧子 酒服拾九日 二加至貳拾圓

乾地黃圓主虛熱消瘵節方

乾地黃 四兩 大黃 六兩 芍藥 茯苓 各三兩

遠志 去心 升麻 桂心 黃芩

麥門冬 去心 人參 王不留行 甘草 各二兩

右壹拾貳味 搗篩為末 鍊蜜和圓 如梧子 酒服拾圓 日參加至貳拾圓 長服令人肥健 實一兩 有和

乾地黃圓主虛勞客教發難腫瘡節經手不除者禁主方

乾地黃 天門冬 各二兩 人參 黃芩 黃連

大黃 黃芩 各三兩 芍藥 細辛 茯苓

澤瀉 乾漆 桂心 甘草 各二兩

右壹拾肆味 搗篩為散 鍊蜜和圓 如梧子 酒服拾圓 日三夜一 加至貳拾圓 長服延年益壽 終身不發難疽 凡大黃

皆薄切五升 米下蒸之 暴乾 熱多者倍大黃

排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉壞疼痛方

防風 茯苓 白芷 遠志 去心 芍藥

桔梗 人參 當歸 黃芩 甘草 各二兩

厚朴 炙 桂心 各二兩 附子 一枚 赤小豆 三合

右壹拾肆味 搗篩為散 酒服方寸匕 日三夜壹服

聖藥散主排膿止痛利小便方

瞿麥 麥門冬 黃芩 當歸 白欬 各二兩

右九味 搗篩為散 先食溫酒服方寸匕 日參服

薏苡仁散主難腫令自潰長肌肉方

薏苡仁 乾地黃 肉苁蓉 白欬 當歸

桂心 各二兩

右陸味 搗篩為散 先食以溫酒服方寸匕 日參夜貳服

五香湯主惡氣毒腫方

冰香 丁香 麝香 藿香 青木香 各二兩

右伍味 切以水伍升 煮取貳升 分參服 不差更合服 以湯

淫連腫上

允疽膏方

當歸 芍藥 白芷 松脂 烏頭 各二兩

巴豆 去心 猪脂 三升

右七味 切內膏中 微火煎參沸 內松脂 耗令相得 以綿布

絞去滓 以膏者綿絮尖作允允之隨病深淺允之膿

自出發惡肉盡即生好肉 膿淺者勿允 著瘡中日參惡肉

盡止

乾癰瘡凡其瘡場皆用之方

雄黃 雌黃 硫黃 白礬 胡粉

松脂 水銀 各三兩

右柒味 細研如粉 以水銀不見為度 內後膏中以十隻筋

攪之數千匝 令密貯勿洩

藜蘆 漏蘆 狼牙 羊蹄根 青箱

地榆 當歸 菖蒲 蘭茹 白斂

蛇床子 略

右膏按壹味搗篩為散以醋浸一夜以成煎膏內以煎
三上三下膏成絞去滓以極微火煎之凡一切惡瘡癰疽
瘰癧疥患悉傳之勿令近目及口鼻等所之如瘰癧以
疑乃下攪令勻摩之逐手差矣

食惡肉散方

硫黃 雄黃 雌黃 麥頭 諸如

麝香 礬石 燒馬齒 礬石 燒

右柒味細作散傳之食惡肉令盡

減癰膏主百癰疽惡瘡赤疽皆先以布指作瘡以塗之鼻中

息肉如大豆內鼻中刺血酒服如棗核大病時以綿裹梅子

大內下部中風塗摩取愈婦人崩中產後中風皆主之方

烏頭 礬石 燒 女萎 狼毒 躑躅

附子 野葛 烏賊骨 皂莢 炙 赤石脂

天雄 芍藥 芫蕪 礬石 燒 當歸

石膏 莽草 地榆 鬼臼 續斷

蜀椒 白朮 巴豆 去皮 大黃 細辛

白芷 乾地黄

右貳拾柒味各壹兩搗篩以成煎諸脂四升和藥以此為
蜜三沸三下內三指撮鹽其中下之須服摩之姪娘婦人
勿服其藥須節諸膏臘月當多合用之神效別取一升和
鷹屎白三兩調和使熟傳之滅癰大驗

猪蹄湯主癰疽及惡瘡有息南方

猪蹄如饅頭白斂 白芷 狼牙 芍藥

黃連 黃芩 大黃 獨活

右玖味切以水三斗煮猪蹄取一斗二升去蹄內藥煮取
五升分洗瘡日三良

治即腫方

生椒 麴末 釜月下土末之

右叁味末之以大醋和傳上乾則易之

禁癰方

呪曰癰非癰即非節土塊失癰即滅三七遍取一土塊摩

腫上傳與病人男左女右

割一切腫方

凡人身上有腫腫在左割左在右割右足出少血即消在

足小指下橫文內畔按上此極良

禁一切腫方

凡一切腫亦覺陰呪曰上有太山下有大海內有大魚主食癰

疽罌使者於我所須癰疽小鬼隨手消除急急如律令七遍

又方 取紫檀細研大醋和之塗并治遊腫

療身腫手足卒腫方

取驢脂搗末傳之

又方 取大醋和蝨蚶矢傳之

又方 搗蒼耳傳之冬用子春用心

又方 取大醋和土消末傳之

千金翼方卷之二十四

瘡癰下

癰疽發背第一方九首

凡發背及癰疽腫已潰未潰方

取香豉三升少與水和熟搗成泥可腫作餅子厚三分已有孔勿覆孔可腫上布鼓餅以艾列其上灸之使溫溫熱而已勿令破肉也其熱痛急易之癰疽當便滅決得安或一日二日灸之若先有瘡孔孔中汁出即差

癰腫發背腫并諸毒腫方

榆白皮 枯樓略伍 婦人月布洗取汁

胡燕窠土 獾鼠土略伍

右五味搗和作泥封之一日漸消五日全差若壞封四畔瘡

諸癰腫無聊賴發背及癰節已破痛方

桑葉數更遞更之即愈 更多更之

癰疽發背陰隱處通身有數十癰方

取牛糞乾者燒末以雞子白和金乾則易差止

又方以牡蠣粉大醋和塗即愈

占期散主消腫癰疽消膿方

木占斯 人參 乾薑云乾 桂心

細辛 厚朴云 敗醬 防風

桔梗 枯樓 甘草云

右十一味搗篩為散酒服方寸匕藥入咽覺藥流入瘡中若癰疽灸之不能發壞者可服之瘡未壞者去敗醬已發膿者內敗醬服藥日七夜二以多為善若病在下當膿血出此為腸癰也諸病在裏惟服此藥即覺其力痛者即不痛長服治諸瘡及疽痔瘡已潰便早愈醫人不知用此

藥發背無有不治者惟服此方若始覺背上有不好而湯者即勤服之苦藥力行覺湯止便消散若雖已壞但日夜服之勿住也服之腫自消散不覺去時欲長服者當去敗醬婦人乳癰宜速服之一方無

癰疽潰漏男發背女發乳及五痔方

蠟皮燒 蜂房燒略 蜀椒汗 乾薑各壹

厚朴壹兩 附子炮去 桂心 當歸

續斷 葦本 地榆皮各五

右拾壹味搗篩為散酒服方寸匕日二加斑猫七枚益良

治骨疽百方治不差方

可於瘡上以次灸之三日三夜無不愈

又方

久瘡不愈差而復發骨從孔出者名為骨疽取一死烏雞雞淨去肉取骨數令成灰取三家牛拘木刮取屑三家炊

單各一兩皆別熬成灰合導瘡中碎骨當出數十片愈

鼠瘻第二論一首方二計

論曰一切癰疽皆是瘰癧根本所患癰之後膿汁不止得冷

即是鼠瘻是以漏方次之大須急救之

治鼠漏方

馬齒草五升 檳白皮水煮五升 麝香半兩 杏仁半升

右四味以鑿器貯之合和以三四重帛密繫已病已成瘡者以泔清煎戒半洗作貼子塗藥貼著瘡上日三易之若

未作瘡如瘰癧子者以艾一升熏黃如棗大乾漆如棗大三味末之和艾作炷灸之三七壯止

治諸漏方

取新生兒屎一百日以來皆收置密器中五六日取塗瘡孔中

又方

取鯉魚腸切作五段火上煖之先洗瘡拭乾以腸貼之冷即易之從旦至夜乾止覺痒開看蟲出即差

又方

取雞子三顆米下蒸半日出取黃熬令黑先拭瘡汁令乾以藥內瘡孔中不過三度

又方

以臘月猪脂以絰經沾取內瘡孔中日五度夜二度

風漏及鼠漏方

赤小豆

白斂

牡蠣熬

黃耆

右四味等分搗篩為散酒服方寸匕日二

蟻漏方

取陵鯉甲二七枚燒為末猪膏和傅之

又方取半夏一朮屑之以鴨膏和傅之

漏方

銀鐵屑 狗頭連莖骨 虎矢 鹿角甲半取毛去其金 右四味搗篩為散以猪膏和內瘡孔中須更易之日五六

治鼠漏方

死鼠置於中

亂髮煮雞子大

右二味以臘月猪膏燒得沒之微火煎之鼠髮消盡膏成

以塗瘡上又以酒服半升許鼠從瘡中出

寒熱瘰癧方

連翹

黃連

苦參

栝樓

土瓜根

芍藥

恒山粉

龍膽

狸頭骨燒灰

右九味搗篩為散酒服五分匕日二

治身體瘰癧及常有細瘡又口中有瘡黃薇丸方

黃薇根

黃耆

黃芩

芍藥

苦參

白斂

栝樓

防風

抱子

龍膽

鼠尾根皮略

石龍內略

右九味搗篩為末鍊蜜和丸如梧桐子飲服十粒日二

頸漏

搗生商陸根作餅子如大錢厚三分貼漏上以艾炙之餅乾熱則易之可灸三四升艾便差

一法

葶藶子研

豉煮升

右二味合搗大爛熟作餅子如上一餅子當孔上貼以艾炷如小指大灸上三壯一易三餅九炷日三隔三日一灸

一法

凡是一名瘰癧有結核欲作癰節者以獨頭蒜去兩頭灸之如前法日灸三度差

一法

七月七日未出時採麻花五月五日取艾等分合作炷灸漏上白壯

治瘰癧方

馬齒草陰 臘月淳麻燭燭

右二味等分細篩以臘月猪脂和之先以暖酒清洗瘡拭乾塗之

又方

柞木皮一尺闊六寸去黑皮細切以水二斗煮取五升去滓內白糖十挺煎取一升分三服以銅器中貯之若吐吐著器中看之

又方

五月五日午時取馬齒草一石以水一石煮取三斗去滓內白糖十挺煎取九升分三服以銅器貯之若吐苦器中看之

又方 主寒熱瘰癧在頸脈如杏李方

人參 乾薑 白芷 甘草 各重

右四味搗篩為散先食飲服方寸匕日三少小半匕以意增加

又方

狸骨 伍分 烏頭 伍分 黃蘗 壹兩

右參味搗篩為散先食酒服一錢匕日三

又方

連翹 黃連 芍藥 苦參

土瓜根 龍膽 當歸 各半兩

右七味搗篩為散先食以溫酒服錢五匕日三稍加至方寸匕 博山 無當歸有者

又方取桃枝上不落子搗末以大醋和傳之

鼠乳方

常思根拭去土勿洗以附本繫之一日一夜便斷消

療疽第二方

療疽秘方世所不傳神良無比

升麻 乾地黃 枳實 大黃 前胡 射干 甘草 各半兩

右五味以水九升煮三升分三服以差為度不限劑數

猪蹄湯主療疽諸疽十指頭爛赤痛癢已潰方

猪蹄 壹斤 大黃 白芷 芎藭

黃芩 黃連 細辛 當歸

黨本 續斷 莽草 甘草 各壹兩

右壹拾貳味以水三斗煮猪蹄取一斗煮藥取五升洗瘡搗湯主療疽浸淫欲作未成或如桃李核或如雞子赤爛方

黃芩 黃連 大黃 當歸

芒消 甘草 各壹兩

右陸味以水六升煮取三升去滓還鑊中內芒消一沸貼布帛中以搗腫上數日過

療疽浸淫多日漸大方

胡粉 伍分 黃連 簡如 甘草 各壹兩

右肆味搗篩為散以粉上日三

療疽著手足有背累累如米起色白刮之汁出愈而復發方

黃耆 附子 欬冬花 升麻 赤小豆

附子 炮去 苦參 各壹兩

右陸味搗篩為散酒服半錢匕稍增至壹錢匕日三服

又方

取虎矢白者以馬矢和之暴乾燒灰以粉之

又方

龍骨 胡粉 滑石 青木香 右肆味搗篩為散以米粉一升和之稍稍粉之日四五

療疽方

竈室塵 竈突中墨 竈金下土 各壹兩

右叁味以水九升煮三沸取汁以洗瘡日三四度

惡核第四方

論曰凡惡核似射工初得無定數多側惻然痛時有不痛者不痛便不憂不憂則救遲救遲則教人是以宜早防之此方

忌牛肉雞猪魚驢馬等肉初如粟或如珠在肉裏而堅似
鰓長甚速初得多惡寒須臾即短氣取末更五合作末水一
升和之然取汁頓服之以滓傳之須臾更服此汁令毒氣散
不入腹入腹則致禍切慎之

江南毒氣惡核射工暴腫生瘡五香散方

甲香 薰陸香 青木香 羚羊角 丁香

犀角 鼈甲炙 升麻 烏鵲 黃參

黃蘗 黃連 甘草 附子 吳茱萸

右宜拾肆味搗篩為末中射工毒及諸毒皆水服方寸已
日三以雞子白和塗腫上乾則易之無以水和少許洗腫
上藥

野葛當主射工惡核卒中惡毒方

野葛 巴豆 烏頭 蜀椒 附子

丹砂 茵芋 雄黃 大黃 躑躅

右宜拾肆味搗篩為散以不中水猪膏十斤煎三上三下去
滓內丹砂雄黃末攪至凝以棗核大摩病上勿近眼凡合
名實皆不用六畜婦人小兒見之

麻子湯主遍身流腫方

麻子 赤小豆 防風 附子 當歸

右五味先搗麻子令熟以水三斗煮麻子取一斗三升去
滓內藥及豆令煮取四升去滓食豆飲汁

治惡毒腫或者陰卵或偏著一遍痲急攣痛牽小腹不可忍

宿殺人方

取茴香葉搗取汁飲一升日三四服淫溼腫上此外國方
神驗從來嘉以來用之起死人神效無比

九風勞毒腫攣痛或牽引小腹及腰膝痛方

取桃仁膏并去尖皮薄仁者熬令黑煙出無烟如脂以好
酒三升攪令相和一瓶覆取汗不渴二度作之

若從脚腫向上稍進入腹殺人方

取赤小豆一斗以水三斗煮爛出豆以汁漬麻以下日一
數日則愈矣若已入腹者不須漬麻但煮豆食之斷一切
鹽菜飲食米麴惟紙食豆一物渴飲豆汁是乃止
大麻子赤小豆湯主毒腫無定處或絞痛惡寒或心腹刺痛
煩悶者此由毒氣深重也

大麻子 赤小豆 附子 生商陸 附子

升麻 附子 射干

右六味以水四斗煮諸藥取二斗五升去滓研麻子令破
以麻子汁煮豆令極熟去滓可得六七升一服一升一日
一夜令盡小便當利即毒除腫減食兼此豆益佳如湯沃
雪丸用麻子皆不得用麴醴者可揀擇用之

丁腫方

狗屎珠一名龍葵取汁傳之拔出血皮用乾者湯洗淨用之

又方

取蒼耳燒灰和醋泔澆作泥封之乾即塗勿住取根出乃止

又方 取黑牛垢封之

又方 刮竹箭上取如作炷灸上二七壯即消矣

又方 末附子醋和傳上燥即塗

又方 取生薑根根汁一合去滓塗不過三度

升麻第五方二十八首

治升麻湯升麻湯方

升麻 漏蘆 芒消 薤白 薤白根

黃芩 枳實 枳實根

右陸味切以水一斗煮取七升冷分用漬搗常令濕為佳
丹毒方一名天火也肉中忽有赤如朱塗赤色大者如掌劇
者遍身亦有痛癢微腫者方

赤小豆貳升絹下篩雞子白和塗之小乾即塗逐手消也
復合漏蘆湯以防其內其方如左

漏蘆 白斂 黃芩 白薇 枳實 炙

升麻 芍藥 麻黃 甘草 煎 大黃 鹹

右壹拾味咬咀以水壹斗煮取三升分三服

治五色丹俗名油腫若犯者多致死不可輕之方

縛母猪枕頭卧即差

又方 牛屎塗乾則易之

又方 雞子白清席灰塗之

又方 搗麻子水和塗之

又方 煎羊脂摩之青羊充佳

又方 赤小豆五合末水和取汁一合服萍塗五心

又方 以芸臺菜末雞子和塗之三合萍塗五心

又方 榆根反末雞子和傳之

又方 燒苦竹葉篩灰和臘月猪脂塗之亦治油腫

又方 搗苦臺菜封即差止

又方 搗慎火草封之神良

又方 鯽魚五枚五寸以上者去鱗熟研朱砂一合搗如泥
封病上厚三分乾易之

瘡病方

取鹿鹿二肉治如厚脯火炙令熱搗掩瘡上冷更炙搗可

四灸四易痛膿便愈不除更灸新肉用之

白瘤方

先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熱刮瘡上
洗之二三遍即愈

又方 硫黃 礬石燒

右二味等分末以醋和傳上

麻遊腫方

以生布一片搥油中布入油出以火然之持照病上呪曰

日出遊遊不知羞脂火燎你頭七遍差

白遊腫方

熟搗生羊脾塗之

青白赤遊手近微痛者方

大黃 蒲黃 伏龍肝 略真

右三味以水和如薄粥塗之

治赤遊方

以鷄矢水和塗之二三差

又方 胡鷄巢灰醋和傳之日二三

又方 冷水射注之

又方 大黃 紫檀 豉 鹽 合

右三味搗細篩為末大醋和傳之

又方 搗慎火草如泥塗之此最大效

火遊腫方

大黃慎火草和為末塗之

又方 胡粉壹兩和醋一合煎塗之

火遊腫流遍身赤色者入腹即死方

以生猪肉傳上其肉蟲鳥不食臭惡故也

甘濕第六論十八首
論曰夫甘濕之為病也或熱或寒如病虎狀或時下痢或刺

則斷或常痢不止無有時節或時睡眠有時思食而無力漸弱日贏瘦腹背攣急頭項無力嗜卧食少試法先拍琢其脊上兩邊若逐指即起如粟者即是甘病若不起者非是甘也若起者可漸向上琢之若起至頸骨兩邊者即是蠱已入腦矣病難愈矣療十得二終須多灸若未入腦醫之可差

先以繩拘項向心厭頭令當脊骨下尖處即插著轉繩向背脊上當脊骨插頭橫量病人口兩吻頭作定於捉繩頭脊骨上點兩處灸必須細意點齊平即灸初且灸二壯滿一七日至第二七日灸二七壯第三七日且暮灸七壯第四七日目祇三壯第五七日日二壯看初灸二三日若冬瘡發膿者易差五六日乃發者難差惟得食白飯首宿苦臣薑青來香漿少許燒培差後百日乃可得使常食又須灌藥三遍相去五日一灌

葱白鹽 豉豉 蜀椒蜀椒 鹽鹽
右四味以水一斗煮取七升去滓煖灌之取一升乃灌也療甘濕食口齒及下部方

飛廉飛廉 高麗高麗
右膏味燒作灰搗篩以兩錢匕著病處甚痛者若若痛則非甘也特忌油膩密魚有人患其食口刺痛穿著此得差著下部中蟲如馬尾大相續出無數十日後差三十日差又方

取五葉紫花草末和杏仁薑花灰相和吹下部中差甘濕方
搗五葉紫花草末和杏仁薑花灰相和吹下部中差汁五合服之日三夜一
下部養如蟲行方

真朱砂真朱砂 礬石礬石 芎藭芎藭
右三味搗末綿裏內下部中

又方 取蝦蟇末 兔矢末用之如上法

又方 以紙裹黃岩根煨火燒熟以蜜塗內下部中一切蟲毒愈

又方 黃連黃連 蛇床子蛇床子 黃蘗黃蘗 梔子梔子
右肆味搗篩為散以臘月猪脂和塗內下部中日再

又方 大黃大黃 黃芩黃芩 黃耆黃耆 玄參玄參 丹參丹參
右柒味搗篩為散酒服方寸匕日三

治甘濕久下痢赤白百療不差方

鬼頭鬼頭 狐骨狐骨 葶藶子葶藶子 百草百草 蛇頭蛇頭
蝦蟇蝦蟇 蟻蟻 石蜜石蜜 晚蚕晚蚕 青礬青礬

黃礬黃礬 丁香丁香 麝香麝香 粉粉 角角 丹砂丹砂

苦參苦參 藥皮藥皮 乾薑乾薑 救月木救月木 蠟蟲蠟蟲

芒消芒消 鐵衣鐵衣 印成益印成益 桂心桂心 床中枕木床中枕木

右貳拾柒味等分細研如粉以筒子吹下部日三良

甘濕下蟲方甘濕下蟲方 朱砂朱砂 石蜜石蜜 麝香麝香

丁香丁香 礬石礬石 鐵衣鐵衣 良薑良薑 細辛細辛 土瓜土瓜 乾薑乾薑 蜀椒蜀椒 葶藶子葶藶子

昌蒲昌蒲 蝦蟇蝦蟇 故靴底故靴底 蠶蠶 骨骨 新新 仁仁 下部中

所有患甘香瘰癧傳之其丁香麝香皆別細研內藥中合之
一方有芥子若病大重者用灌法如左

丁香 麝香 甘草 犀角 伍分

右四味細末如粉別以鹽三合蜀椒三合或二升以水三
升煮取一升去滓內諸藥合和分再灌之旦一酉一

月飲惡瘰癧肉方

硫黃 藜蘆 蘭如 斑蝥 去足翅鬚

右冬咳瘰癧為散以粉瘡上乾者以猪膏和塗日三夜二
治甘食人諸瘰癧凡是赤白瘰癧久不差秘之方

五月五日蝦蟇壹枚生熟半 金銀土燭 伍分

麝香壹分 人矢灰 伍分銀末小豆太

右伍味細研如粉傳病上即差三七日慎食甜物刺者吹
下部中

凡人口中生瘡久不差下至咽喉中有三年不差者此亦
是甘食病宜塗角蒿灰於病上有汁咽之不過一宿差

又方 薔薇根濃煮汁含咽三宿差

又方 大麻子 胡麻 各壹升半並

右貳味以參升九餅泥裹上厚一寸待乾內麻子等令滿
以四五枚葦管挿口中密泥之搗地作竈立竈口內竈

底著瓦器承之密填竈孔與地平聚炭餅四面以擊蟲之
日沒放火燒之至明日開取脂膏寒溫灌下部中二合

覺咽中有藥氣為佳亦不得過多則傷人隔日一灌重
者再三灌止日一起灌至日夕極覺體中之勞勿怪也非惟

治甘濕凡百異同瘰癧並洗塗之無不差云云含一丸

甘食下部生瘡及日月食方

麝香 乾薑 蠱蟲 矢 參 桑 葉 灰

五月五日蝦蟇壹枚
右陸味持研為粉以竹管吹下部入內三寸日再

又方

薔蘆壹兩 狼牙 參 兩 橘皮 苦楝膏 青柏脂半

右伍味準前法用之

甘濕方

取乾羊矢一升以煖水三升漬之一宿絞取汁和末石
炭一類內汁中溫之灌下部令藥停腰一食久病乃差

又急甘食臍口數日盡欲死方

藍澱塗所食上令遍日十度夜四差止

又方 細末沒石子吹下部立差

治瘰癧方 燻艾蛤灰臘月猪脂和塗 灌白馬尿一升

細根枝葉水煮稠可丸以竹筒內下部中甘痔漏皆差煎

椒葉汁數洗之良

甘蟲月蝕濕瘰癧方

臘月兔頭燻艾五月五日蝦蟇壹枚青黛壹兩

地黃葉灰雞子 虎頭八分 具齒附 小刺灰雞子
右柒味為散綿裹如棗核大內下部中亦筒吹半棗核大

成人者并草水旦服五分日隔日一服
論曰凡患濕瘰癧多是熱病後或久下不上或有客熱結在

腹中或遇暑濕涼氣者多生此病病亦有燥蠱不其洩利而
下部瘡瘻不問燥濕久則殺人為病甚惡無色舌上盡白甚

者滿口有瘡四肢沉重喜眠如此者此為蠱蝕其肝肝爛盡

見五藏即死矣治之方

黃連 生薑 駱駝 艾葉 劉兩 苦參 肆兩

右肆味咬咀以水一斗煮取三升為三服日三久者利良
凡濕蘘欲得冷而苦痢單煮黃連及艾葉苦參之屬可單用
慎懷散主濕蘘瘡爛殺蟲除熱方

蘘蘘

青箱

女青

桃仁破殼

雷丸

略

若葡萄生兩

右陸味擣篩為散粥飲服方寸匕日三稍增至貳匕酒服
亦得

濕蘘神方

取生薑刮去上皮斷理切之擣極熟取汁壹升五合又以
水壹升五合和合相得旦空腹服之仍刮生薑貳枚如指
大以揪葉桃葉數重裹之煨火中燒之令極熱內下部須
更若濕蘘者頻三日作之無有不差

陰蝕瘡方

蒲黃

壹升

水銀壹兩

右貳味熟研令散以粉瘡上五月六月七月食將忌肥濃
慎之者即免此

又方

肥猪肉壹拾斤并得陰肉雜用益良以水貳石煮取熟訖
去肉以湯汁內大盆中以自洗冷即易不過四遍

殺力蟲散主寒疝心痛及蟲齧心痛方

蘘蘘

貫衆

乾漆略

狼牙

右肆味擣篩為散以羊脂和服之壹合日叁貳日下蟲矣
治熱心中懊懷方

蘘蘘

乾漆

若葡萄生

右叁味擣篩為散粥飲服方寸匕日叁

治蟲痛方

熬乾漆末之蜜和圓如梧子飲服十圓日三

又方

燒槐木耳灰水服棗大差不止飲一盞熱湯立有蟲出
有人患心腹脹滿不能食飲至於死有人教取羊子肝搗蒜
蘘服之遂轉下五升如粉粥寸寸皆是蟲即差此人中
生瘰時人名曰乾其以此療之得差百日內必不得食醬食醬
即發常食蒜蘘平旦服至日西即下其蘘須和調作不同尋
常食蘘也

腸痔第七方三十六首

論五首

療痔方

臘月牛脾一具炙熟食之令盡即差

又方

牛脾一具炙熟食之令盡即差
一具從旦至未令盡

療外痔方

麻子肆升擣生布袋盛飯下煮之絞取脂銅盤盛煖之以
綿作貼子坐使正當熱時孔須更易之更坐蟲出

又方

擣菰蓄絞取汁浸麩作餅飽空腹喫日三頓常食良

療痔方

桑耳切三升水一斗五升煮取三升日服一斗日三三
服一劑

又方

桑耳作羹臠調和令羹空腹下飯取飽不過三頓差

又方

蠅皮一具乾地黃兩連翹子槐子各壹當歸

乾薑 附子炮 續斷 礬石燒 黃耆兩

右壹拾味搗篩為末鍊蜜丸如梧子飲服十九日二稍加至三十丸兼主漏

人方

取生槐白皮十兩洗淨九如彈丸綿裹內下部中長喫齋蓄藥及薑汁作羹粥食之大佳

治下部癰痛純緣腫起內欲生肉突出方

大豆煮升水取雞升急槐白皮切六升甘草各兩

右以大豆汁煮取二升清故帛薄之冷則易之日三五

槐白皮膏主下部癰痛痔瘡方

槐白皮兩赤小豆兩棟實 桃人各五當歸各兩

白芷 甘草各兩

右柴味以成煎猪膏一斤微火煎白芷色黃去滓摩病上兼主下部中

療痔方

取故藥由一枚燒作灰以井華水空腹服一分

又方 取地黃末傳下部日三夜一良

又方

乾薑 芫花 蜀椒各壹兩猪懸蹄拾枚燒

附子各壹兩芍藥 白薇 白斂 大黃

牡蠣各壹兩桂心各半甘草壹兩

右壹拾貳味搗篩為散酒服方寸匕日二

療痔下部出膿血有蟲傍生孔方

取槐白皮一擔以水煮令極熟山置木盆內坐其中欲大便狀蟲悉出令復易之不過二三度

又方 煮槐根汁洗之

又方 煮桃根汁洗之

諸痔去血過多氣息憊憊不下食或腹痛牽引下部當歸湯

當歸 乾薑 桂心 甘草各壹兩糖捌兩

牡丹 白芷 附子炮 芍藥 人參各兩

乾地黃肆兩

右壹拾壹味咬咀以水壹斗煮取參升貳合去滓內糖令消分為肆服

諸大去血積日虛之內補湯方

人參 續斷 白芷 芍藥 附子炮

當歸 甘草各壹兩桂心 茯苓 乾薑

芎藭 乾地黃 五味子 麥門冬各壹兩

大棗貳拾枚

右壹拾伍味咬咀以水壹斗煮取肆升分肆服

諸痔下血蒲黃湯方

蒲黃壹升當歸 白芷 白石脂各壹兩

黃連 芎藭 乾地黃 甘草各壹兩

右八味咬咀以水壹斗煮取參升分參服

諸痔去血大虛黃耆湯方

黃耆 當歸 芎藭各壹兩龍骨壹兩芍藥

桂心各肆兩糖壹斤附子貳枚甘草各貳兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升二合去滓入糖令消分伍服

槐子圖主燥濕痔痔有雄雌者主之方

槐子 吳茱萸根皮 乾漆各肆兩葶梨參兩

秦龜 黃芩 牡蠣各壹兩雷丸 白芷

龍骨 黃耆 桂心 丁香 青木香

八角附子炮去皮

右壹拾伍味搗篩為末鍊蜜和丸如梧子飲服二十丸日三服

小槐實圓主五痔十年方

槐子去子白糖煎斤礬石燒硫黃各壹龍骨

太黃乾漆

右柒味搗篩四味其礬石及糖並細切內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁以和藥令作丸併手丸之如梧子陰乾酒服二十丸日二稍增至三十丸

槐酒主五痔十年不差者方

槐東南枝細切槐白皮細切槐東南根細切

槐子五斗

右肆味以大釜中安十六斛水煮取五斛澄取清更煎取壹石六斗炊兩斛黍米上麴二斗釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲適性常令小小醉耳合時更煮滓取汁淘米洗器不得用生水作酒如此藥忌生水故也

主痔神方

七月七日多採槐子熟搗取汁重綿絞之內銅器中著中庭高門上暴乾之二十日以上煎成如鼠屎大內穀道中

又方

取三具鯉魚腸以火灸令香以綿裹之內穀道中食頃蟲當出魚腸數數易之盡三枚便差

又方

炙魚腸令香坐上蟲即出

又方

虎頭骨炙犀角末

右貳味各末之如雞子大以不中水宿膏和塗之

治痔方

取八月槐子搗取汁煎作九塗之

又方

取熊膽塗之取差止但發即塗

又方

以紙裹小瓜以泥裹三四分煑火理燒之令大熟經宿勿食使大飢開取承熱任意飽食之覆暖卧一炊久其痔差

五痔方

五月五日收蒼耳葉搗為末水服方寸匕日三差採時陰乾

又方

燒羊角臄末酒服方寸匕日三

又方

常服蒲黃方寸匕日三良

論曰凡人大便有血即是痔病勿得慢之慎乾糞油膩諸魚大患痔在身所服各藥皆不得力徒棄切夫一無所益欲服餌者當斷之乃可服也第一槐子人丸大有效驗方在前篇中必須事之勿致疑也

治脫肛方

蒲黃炙

又方

右壹味以猪肪和傳肛門上內之日三愈

又方

腸出不入生枯樓取汁猪脂等分湯上溫塗內之差

又方

以鐵精粉上內之每出即拔取差止

疥癬第八

論一首

方三十四首

論曰癩瘡疥癬之病皆有諸蟲若不速愈三年不差便為惡疾何者諸蟲族類極盛盛藥不能當所以須防之不可輕也凡療疥癩瘡著酒中加烏蛇脯一尺烏頭附子角等石南薺草各等分大秦訖散中加之亦有大効小小疥癩十六味小秦

尤散亦相當千金云小兒瘡散
香瀝主燥濕癬及楊疥百瘡方

沈香 松節 各壹斤 一方更有

右貳味破之如指大以布袋盛之令置麻油中半食久出
取一口甕埵穿底令孔大如雞子以松葉一小把藉孔上
以坭安著白盤上以黃土泥坭固濟令厚五分以藥內坭
中以生炭著藥上使然其煙當流入盤中然盡乃開出指
取汁以傳瘡上且用并治白毛道惡瘡皆差當服小養元
散即差

磐石歷主乾濕瘡及惡瘡方

磐石 硫黃 芒消 大鹽 各叁 松脂 陸合

白糖 捌兩

右陸味切諸藥令如指大先取乾藏仰銅器上以紙中以
藥安嚴上以松脂白糖布藥上其紙重以嚴覆之炆五
升米藥汁流入器中其汁密覆之臨用小溫塗瘡上日再

治癬秘方

搗羊蹄根分以白蜜和之刮瘡四邊令傷先以蜜和者傳
之如炆一石米頃拭去更以二年大酢和塗之傳舞上
燥便差若刮瘡處不傷即不差

治疥癬方

丹砂 雄黃 雌黃 各壹 蘭如 參兩 亂髮 洗漸

松脂 白蠟 各壹 巴豆 拾肆 猪膏 貳斤

右玖味先煎髮令消盡內松脂蠟等三上三下去滓末蘭
茹石藥等內中更煎一沸止傳之二數度差

治久癬不差方

細研水銀霜如粉和臘月猪膏先以汁清洗瘡拭乾塗之

一塗即差後時重發更塗即差效驗時大須謹慎勿寧

又方 水銀 磐石 蛇床子 黃連

右肆味各壹兩臘月猪膏柒合和攪不見水銀為熟傳之
治一切無問幼小諸瘡上方加淡明

治諸瘡癬療不差方

水銀 壹斤 猪膏 臘月者 伍斤

右貳味以鐵器中壘竈馬通火七日七夜勿任火炆之傳
冷取猪膏去水銀不妨別用以膏塗一切諸瘡無不應手
即差

又方

牛尿 壹升 羊蹄根 伍

右貳味內羊蹄漬一宿日暴之乾則內尿中漬一宿尿盡
止搗作末塗諸瘡癬上和猪脂用更精

又方

諸瘡亦皆單用水銀猪膏研令極細塗之

又方

取生烏頭十枚切煮取汁洗之即差

治癬方

淨洗瘡取腎辦尿和塗之差止

又方

水銀 無美 末

右貳味酥和塗之即差

又方

正日中午時灸病處影上三姓灸之呪曰癬中蟲毛茸草
若欲瘳待日中

又方 取酥墨塗之

凡諸瘡癰初生時或始痛癢即以種種單方救之或嚼鹽塗之妙

又方 取鯉魚鮓糝塗之

又方 取薑豉煎塗之

又方 取牛李子塗之

治癰方

取黃蒿穗作末粉傅之日三夜二一切濕癰並差

又方

取八月八日出時令病人正當東向戶長跪平舉兩手持戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩大俱下各三壯若七壯十日愈

又方 搗刺薊汁服之

又方 服地黃汁佳 又方 服驢屎良

又方 燒蛇皮一具酒服良

又方 搗葭若蜜和封之良

又方 熱楊煎餅不限多少日一遍薄之良

又方 酢煎艾塗之差

又方 搗羊蹄根和乳塗之

又方 大酢和雄黃粉先以新布拭之令癰傷傳之妙

治癰疥百癰經年不差方

棟實壹升 地榆根伍兩 桃皮伍兩 苦參伍兩

右肆味以水壹斗煮取伍升稍溫洗之日一度

治癰疥濕瘡浸淫日痛癢不可堪癢之黃水汁出差復發

取羊蹄根勿令婦女小兒觸大見之淨去土細切熟熬以大酢和淨洗傳瘡上一時間以冷水洗之日一傳凡方中用羊蹄根皆以日未出前採者佳

又方

作羊蹄根散瘡時搗汁出以粉上又以生根指之神驗

瘡過利後發瘡坐處瘡疥及疵癬方

黃連貳兩 石龍芮參兩 苦參貳兩 黃耆貳兩

黃芩參兩 芍藥參兩 雀李根參兩 黃蘗參兩

黃芩參兩 當歸壹兩 續斷壹兩 杜蘅肆兩

大黃壹兩

右壹拾叁味搗篩鍊蜜和以飲服之九如梧子大一服十五九日三加至三十九瘡差乃止所是癰疽皆須服之針

又方

赤小豆一升中炒數內雞人參貳兩 甘草貳兩 瞿麥貳兩

白欬貳兩 當歸貳兩 黃芩貳兩 猪苓貳兩 防風壹兩

黃耆參兩 薏苡仁貳升 麻肆兩

右壹拾貳味搗為散飲服方寸匕日三夜一

治疥疽諸瘡方

水銀 胡粉各壹兩 黃連貳兩 黃蘗參兩 礬石參兩

附子參兩 蛇床子貳兩 苦參壹兩

右捌味下篩六種水銀胡粉別以猪脂研令水銀滅不見乃以猪膏合研令調如泥以傳瘡上日三夜一

代指第九方六首

治代指逆腫方

以毛雞黃土作泥泥指上令厚五分內燂灰中令熱可忍之泥乾即易之不過數反即差

又方 單煮地榆作湯漬之半日便愈

治代指方

麻沸湯內指其中即愈

又方 先刺去膿炙鮮魚皮令溫以纏指周匝痛止愈

治指瘻欲脫方

取猪脂和薑末稍令熱內指甲中食頃即差

治指瘻痛方

取醬清和蜜任多少溫塗之即愈

濕熱瘡第十 方三十四首

治濕熱諸惡瘡方

狼牙伍兩 芍藥伍兩 大黃參兩 白芷伍兩 黃蘗伍兩

丹參伍兩

右陸味切以水四升煮取一升半以洗之日三度

治濕熱瘡多汁粉散方

芎藭 大黃 白欬 芍藥 黃連

槐皮 龍骨各壹兩

右陸味搗篩為散以粉瘡上日三度

又洗之方

茵芋參兩 石南參兩 莽草參兩 蛇床子貳兩

躑躅貳兩 礬石貳兩

右陸味切以水壹斗煮取五升洗瘡日再

治惡瘡三年不差方

巴豆去皮 甘草

右貳味等分細下為散先別煮甘草湯洗瘡訖以藥傅之

先從四面起向中心日三夜一

治惡瘡似火爛洗湯方

取白馬矢暴乾以水和煮十沸絞取汁洗之極佳

治惡瘡十年不差似癩者方

蛇脫皮壹枚

右壹味燒之末下篩以猪脂和傅之良

又方

苦瓠

右壹味以咀黃取汁洗瘡日三度洗訖以洗瘡甚良須先

以泔清洗瘡也

治諸惡瘡烏頭膏方

烏頭 雄黃 雌黃 芎藭 外麻各半

杏仁搗末 胡粉壹分 巴豆仁 檉枝去核 黃蘗半兩

亂髮如雞子大一枚 松脂如雞子大一枚 防己三分

黃連半兩

右壹拾叁味切以猪膏三升急煎令亂髮消盡去滓停小

冷以真珠二錢匕投中攪令相得以傅之凡用膏皆令先

溫酢泔清洗瘡拭乾乃傅之訖以赤石脂黃連散粉之此

治諸惡瘡皆差

施子湯主表裏俱熱三焦熱實身體生瘡或發即大小便不利方

芒消貳兩 大黃肆兩 梔子仁七枚 黃芩參兩

知母貳兩 甘草貳兩

右陸味咬咀以水五升煮減半下大黃煮取一升八合絞

去滓內芒消分為三服

又方

礬石燒 蠟

松脂 亂髮

右肆味各半兩猪脂四兩煎之令髮焦內礬石令消內松

脂次內蠟去滓先刮洗瘡以塗之日再三不痛久瘡時愈

新瘡連愈瘡瘡頭亦皆即愈生此膏勝飛黃膏及諸名藥

治諸瘡久不愈并瘰癧方

藥膏方

右壹味以水參升黃取壹斗伍升數洗取差為度

治身瘡及頭瘡不止方

以昌蒲末傳之日三夜一

治濕熱瘡惡瘡并湯方

槐子貳升

蛇床子貳兩黃連伍兩當歸芍藥

黃藥方

右陸味切以水參升黃取壹斗伍升去滓以洗瘡日三度

治濕熱瘡方

生地榆貳斤

右壹味以水三斗黃取一斗五升以洗瘡日三度

烏膏主種種諸瘡治不愈方

水銀壹兩黃連壹兩細墨半兩

右叁味末之以不中水猪脂和傳之不過三四度愈神效

欲多任人惟不冷金瘡其藥性須熟研

惡瘡黃水出流方

燒故鞍箱檀灰和臘月猪脂封塗

又方

藜蘆巴豆

右貳味等分燒灰和臘月猪脂封塗

又方

松脂灰黃陸香各伍分生地黃汁伍合

白羊脂貳石鹽半兩亂髮灰半兩

右六味以猪脂一升煎取五合內地黃汁煎成膏去滓貼

之日再差止

治惡瘡癰瘡方

杏仁去皮巴豆各壹兩藜蘆

黃連各一水銀壹錢

右伍味以青羊脂和研水銀令滅先以湯洗之去上翳

傳瘡日二

時氣病後得風生瘡或癢搔之黃汁出方

皂莢炙烏頭

礬石貳兩黃連壹升牡蠣肆兩

藜蘆

桂心各壹兩

右柒味切以水壹斗黃取七升去滓先搔瘡令血出溫洗

瘡緩浸良久佳

卒患發熱瘡方

取炭長二尺者二枚燒令赤置地中以水二升灌之取地

上汁洗瘡即差

瘡中惡肉出方

治惡瘡方

取白及煮汁洗瘡訖傳膏膏用桑東向枝作末以臘月猪

膏和傳之亦主狗瘡初大痛一宿即愈

瘡初患似節後破無痂疼痛難忍名曰指啄瘡方

燒猪鼻作灰傳之差

反花瘡方

煎柳葉為煎塗之差

又方燒馬蘭草灰傳之

又方燒鹽末灰傳之

又方以蜘蛛幕裏之

王不留行主白禿及頭面久瘡去蟲止痛方

王不留行伍兩桃東南枝伍兩茶葉根皮伍兩

蛇床子參升 牡荊參升 苦竹葉切參升 茯苓參升

大麻仁壹升

右搗味以水貳斗。煮取一斗。洗瘡。日再并治疽及月蝕瘡爛。

治白禿方

三月三日桃花開者陰乾參升 右參味為末。猪脂和。先以灰汁淨洗禿處。拭乾塗之。

又方 細柳枝壹握 水銀 皂莢炙

右參味以醋煎如餲塗之。

松脂膏 主白疥及癰疽百瘡方

木蘭皮壹兩 礬石 杜蘅 雄黃

附子 大黃 石南 秦艽

真朱 苦參 水銀各貳兩 松脂陸兩

右壹拾貳味以酢漬一宿。猪膏一斤半煎之。候附子黃去滓。乃內礬石雄黃水銀更著火煮三沸。還濕地待凝。以傅瘡差。

又方

以牛肉作五味脯。炙令香。及熟搗瘡上。不過三四度即差。

治頭瘡腫方

燒杏仁令黑。磨塗。復取東柴葛蔓炙乾。魚頭燒灰和重黃臘月猪脂塗之。

千金翼方卷第二十五

色脉

診氣色法第一

夫為醫者雖善於脉候而不知察於氣色者終為未盡要妙也故曰上醫察色少醫聽聲下醫脉候是知人有盛衰其色先見於面部所以善為醫者必須明於五色乃可決生死定孤疑故立候氣之法冠其篇首焉

肝受病色青

心受病色赤

脾受病色黃

肺受病色白

腎受病色黑

皆從本觀

春面色青

色赤新病可瘥至夏愈

夏面色赤

色黃新病可瘥至季夏愈

季夏面色黃

色白新病可瘥至秋愈

秋面色白

色黑新病可瘥至冬愈

冬面色黑

色青新病可瘥至春愈

論曰此四時王相本色見於面者故瘥之必愈夫五藏應五行若有病則因其時色見於面亦猶灼龜於裏吉凶之兆形於表也

扁鵲云病人本色青欲如青玉之澤有光潤者佳面色不欲如青藍之色若面白目青是謂亂常以飲酒過多傷風邪風入肺絡於臍膈氣支洩故令目青雖云天救不可復生矣

病人本色赤欲如雞冠之澤有光潤者佳面色不欲赤如赭土若面赤目白憂患思慮心氣內塞面色反好急求棺槨

不過十日死

病人本色黃欲如牛黃之澤有光潤者佳面色不欲黃如蠶中黃土若面青目黃者五日死

病人著床心痛氣短脾竭內傷自目復愈欲起憊復因坐於

地其亡倚床能治此者是謂神良

病人本色白欲如璧土之澤有光潤者佳面色不欲白如瑩

若面白目黑無復生理也此謂酣飲過度榮華已去血脉已盡雖遇岐伯無如之何

病人本色黑欲如重漆之澤有光潤者佳面色不欲黑如炭

若面黑目白八日死腎氣內傷也

病人色青如翠羽者生青如草滋者死

赤如雞冠者生赤如鮮血者死

黃如蟹腹者生黃如枳實者死

白如豕膏者生白如枯骨者死

黑如烏羽者生黑如炰煤者死

凡相五色面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑皆不死

病人目無精光及齒黑者不治

病人面失精光如土色不飲食者四日死

病人及健人面色忽如馬肝望之如青近之如黑必卒死

論曰夫五色者五藏之華也故天晴明時觀萬物辨白黑審長短若五色不分長短垂錯此為錯亂故人亦然

黃帝問伯高曰察色知病何如伯高曰色起於兩眉間薄

澤者病在皮膚膚色青黃亦黑者病在肉榮氣微然者病在

血脉目色青黃赤白黑者病在筋耳焦枯受塵垢者病在骨

問曰病狀如是取之奈何伯高曰皮有部肉有柱氣血有輪

筋有結骨有屬經曰皮部在於四肢肉柱在於臂肘諸陽分

肉之間及少陰分肉之間氣血之輪在於諸經絡脉氣血留

居則盛而起筋部無陰陽左右唯疾之所在骨之屬骨空之

間所以受津液而益腦髓若取之者必須候病間其者也間

者淺之少之甚者深之多之隨變而調之故曰上工經言知

一藏為下工知二藏為中工參而知之為上工上工十全九中工十全六下工十全三此之謂也

黃帝問曰人有不病而卒死者何以知之黃帝曰大氣入於藏府者不病而卒死矣

雷公問曰病少愈而卒死者何以知之黃帝曰赤色出於兩額上大如拇指者病雖少愈必卒死矣黑色出於兩額大如拇指者必卒死顏貌者面之首也

扁鵲曰察病氣色有赤白青黑四氣不問大小在人年上者病也惟黃氣得愈年上在鼻上兩目間如下黑氣細如蠅在四墓發及兩額骨上者死或冬三月遠期至壬癸日逢年衰者不可理病者死四墓當兩眉坐直上至髮際左為父墓右為母墓從口吻下松頤名為下墓於此四墓上觀四時氣

春見青氣節盡死

夏見赤氣節盡死

秋見白氣節盡死

冬見赤氣節盡死

論曰凡病黃色入鼻從口入井竈百日死井在鼻孔上曲中是竈在口吻兩傍上一寸是若入者丙丁日死

凡人死色易驗但看年上者有黑色橫度者此人不出百日死若天中從髮際兩墓皆發黑色此人三年死

天中當鼻直上至髮際是也若兩額上發黑色應之者一百日死

目下有黑色橫度年上者不出三十日死黑色入口應天中

者不出一年死

若天中發紅色年上命門上並黃色者未好半惡也以天中為主五年內死天中發黑色法三年內死所以然者有二

凡天中發黑色兩額上發赤色應之者不出六十日死若年上發赤色應之者不出三十日死若命門上發赤色應之者不出百日死婦人產厄兵死同氣從命門入耳年上死赤色從眉衝下入目五日死或丙丁日死

黑色在左右眉上一日死或壬癸日死

若白色亦死或庚辛日或二三日死

赤色入口三日死遠期丙丁日死

黑色從天中及年上入目三日死或壬癸日死或二三日死或百日半年死

青色如鐵在目下春死或甲乙日死

黃色入目匝四邊戊己日死

黑色準上行或入目期壬癸日死遠期二十日死若入耳鼻三日死準上者當兩耳間

黃色橫兩額入鼻一年死

黑色如拇指在眉上不出一年暴死一云三年

赤色如馬黑色如鳥見面死

黑色從眉繞目死

赤色在口兩傍死

黑色如深漆繞口或白色皆死黃帝問扁鵲曰人久有病何以別生死願聞其要對曰按明堂察色有十部之氣知在何部察四時五行王相觀其勝負之變色入門力為凶不入為吉白色見衝眉上者肺有病入

關庭者夏死黃色見鼻上者脾有病入口者春夏死青色見人中者肝有病入目者秋死黑色見額上者腎有病入耳者六月死赤色見頤者心有病入口者冬死所謂門戶者關庭肺門戶目肝門戶耳腎門戶口心脾門戶若有色氣入者皆死黃帝曰善

問曰病而輒死甚可傷也寧可拯乎對曰藏實則府虛府實則藏虛以明堂視面色以針補寫調之百病即愈鼻孔呼吸氣有出入出為陽入為陰陽為虛陰為藏陽為衛陰為榮故曰人一日一夜一萬三千五百息脉行五十周於其身漏下二刻榮衛之氣行度亦周身也

夫面青者虛虛者實之補虛寫實神歸其室補實寫虛神捨其城衆邪並進大命不居黃帝曰善

五實未見

六虛者皮虛則熱脉虛則寒肉虛則重骨虛則痛腸虛則洩瀉隨虛則墮

仲景曰鼻頭色青者腹中冷若痛者死鼻頭色微黑者有水氣色白者無血氣黃者胃上有寒色赤者為風色青者為痛色鮮明者有留飲

又仲景曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病言聲啞然不徹者心腸間病言聲啞啞細而長者頭中病一作痛

診脉大意第二

問曰手足三陰三陽十二經皆有動脉而獨取寸口者何也扁鵲曰晝夜漏水下百刻凡一刻一百三十五息十刻一千三百五十息百刻一萬三千五百息脉行五十度周於身漏下一百刻榮衛行陽二十五度行陰二十五度合五十度為一周而復會於手太陰手太陰者寸口也寸口者五藏六府

氣血之所終始故法取於寸口也脉有尺寸者從關至尺是尺內陰之所治從關至魚際是寸內陽之所治寸口位八分關上位三分尺中位八分合三部一寸九分寸口關上為陽陽脉常浮而速尺中為陰陰脉常沈而遲初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺脉也如六菽之重與血脉相得者心脉也如九菽之重與肌肉相得者脾脉也如十二菽之重與筋骨相得者肝脉也按之至骨舉指來疾者腎脉也

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急稱其形性則吉與本性相乖則凶何則人大而脉細人細而脉大人樂而脉實人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉躁人壯而脉細人羸而脉大此皆為逆逆則難治反此為順則為易治凡婦人脉常欲濡弱者丈夫也小兒四五歲者脉自疾駛呼吸入至也

凡春脉微弦而長夏脉洪浮而長秋脉微浮而長冬脉沉滑而實季夏脉洪而遲秋脉微浮而散冬脉沈滑而實季夏脉洪而遲

凡心肺二脉大率俱浮何以別之浮而大者心也浮而短者肺也凡肝腎二脉俱沈何以別之牢而長者肝也按之濡舉指來實者腎也遲緩而長者脾也

夫人受氣於穀穀入於胃乃傳於五藏六腑五藏六腑皆受氣於胃其清者為榮濁者為衛榮行脉內衛行脉外陰陽相貫如環之無端故曰胃為水穀腑主粟四方皆以胃氣為本也

凡人病脉不病名曰內虛脉病人不病名曰行尸死不治夫平和之脉不緩不急不澀不滑不停不止不長不短不低不昂不縱不橫此為平也無病尺欲小大關欲小實老人脉欲微陽盛於陰者平也

夫按之不足舉之有餘名曰浮浮陽也

按之去來促急名曰數數陽也

按之如琴瑟絃三關通病梗梗無有屈撓名曰弦弦陽也

經為陰為

按之如動珠子名曰滑滑陽也

按之實強其脉有似沈伏名曰牢牢陽也

按之浮大在指下而滿名曰洪洪陽也

按之洪大牢強隱指名曰實實陽也

脉見於關上無頭尾大如豆厥厥搖名曰動動陽也

右件八條皆陽脉也

按之有餘舉之不足名曰沈沈陰也

按之無舉之來兩傍實而中央空名曰芤芤陰也

按之遲小名曰細細陰也

按之短實而數有似切繩狀名曰脈脈陰也

按之依依名曰緩緩陰也

按之大而遲名曰虛虛陰也

按之短小不至動搖若有若無或復浮薄而細名曰微微陰也

重手不得名曰微微陰也

按之乃得舉之無有濡而細名曰弱弱陰也

按之盡空舉之無有不前不却但出不入如魚之接食動中

名曰遲遲陰也

按之無有舉之有餘或如帛衣在水中輕手與肌肉相得而

軟名曰濡濡陰也

按之促數浮短如刮竹皮輕手乃得重手不離其處或多入

而少出名曰澀澀陰也

按之來數時一止名曰促促陰也

脉來動而中止按之小數中能還者舉指則動名曰結結陰

也。不死

脉動而止不能自還因而復動名曰代代陰也代者死

右件一十四條皆陰脉也

脉有相薄者寸口微而尺中弦此為相薄也或但寸口微而

弦亦為相薄也

沈與伏相類

浮與芤相類

遲與緩相類

濡與弱相類

牢與實相類

微與澀相類

弦與緊相類

滑與數相類

凡脉出為陽入為陰來往之間為脾大陰也

凡脉浮滑長皆為陽沈澀短皆為陰也

脉有一陰一陽者脉來沈而滑也一陰二陽者脉來沈滑而

長也一陰三陽者脉來浮滑而長時一沈也一陽一陰者

脉來浮而澀也一陽二陰者脉來長而沈澀也一陽三陰

者脉來沈澀而短時一浮也

脉有伏匿者謂陰陽更相乘伏也若脉居陰部反陽脉見為

陽乘陰也雖陽脉時沈澀而短者此為陽中伏陰也脉居

陽部反陰脉是為陰乘陽也雖陰脉時浮滑而長者此為

陰中伏陽也故重陰者顯重陽者征

脉有大過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格關之前

者陽之動也脉當見九分而浮過者謂之大過減者謂之

不及過上魚為溢為外關內格此陰乘之脉關之後者陰

之動也脉當見一寸而沈過者謂之大過減者謂之不及

遂入尺為覆為內關外格此陽乘之脉是其藏之見也得

脉有相乘有縱有橫有逆有順何以知之水行乘火火行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘火火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也

夫欲知人病將愈當診其三部之脉大小遲疾浮沈正等雖有寒熱不解然陰陽已平知當愈也

夫病者發熱身體疼痛此為表有病其脉當浮大今脉反沈遲故知當愈病卒腹中急痛此為裏有病其脉當沈細今脉反浮大故知當愈然此二脉其人不即愈者必當死以其病與脉相反也

夫脉者血之腑也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少短而急者病在上長而緩者病在下弦而沈者病在內浮而洪者病在表脉實者病在內脉虛者病在表滑而微浮病在肺下堅上虛病在脾胃長而弦者病在肝脉小血少病在心大而緊者病在腎

凡脉肺為陽主熱臟為陰主寒陽微自汗陰浮自下陽數即口瘡陰數即惡寒陽數出血陰澀下血脉與肌肉相得久持之至者可下之

失脉有二部陰陽相乘榮衛氣血任人體弱呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作物象形容春弦秋浮冬沈夏洪察色觀脉大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願為具陳令得分明師曰子之所問道之根源脉有三部尺寸及關榮衛流行不失衡銓腎沈心洪肺浮肝弦此自經常不失銖分出入升降漏刻周旋水下百刻一周循環當復寸口虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒

則牢堅沈潛水畜支飲急弦動即為痛數即熱煩設有不應知有所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然邪不空見終必有妊審察表裏三焦別為知其所含消息診看料度

凡瘕病當察其形氣色澤脉之盛衰病之新故乃可療之形氣相得色澤以浮脉順四時此為易治形氣相失色夭不

澤脉實堅其脉逆四時此為難療夫形盛脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胃中氣多者死

形氣相得者生參伍不調者病夫關前為陽關後為陰陽出陰入以關為界陽數則吐陰數則下陽弦頭痛陰弦腹痛

診四時脉第三

春肝木其脉弦細而長者平脉也反得微浮而短澀者是肺之乘肝金之剋木為賊邪大逆十死不治反得浮大而洪者是心之乘肝子之乘母為實邪不治自愈反得沈濡而滑者是腎之乘肝母之歸子為虛邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘肝土之畏木為微邪雖病不死

夏心火其脉浮大而洪者是平脉也反得沈濡而滑者是腎之乘心水之剋火為賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘心子之乘母為實邪不治自愈反得弦細而長者肝之乘心母之歸子為虛邪雖病當愈反得微浮而短澀者是肺之乘心金之畏火為微邪雖病不死

季夏六月脾土其脉大緩濡而緩者是平脉也反得弦細而長者是肝之乘脾木之剋土為賊邪大逆十死不治反得微浮而短澀者是肺之乘脾子之乘母為實邪不治自愈反得浮大而洪者是心之乘脾母之歸子為虛邪雖病自愈

反得沈瀦而滑者是腎之乘脾水之畏土為微邪雖病不死

凡脾旺則不見衰時即見

秋肺金玉其脉微浮而短者平脉也反得浮大而洪者

是心之乘肺火之剋金為微邪大逆十死不治反得沈瀦

而滑者是腎之乘脾土之乘母為實邪不治自愈反得大

而緩者是脾之乘肺金之剋土為虛邪雖病自愈反得沈

細而長者肝之乘脾木之畏金為微邪雖病不死

冬腎水玉其脉沈瀦而滑者是平脉也反得大而緩者是脾

之乘腎土之剋水為微邪大逆十死不治反得弦細而長

者是肝之乘腎子之乘母為實邪不治自愈反得微浮而

短瀦者是肺之乘腎母之歸子為虛邪雖病自愈反得浮

大而洪者是心之乘腎火之畏水為微邪雖病不死

診寸口脉第四

寸口緊者中風風頭痛亦為傷寒頭痛

寸口沈而橫者脅下有積腹中有積積痛

寸口浮大而實宿食不消浮滑亦然

寸口沈而緊寒結在心下痛有熱飲水則下

寸口沈滑者中有水氣面目腫大微熱名為風水

寸口沈而弱寒熱疝瘕少腹痛

寸口微而弱氣血俱虛男子吐血婦人下血嘔汁出

寸口弱而弦者中脅下腰背並痛

寸口雙弦者下拘急而痛滿滿而寒

寸口弦緊而細痛在心下

寸口洪而大傷寒熱病兼有骨下痛痛

寸口細沈滑者有積聚在脅下左右皆滿皆相引痛

寸口細而數數即發熱細即反吐

寸口緩而數者中風

寸口沈而喘則寒熱

寸口盛而緊者傷於食也

寸口急而微少腹痛

寸口浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中

熱

寸口沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂悲聞人聲少氣

時汗出陰氣不通臂不能舉

寸口脉壯大尺中無有此為陽十陰病苦腰痛陰中傷足

胫寒

寸口偏絕者則臂偏不用其人兩手俱絕者不治

寸口脉弱而遲弱即衛氣微遲即榮中寒榮為血血寒即發

熱衛為氣氣微即心中飢飢而虛滿不能食

寸口脉弱而緩弱則陽氣不足緩即胃氣有餘噫而吞酸食

卒不下氣填於膈上一作

寸口脉微而弱微即無氣弱即血不足血不足即不能呼吸氣

不足則不能呼吸吸不足則胃滿短氣

寸口脉微而瀦微即衛氣不行瀦即榮氣不達榮衛不能相

將三焦無所依身體理不仁榮氣不足即疹而煩滿口即

難言衛氣虛即惡寒而數欠

寸口脉微而瀦微即衛氣衰瀦即榮氣不足衛衰其色黃榮

不足其色青榮為根衛為葉榮衛俱微即根葉枯槁而寒

便於逆唾涎沫

寸口脉微而緩微即衛氣疎疎即其膚空緩即胃氣足足即

穀消而水化穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成榮

盛則其膚必疎三焦絕經名曰血崩

寸口脉微而數微即為風數即為熱微為風風即汗出數為

熱振而寒慄

寸口脉微而遲尺脉沈即為血滑即為實血實內結入絡育

臆肺痿色薄不能喘息而心堅脫色口不能言肝舉筋厥

四逆不識人

寸口脉微而濡濡即為弱微即為寒濡即惡寒弱即發熱濡

即厥逆微濡相薄即為煩其氣在心

寸口脉微尺中緊其人虛損多汗知陰常在絕不見陽

寸口諸微為無陽諸濡為無血諸弱為發熱諸緊為寒微濡

為血不足

診關上脉第五

關上浮而數胃中熱

關上浮大風在胃中腹脹急心下澹澹然羸瘦不能食寸關

有息心下澹澹食飲不

關上細微而絕者腹中穢少氣不能食

關上微而孔唾血亦吐血

關上弦緊而細微在胃管

關上緊而滑者蛔蟲動

關上微浮積熱在胃中

關上滑而大小不均為病方欲來不出一二日內復欲發

動其人欲多飲飲即注痢如痢上者生不止者死

關上弦大有痛在臍左右上下關在臍左右上下

診尺中脉第六

尺中緊數而弦下痢病

尺中浮數小便不利尿黃

尺中微而滑帶下病

尺中微而孔尿血

尺中弦而細微在臍下

尺中細而急筋攣痺不能行

尺中細而滑婦人欲產

尺中虛小者足脛痿寒痺脚疼

尺中虛者漏血小便不禁

尺中沈細者名曰陰中之陰病苦兩脚疼酸不能久立陰氣

衰小便有餘瀝陰下濕痒

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦少腹痛滿不能尿尿

則陰中痛大便亦熱

尺中牢長關上無有此為陰干陽病苦兩脛重少腹引腰痛

尺寸俱數有熱俱遲有寒

尺寸俱濡發熱汗出

尺寸俱浮直下此為督脉腰背強痛不得俛仰大人癰病小

兒風癰

尺寸俱微血氣不足其人短氣

尺寸俱牢直上直下此為通衝脉胃中有寒疝

熱病大汗後脉不安靜者死

熱病脉盛大而駛不得汗此熱發也

寒熱相瘵脉絕代者死

熱病未得汗脉盛大者主細小者死

熱病多汗脉虛小者生緊實者死

熱病得汗脉常喘而熱不退者死

汗出而衄其脉小滑者生大躁者死云微細

傷寒脈浮而洪大者易治。言主語身熱脈洪大者生沈細

而微手足四逆者死

效而尿血羸瘦脈大者死

效且羸瘦脈堅大者死

上氣注液脈虛慢伏匿者生牢弦者死

寒症上氣脈虛濡者生牢急而疾者死

上氣喘息脈滑手足溫者生澀而四肢寒者死

上氣面浮腫者息脈浮大者死

上氣喘息脈滑者生大而數者死

唾血脈沈弱者生一云緊強者死

吐血脈牢實者死

吐血鼻衄脈沈細者生浮大而牢者死

中惡腹大脈緊實細者生浮大者死

金瘡出血不斷脈大而止者七日死

金瘡出血太多脈虛細者生大數者死

金瘡所傷在陽處者去血四五升脈弱微緩而遲者生急疾

者死

人被管撈內有結血脈實大者生虛小者死

從高墮下及全瘡內有瘀血腹脹脈牢大者生沈細者死

心腹疼痛脈沈細者生浮大而長者死

腹脹脈浮者生虛小者死

下痢脈微細者生浮大者死

下痢脈代絕者不死

腸辟便膿血脈沈細虛遲者生疾大而有熱者死

腸辟下白沫脈沈者生浮者死

腸辟下赤白脈細微而遲身雖溫可治

腸辟其脈滑者生浮者死懸絕者死

洩痢脈緩時小結者生浮大而數者死

洞泄或去膿血食不化者脈微小者生實急者死

洩痢脈細微而澀者生緊大而滑者死

洩痢寸關脈不見尺中時一見此腎氣見為難治

下痢脈絕手足寒時脈還手足溫者生脈不還不溫者死

霍亂脈大可治微細難治

霍亂吐下脈微遲氣息劣口不欲言者不治

病手足厥逆脈當沈細而澀反得堅大而滑者死

水病脈洪大者生微細者死

消渴脈數大者生細小浮短者死

卒中風四肢不收脣口僻語言不正脈浮遲者生癰病卒忤

脈堅弦實大者生虛伏濡小者死

癰狂恍惚脈實牢者生沈細者死

中風口噤不能言四肢不收其脈浮遲者生實大數急者死

病風痺不仁痿厥脈虛數者生牢急者死

目眈眈脈大緩者死

閉目不欲見人脈得肝脈者生反得肺脈者死

耳聾脈大者生沈遲細者難治

堅積洩痢脈微細者生浮者死

頭痛脈短澀者死浮滑者生

中風毒藥傷脈洪大而速者生微細者死脈經速

暴病脈微細者生大急洪直者死

大人得小脈者死

脈但出不能入者死

將死之脈如羣鳥之聚一馬之馭系木交聚一作之狀如懸

石之落出筋之上藏筋之下堅關之裏不在榮衛伺候交射不可知也

困病脉如蝦之游如魚之翔者死蝦游者舟舟而起尋後退沒不知所存久而後起起輒遲而沒去其遠是心魚翔者似魚不行而但掉尾動身其動疏而住久是也

脉病人不病脉如屋漏雀啄者死屋漏者其脉既絕而止時復一起不相連屬也雀啄者脉來其數而急疾絕止久已復頓來

脉來如彈石去如解索者死彈石脉辟辟急也解索脉動數而隨散亂無次緒也

脉來涌涌不去者死

脉如轉豆者死

脉如偃刀者死

脉怒來忽去暫止復來者死

脉中移者死

脉久絕者死

脉有表無裏者死

婦人尺脉按之不絕者胎也

產後寸口炎疾不調者死沈微附骨不絕者生新產後渴熱

病脉細而四肢冷者死

三部脉沈浮正等不斷絕者有娠也

妊娠脉滑疾重手按之不數者胎已三月也但疾不滑者五

月也妊娠七八月脉實大牢強弦緊者生沈細者死欲產

者其脉細而滑也

婦人欲產其脉離經者曰生也

新產脉小緩滑者生實大弦急者死

已產脉沈虛小者生實大者死

婦人月經不通脉絕小實者生浮虛者死

婦人脉寸關調如故而尺脉絕不至者月經不利當患少腹

引腰絞痛氣積聚上又背脅也

漏下赤白脉急疾者死遲滑者生

婦人脉尺寸俱微弱則絕子不產也

小兒脉沈者乳不消也

小兒脉急者客忤氣也

凡按人脉五十至而止者五藏皆受氣足吉也四十動而

一止一藏無氣四藏死三十動而一止者二藏無氣三藏

死二十動而一止者三藏無氣一藏死一十動而一止者

四藏無氣歲中死

凡脉一動一止或三動一止或十動一止投數無常此死脉

也命雖未盡正當小引日月耳

凡脉一呼垂至一吸垂至呼吸定息其脉五至不大不小為

平若一呼三至一吸三至始為得病也

夫脉前大後小則為頭痛目眩前小後大則為背滿短氣

問曰何謂損至答曰脉有損至謂一呼垂至曰平二至曰離

經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此謂至脉也一呼

一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至

曰命絕此謂損脉也至脉從下上也損脉從上下也損脉

之為病也一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脉血

脉虛少不能榮於五藏三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不

為肌膚四損損於筋骨筋骨不能自扶持五損損於骨髓

不能起於床及此者至於收病從上下者骨痿不能起於

床者死從下上者皮癢而毛落者死

損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食
適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精氣也
凡脈一息再至為平無病也一息三至名離經離失也經常
也其人榮衛已虧將欲病也
一息四至為奪精其人已病也一息五至為絕命有大有小
為難治一息六至為將滅一息七至為命盡一息八至為
無鬼一息九至為無鬼一息十至為今死
一息一至其人雖行當着床其人血脈已病諸氣皆不足也
二息一至為危三息一至為困四息一至為行尸將死五
息一至為定死

千金翼方卷第二十六

取孔穴法第一

論曰安康公李襲興稱武德中出鎮潞州屬隨徵士甄權以新撰明堂示余余既暗昧未之奇也時有潞州刺史成君綽忽患頸腫如數升喉中閉塞水粒不下已三日矣以狀告余余屈權救之針其右手少指之端如食頃氣息即通明日飲噉如故爾後給紳之士多寫權圖略遍華裔正觀中入為少府奉勅修明堂與承務郎司馬德逸太醫令謝季卿大常丞甄立言等校定經圖於後以所作呈示甄權曰人有七尺之軀藏腑包其內皮膚終其外非有聖智孰能辨之者乎吾十有八而志學於醫今年過百歲研經方推究孔穴所疑更多矣竊聞尋古人伊尹湯液依用炎農本草為鵠針灸一準黃帝雷公問難慈惠對揚周密去聖久遠愚人無知道聽塗說多有穿鑿起自胃臆至如王遺馬銜之法單行淺近雖得其効偶然即謂神妙且事不師古遠涉必泥夫欲行針者必準軒轅正經用藥者須依神農本草自餘名醫別錄益多誤耳余退以甲乙校泰承祖圖有安庭藏會等一十九穴按六百四十九穴有目無名其角孫景嵐一十七穴三部針經具存焉然其漏尚有四十九穴上下倒錯前後易處不合本經所遺失之者差之千里也至如石門關元二穴在帶脈下相去一寸之間針關元主婦人無子針石門則終身絕嗣神庭一穴在於額上刺之主發狂灸之則愈癩疾其遺幽隱豈可輕侮之哉人誠知情命罕通經方抄寫方書重委下吏承誤即錄純繆轉多近智之徒不見正本遂為總鈔以此而言可為深誠公所述針灸孔穴一依甄公明堂圖為定學

者可細詳之且夫當今醫者各承一業未能綜練衆方所以救疾多不全愈或有偏功針刺或有偏解灸方或有惟行藥餌或有專於按摩故以網羅諸疾有愈於是慨其如此聊以養疾之暇搜錄衆經以貽後嗣其於條例具之醫者意也善於用意即為良醫之通必先診脈察方次即針灸內外相扶病必當愈何則湯藥攻其內針灸攻其外不能如此雖時愈疾終為偶偶非醫善也又以孔穴難識衆圖莫可雖復經本具述自此頃學之士造次未可卒知所以先述取穴方法云爾

仰人面二十六穴第一

神庭在髮際直鼻不刺一寸五分
曲差夾神庭一寸半在髮際
攢行在眉頭陷中
睛明在目內眥
迎香在鼻旁上鼻下孔傍一云在鼻
素窠在鼻柱端
水溝在鼻柱下人中
兌端在唇上端
斷交在唇內齒上斷縫
本神在曲差傍一寸半
陽白在眉上一寸直瞳子
承泣在目下七分直瞳子不多
四白在目下一寸
臣窠夾鼻傍八分直瞳子
禾窠直鼻孔下夾水溝傍五分
地倉夾口傍四分一云在口角廉

承漿在顙前下脣之下。

廉泉在頤下結喉上舌本。

頭維在額角髮本神傍一寸半不灸。

上關在耳前上廉起骨開口取之。

下關在客主人下耳前動脈下空下廉合口有穴張口則閉。

頰車在耳下曲頰端陷中。

大迎在曲頰前一寸二分骨陷中動脈。

絲竹空在眉後陷中不灸。

瞳子竅在目外去眥五分。

顴竅在面顴骨下下廉陷中。

○頭上第一行九穴第二

上星在顙上直鼻中央入髮際一寸陷谷豆。

額會在上星後一寸陷中。

前頂在額會後一寸半骨陷中。

百會在前頂後一寸半頂中心。

後頂在百會後一寸半枕骨上。

強間在後頂後一寸半腦戶前一寸半。

腦戶在枕骨上強間後一寸半不灸。

風府入髮際一寸大筋內宛宛中不灸。云在腦戶下

瘡門在項後髮際宛宛中不灸。云在腦戶下

○頭上第二行六穴第三

五處在顙上去上星一寸半。

承光在五處後一寸不灸。云一寸半

通天在承光後一寸半。

絡却在通天後一寸半。

玉枕在絡却後七分半夾腦戶傍一寸三分起肉枕骨上入

髮際三寸

天柱夾項後髮際大筋外廉陷中。

○頭上第二行六穴第四

臨泣當目上眥直入髮際五分陷中。

目窓在臨泣後一寸。

正營在目窓後一寸。

承靈在正營後一寸。

腦空在承靈後一寸半夾玉枕骨下陷中。

風池在顙額後髮際陷中。

○伏人耳後六穴第五

顙息在耳後青脈間。

瘄脈在耳本難足青脈不灸。

完骨在耳後入髮際四分。

竅陰在完骨上枕骨下。

翳風在耳後陷中按之引耳中。

○伏人脊中第一行十一穴第六

大椎在第一椎上陷中。

陶道在大椎下節間。

身柱在第三椎下節間。

神道在第五椎下節間。

至陽在第七椎下節間。

筋縮在第九椎下節間。

脊中在第十一椎下節間不灸。

懸樞在第十三椎下節間。

命門在第十四椎下節間。

腰俞在第二十一椎下節間。
長強在脊骶端。

○伏人脊中第一行二十一穴第七

大抒在項第一椎下兩傍各一寸半陷中。

風門熱府在第二椎下兩傍各一寸半。

肺俞在第三椎下兩傍各一寸半。

心俞在第五椎下兩傍各一寸半。

膈俞在第七椎下兩傍各一寸半。

肝俞在第九椎下兩傍各一寸半。

膽俞在第十一椎下兩傍各一寸半。

脾俞在第十二椎下兩傍各一寸半。

胃俞在第十三椎下兩傍各一寸半。

三焦俞在第十四椎下兩傍各一寸半。

腎俞在第十六椎下兩傍各一寸半。

大腸俞在第十八椎下兩傍各一寸半。

小腸俞在第十九椎下兩傍各一寸半。

膀胱俞在第二十椎下兩傍各一寸半。

中膂俞在第二十一椎下兩傍各一寸半。

白環俞在第二十一椎下兩傍各一寸半。

上窮在第一空腰果下一寸夾脊陷中。

次窮在第二空夾脊陷中。

中窮在第三空夾脊陷中。

下窮在第四空夾脊陷中。

會陽在陰尾骨兩傍。

○伏人脊中第三行十三穴第八
附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸。

魄戶在第三椎下兩傍各三寸。

神堂在第五椎下兩傍各三寸。

譙譙在肩膊內廉夾第六椎下兩傍各三寸。

膈關在第七椎下兩傍各三寸。

魂門在第九椎下兩傍各三寸。

陽綱在第十一椎下兩傍各三寸。

意舍在第十三椎下兩傍各三寸。

胃倉在第十五椎下兩傍各三寸。

肓門在第十七椎下兩傍各三寸。

志室在第十九椎下兩傍各三寸。

胞肓在第二十一椎下兩傍各三寸。

秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸。

○側人耳顙二十穴第九
頤厭在曲周顙顙上廉。

懸顙在曲周顙顙上廉中。

懸髻在曲周顙顙下廉。

天衝在耳上如前三寸。

曲鬢在耳上髮際曲隅陷中。

用孫在耳郭中間上開口有穴。

率谷在耳上入髮際一寸半。

和窮在耳前兌髮下動脈。

耳門在耳前起肉當耳缺。

聽會耳前陷中張口得之。

天容在耳下頰後。

聽宮在耳中珠子大如赤小豆。

天牖在頸筋缺盆天容後天柱前完骨下髮際上。云在耳上。

缺盆在肩上橫骨陷中。

天鼎在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半。

天憲在曲頰下扶突後動應手陷中。

扶突在曲頰下一寸人迎後。

人迎在頸大筋脉動應手夾結喉傍以候五藏氣不灸。

水突在頸大筋前直人迎下氣舍上。

氣舍在頸直人迎夾天突陷中。

○側脅十穴第十

章門一名長平在大橫外直臍季肋端。

京門在監骨腰中季肋本夾脊。

帶脉在季肋下一寸八分。

五樞在帶脉下三寸。一云在水道寸半。

維道在章門下五寸三分。

居窮在長平下八寸三分監骨上。

泉腋在腋下一寸宛宛中舉臂取之。

大包在泉腋下一寸。

輒筋在腋下一寸後前行一寸著脅。

天池在乳後一寸腋下一寸著脅直腋掘肋間。

○背脊中央直下第一行七穴第十一

天突在頸結喉下五寸中央宛宛中。

璇璣在天突下一寸陷中仰頭取之。

華蓋在璇璣下一寸陷中仰而取之。

紫宮在華蓋下一寸六分陷中仰而取之。

玉堂在紫宮下一寸六分陷中。

中庭在玉堂下一寸六分直兩乳間陷中。

○背脊第二行六穴第十二

俞府在巨骨下去璇璣傍各二寸陷中仰卧取之。

或中在俞府下一寸六分陷中仰卧取之。

神藏在或中下一寸六分陷中仰卧取之。

靈墟在神藏下一寸六分陷中仰而取之。

神封在靈墟下一寸六分。

步即即神封下一寸六分陷中仰而取之。

○背脊第三行六穴第十三

氣力在巨骨夾俞府兩傍各二寸陷中。

庫房在氣力下一寸六分陷中。

屋翳在庫房下一寸六分陷中。

膺窗在屋翳下一寸六分。

乳中不灸刺。

乳根在乳下一寸六分陷中。

○背脊第四行六穴第十四

雲門在巨骨下氣力兩傍各二寸陷中動脉應手舉臂取之。

中府在雲門下一寸乳上三肋間動脉應手陷中。

周榮在中府下一寸六分陷中。

膺鄉在周榮下一寸六分陷中。

天谿在膺鄉下一寸六分陷中。

食竇在天谿下一寸六分陷中舉臂取之。

○腹中央第一行十四穴第十五

鳩尾在臍前蔽骨下五分不灸刺。

巨關在鳩尾下一寸。

上管在巨關下一寸去蔽骨三寸。

中管在上管下一寸。

建里在中管下一寸。

下管在建里下一寸。

水分在下管下臍上一寸。

臍中不刺。

陰交在臍下一寸。

氣海在臍下一寸半。

石門在臍下二寸女子不灸。

關元在臍下三寸。

中極在臍下四寸。

曲骨在橫骨上中極下一寸毛際陷中。

○腹第二行十一穴第十六

幽門在巨關傍半寸陷中。

通谷在幽門下一寸陷中。

陰都在通谷下一寸。

石關在陰都下一寸。

商曲在石關下一寸。

育俞在商曲下一寸直臍傍五分。

中注在育俞下五分。

四滿在中注下一寸。

氣穴在四滿下一寸。

大赫在氣穴下一寸。

橫骨在大赫下一寸。

○腹第三行十二穴第十七

不容在幽門傍一寸五分去任脉二寸直四肋端相去四寸。

承滿在不容下一寸。

梁門在承滿下一寸。

關明在梁門下太上一寸。千金云梁門下五分

太一在關明下一寸。千金云太一在關明下一寸

滑肉門在太一下一寸。

天樞去育俞一寸半夾臍各二寸陷中。

外陵在天樞下大巨上。千金云在天樞下二寸

大巨在長谿下二寸。千金云在臍下二寸

水道在大巨下三寸。

歸來在水道下二寸。

氣衝在歸來下鼠臑上一寸。

○腹第四行七穴第十八

期門在第二肋端不容傍各一寸半上直兩乳。

日月在期門下五分。

腹哀在日月下一寸半。

大橫在腹哀下三寸直臍傍。

腸結在大橫下一寸三分。腹結

府舍在腸結下三寸。

衝門上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約中動脉。衝門

○手太陰肺經十九穴第十九

少商在手大指端內側去爪甲角如韭葉。

魚際在手大指本節後內側散脉內。

太泉在掌後陷中。

經渠在寸口陷中不灸。

列缺去腕上一寸半。

孔最在腕上七寸。

尺澤在肘中約上動脉。

俠白在天府下去肘五寸動脉。

天府在腋下三寸臂臑內廉動脈不灸。
臑會在手前廉去肩頭三寸。

○手陽明大腸經二十穴第二十一

商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉。

二間在手大指次指本節前內側陷中。

三間在手大指次指本節後內側陷中。

合谷在大指歧骨間。

陽谿在腕中上側兩筋間陷中。合谷在合

偏歷在腕後三寸。

溫留_{在腕後}小土五寸大土六寸。

下廉在輔骨下去上廉一寸。

上廉在三里下一寸。

三里在曲池下二寸按之肉起兌肉之端。

曲池在肘外輔屈肘曲骨之中。上云在肘

肘髻在肘大骨外廉陷中。

五里在肘上行馬裏大脉中不刺。肘上二寸云在

臂臑在肘上七寸腓肉端。

肩髃在肩端臑上斜舉臂取之。

秉風在夾天旁外肩上髃後舉臂有空。

肩井在肩_{上陷解中}缺盆上大骨前。

天竅在缺盆中上_{迷骨之際}陷中。

巨骨在肩端上行兩叉骨間陷中。

省髃在肩端兩骨間。

○手少陰心經八穴第二十一

少衝在手小指內廉之端去爪甲角如韭葉。

少府在手小指本節後陷中直勞宮。

神門在掌後兌骨之端陷中。

陰郤在掌後脉中去腕半寸。

通理在腕後一寸。

靈道在掌後一寸半。

少海在肘內廉節後陷中。

極泉在腋下筋間動脈入骨。

○手太陽小腸經九穴第二十二

少澤在手小指之端去爪甲一分陷中。

前谷在手小指外側本節前陷中。

後谿在手小指外側本節後陷中。

腕骨在手外側腕前起骨下陷中。

陽谷在手外側腕中兌骨之下陷中。

養老在手踝骨上一空在後一寸陷中。

支正_{在腕後}五寸。

小海在肘內大骨外去肘端五分陷中。

肩貞在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷中。

○手厥陰心主經八穴第二十三

中衝在手中指之端去爪甲如韭葉陷中。

勞宮在掌中央動脉。

內關在掌後去腕二寸。

大陵在掌後兩筋間陷中。

間使在掌後三寸兩筋間陷中。

郄門去腕五寸。

曲澤在肘後內廉下陷中屈肘得之。

天泉在曲腋下_{去臂二寸}舉腋取之。

關衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉

腋門在手小指次指間陷中

中渚在手小指次指後本節後間陷中

陽池在手表腕上陷中

外關在腕後一寸陷中

支溝在腕後二寸兩骨間陷中池云在陽

會宗在腕後二寸空中

三陽絡在臂上太支脉支溝上一寸不刺

四瀆在肘前五寸外廉陷中

天井在肘外大骨後一寸兩筋間陷中屈肘得之

清冷泉在肘上三寸伸肘舉臂取之

消灤在肩下臂外開腋斜肘分下行

天宗在秉風後大骨下陷中

臑俞夾肩節後大骨下甲上廉陷中

肩外俞在肩甲上廉去脊三寸陷中

肩中俞在肩甲內廉去脊二寸陷中

曲垣在肩中央曲甲陷中按之應手痛

○足太陰脾經十二穴第二十五

隱白在足大指端內側去爪甲角如韭葉

大都足大指本節後陷中

太白在足內側核骨下陷中

公孫在足大指本節後一寸

商丘在足內踝下微前陷中

三陰交在足內踝上三寸骨下陷中

漏谷在足內踝上六寸骨下陷中

地機在膝下五寸

陰陵泉在膝下內側輔骨下陷中伸足得之

血海在膝膕上內廉白肉際二寸

箕門在魚腹上越筋間動應手陰市內云在股

氣衝在陰股內動脉臑第三行中

○足陽明胃經十五穴第二十六

厲兌在足大指次指之端去爪甲角如韭葉

內庭在足大指次指外間陷中

陷谷在足大指次指外間本節後去內庭二寸

衝陽在足趺上五寸骨間去陷谷三寸

解谿在衝陽後一寸半腕上陷中

豐隆在外踝上八寸下廉胛外廉陷中

上廉在三里下三寸巨魁上

下廉在上廉下三寸巨魁下

條口在下廉上一寸

三里在膝下三寸胛外廉

犢鼻在膝膕下脣上夾解太筋中

陰市在膝上三寸伏兔下若拜而取之

伏兔在膝上六寸起肉

髀關在膝上伏兔後交分中

梁丘在膝上二寸兩筋間

○足厥陰肝經十一穴第二十七

大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中

行間在足大指間動應手陷中

太衝在足大指本節後二寸或一寸半陷中

中封在足內踝前一寸仰足取之伸足乃得

蠡溝在足內踝上五寸

中却足內踝上七寸胫骨中與少陰相直。

膝關在膝上三寸陷中。甲乙經

曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝而得之。

陰包在膝上四寸股內廉兩筋之間。

五里在陰廉下二寸。甲乙經云在陰廉下去

陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈。

○足少陽膽經十五穴第二十八

竅陰在足小指次指之端去爪甲角如韭葉。

俠谿在足小指次指歧間本節前陷中。

地五會在小指次指本節後陷中不灸。

丘墟在足外踝如前陷中去臨泣三寸。一云伸

臨泣在小指次指本節後間去俠谿一寸半。

付陽在足外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間懸鍾一名絕骨。

在外踝上三寸動者中。

光明在足外踝上五寸。外丘在足外踝上七寸。

陽輔在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分許去丘墟七寸。

陽交在足外踝上七寸斜量三陽分內間。

陽陵泉在膝下一寸外廉陷中。

陽關在陽陵泉上五寸犢鼻外陷中。

環跳在髀樞中側卧伸下足屈上取上足。一云髀樞中

中瀆在髀外膝上五寸分肉間陷中。

○足少陰腎經十一穴第十九

涌泉在足心陷中屈足捲指宛宛中。

然谷在足內踝前起大骨下陷中。

太谿在足內踝後跟骨上動脈陷中。

太鍾在足踝後。水泉去太谿下一寸在內踝下。

照海在足內踝下。

復溜在足內踝上二寸陷中。

交信在足內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間。

築賓在內踝上端分中。

陰谷在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝得之。

會陰在大便前小便後兩陰間。

○足太陽膀胱經十七穴第三十

至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉。

通谷在足小指外側本節前陷中。

束骨在足小指外側本節後陷中。

京骨在足外側大骨下赤白肉際陷中。

申脉在足外踝下陷中容爪甲。

金門在足外踝下名曰關梁。

僕參在足跟骨下陷中。

崑崙在足外踝後跟骨上陷中。一云在外踝後地有

承山在兌腠腸下分肉間陷中。

飛揚在足外踝上七寸。

承筋在腓中央陷中不刺。千金云在腓後從

合陽在膝約中央下二寸。

委中在膕中約文動脈。

委陽在足太陽後出于膕中外廉兩筋間承扶下。

浮郤在委陽上一寸展足得之。

殷門在肉郤下六寸。

扶承一名肉郤在尻臀下股陰下文。

○三陰三陽流注法

肺手太陰	少商	魚際	大泉	列缺	三指
大腸手陽明	商陽	二間	三指	合谷	陽谿
心主手厥陰	中衝	大陵	內關	五推	
心手少陰	少衝	神門			
小腸手太陽	少澤	前谷	後谷	腕骨	十八推
脾足太陰	隱白	大泉	公孫	商丘	
胃足陽明	厲兌	內庭	中衝	解谿	
肝足厥陰	大敦	中衝	中衝	中衝	
膽足少陽	足陽	陽泉	陽泉	陽泉	
腎足少陰	涌泉	涌泉	涌泉	涌泉	
膀胱足太陽	至陰	中衝	中衝	中衝	
三焦手少陽	天井	中衝	中衝	中衝	
右五藏六腑三陰三陽十二經脈					
原行經入合募前後法假令肺手太陰					
井流於魚際為榮注於大泉為俞過於列缺為原行於經					
渠為經入於尺澤為合募在中府俞在第三椎他皆倣此					
陽井為金	陰井為水	陽榮為水	陰榮為火	陽俞為木	陰俞為火
陽經為火	陰經為金	陽合為土	陰合為水		
婦人第一	法四十五首				
純子灸然谷五十壯	穴在內踝前一寸				
胞門閉塞純子灸關元三十壯	報之				
姙胎不成若墮胎腹痛滿胞見赤	灸胞門五十壯	關元左邊			
二寸是也右邊名子宮					
又灸氣門穴在關元傍三寸各五十壯	報之				
子藏閉塞不受精灸胞門五十壯					

總論不生漏赤白帶下三報之穴在橫骨當陰上
婦人氣痛堅硬產後惡露不止遂成結塊崩中斷緒日灸
二七至一百止
關元在石門下一寸主斷緒產道冷針入八分留三呼寫五
吸灸亦佳但不及針日灸一百止
崩中帶下因產惡露不止中極穴在關元下一寸婦人斷緒
最要穴四度針即有子若未有更針入八分留十呼得氣
即寫灸亦佳但不及針日灸三七至三百止
白崩中多少腹橫文當臍孔直下一百壯
又灸內踝上三寸左右各一百壯
帶下灸間使三十壯又淋小便赤赤道痛臍下結塊如瘻血
或因食得或因產得惡露不下遂為瘻或因月事不調
血結成塊皆針之如上
婦人遺尿不知時出灸橫骨當陰門七壯
姙不成數墮落灸玉泉五十壯三報之穴在
灸夾丹田兩邊相去各一寸名四瀆主月水不利貫血上下
并無子灸三十壯丹田在臍下二寸
婦人胞落癰灸臍中一百壯
水洩痢灸氣海百壯三報之
胞落癰灸身交五十壯三報之是臍下橫文中
又灸脊脊當臍五十壯
又灸玉泉五十壯三報之
又灸龍門二十壯三報之是陰中上外陰
胞下垂注陰下胞灸夾玉泉三寸隨年壯三報之
陰冷腫痛灸歸來三十壯三報之夾玉泉兩傍五寸

婦人經閉

初針兩手小指外側近爪甲深一分兩手腕門深三分兩手
天井深六分若欲試之先針一指即知之神驗不傳
婦人逆產足出針足太陰入三分足入乃出針穴在內踝後
白肉際陷骨宛宛中

橫產手出針太衝入三分急補自息去足大指奇一寸

胞衣不出針足太陽入四寸在外踝下後一寸宛宛中

又針足陽蹻入三分在足外踝下白肉際

產後脈絕不還針合谷入三分急補之又主胎上搶心

心陰中懷懷痛針勞宮入五分補之

心中懷懷痛針勞宮入五分補之

產後出汗不止針太衝急補之

產難月水不來橫生胎動皆針三陰交

胞衣不出或腹中積聚皆針胞門入一寸先補後寫去關元

左二寸

又針章門入一寸四分

子死腹中及難產皆針胞門

胎動及崩中下痢實氣上逆針丹田入一寸四分在臍下二寸

凡難產針兩肩井一寸寫之須臾即生也

漏胞下血不禁灸關元兩傍相去三寸百壯

婦人陰中痛引心下少腹絞痛灸外邊去一寸宛宛中

婦人下血洩瀉赤白漏血灸足太陰五十壯在內踝上三寸

百壯主腹中五寒

婦人漏下赤白月水不利灸委儀穴在內踝上五寸

婦人下血漏赤白灸營池四穴二十壯在內踝前後兩邊池

上脉一名陰陽

婦人漏下赤白四肢痠削灸漏陰三十壯穴在內踝下五分
微動脉上

婦人下赤白漏洩注灸陰陽穴隨年壯三報之在足拇指下
屈裏表頭白肉際

小兒驚癇第三法二十一首

曲澤主心下澹澹喜驚

陰交氣海大巨主驚不得卧

陰蹻主卧驚視如見星

大鍾郄門主驚恐畏人神氣不足

然谷陽陵泉主心中悚惕恐人將捕之

解谿主瘰癧而驚

少衝主太息煩滿少氣悲驚

行間主心痛數驚心悲不樂

陽谷主風眩驚主搖

厲兌主多卧好驚

掖門主喜驚妄言面赤

神門主數噫恐悸少氣

間使主喜驚瘡不能言

三間合谷主喜驚

陽谿主驚癇

通里主心下悸

大陵主心中澹澹驚恐

手少陰陰郄主氣驚心痛

天井主驚癇

後谿主淚出而驚

腕骨主煩滿驚

鼻病第四 法七種

鼻中擁塞針手太陽入三分在小指外側後一寸白肉際宛宛中。

顙一穴主鼻塞不聞香氣日灸二七至七百壯初灸時痛五十壯已去不痛七百壯還痛即止至四百壯漸覺鼻輕。

治鼻中息肉灸上星二百壯入髮際一寸。

又夾上星相去三寸各百壯。

衄時痔便灸足大指節橫理三毛中十壯刺者百壯衄不止灸之并主陰卵腫。

鼻衄不止灸涌泉二穴百壯。

灸鼻兩孔與柱七壯主鼻淨出不止。

舌病第五 法二十五種

重舌灸行間隨年穴在足大指歧中二穴。

小兒重舌灸左足踝上七壯。

又灸兩足外踝上三壯。

緊唇灸虎口男左女右七壯。

又灸承漿三壯。

牙齒痠灸兩手中指背第一節前有陷處七壯下火立愈。

齒痠灸外踝上高骨前交脉上七壯。

風牙痠逐左右以繩量手中指頭至掌後第一橫文折為四分以度橫文後當臂兩筋間當度頭灸三壯隨左右灸之。

兩相患灸兩臂至驗。

耳聾鳴客主人一名上關在聽會上一寸動脉宛宛中針入

一分主耳聾鳴如蟬。

又聾耳膿出亦宜灸日三壯至二百壯側卧張口取之。

又聽會在上關下一寸動脉宛宛中一名耳門針入三分主

耳聾耳中如蟬鳴通耳灸日五壯至七壯止十日後還依

前灸之慎生冷醋滑酒麪羊肉蒜魚熱食

又合谷在虎口後縱文頭立指取之宛宛中主耳聾聽覺然

如蟬鳴宜針入四分留三呼五吸忌灸慎洗手凡針手足

皆三日勿洗也。

耳風聾雷鳴灸陽維五十壯在耳後引耳令前絃筋上是耳聾不得眠針手小指外端近甲外角肉際入二分半補之

又針關衝入一分半補之

又針腕門在手小指次指骨間入三分補之

牙車失欠踉蹌灸第五椎日二七壯滿三百壯不差多氣衝二百壯骨前喉下寅骨中是

又灸足內踝上三寸宛宛中三百壯三報之

聽會主牙車急及脫臼相離二寸在上關下一寸一名耳門側卧張口乃得之針入三分留三呼得氣即寫不補耳灸

日五壯至七壯止十日後還依前灸慎生冷醋滑

又法下關在耳門下一寸宛宛中動脉際是也主牙車脫關

不得嚼食側卧開口取之針入四分與上同法灸數亦同忌熱食酒麪

頰車在耳下二韭葉宛宛中主牙車不開口嚙不言及牙疼

不得食牙頰腫側卧張口取之針入四分得氣即寫不補

宜灸日七壯至七七壯即止

喉痺針兩手小指爪文中出血三大豆許即愈左刺左右刺右

又手無名指甲後一韭葉名關衝主喉痺不得下食飲心熱

咽喉常以繆刺之患左刺右患右刺左也都患刺兩畔

咽喉酸辛灸少衝七壯雀矢大注

神門合谷主喉痺心煩

脚氣第六法三首論一首

初灸風市 次伏菟 次犢鼻 次膝目

次三里 次上廉 次下廉 次絕骨

凡八穴風市穴令病人起正身平立垂兩手直下舒十指掩著兩髀便點手中指頭犢鼻穴在膝上灸百壯逐輕重灸之輕者不可減百壯重者一穴五六百壯伏菟穴在病人累夫端坐以病人手夫橫掩膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外角平處以手按之得解解是一法云在膝頭下近外三骨其踵中動脚以手按之得解解是灸五十壯可至百壯膝目穴在膝頭下兩傍陷者宛宛中是灸百壯三里穴在膝頭骨節下一夫附胫骨外是一法云在膝頭骨節下三寸人有長短大小當以病人手夫度取灸百壯上廉穴在三里下一夫亦附胫骨外是灸百壯下廉穴在上廉下一夫亦附胫骨外是灸百壯絕骨穴在足外踝上一夫亦云四寸是灸百壯凡此諸灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中今盡壯數為佳凡病一脚灸一脚病兩脚便灸兩脚也凡脚弱病多著兩脚一方云覺脚便灸三里及絕骨各一處兩脚異者各四穴灸之多少逐病輕重大要雖輕不可減百壯不差速令以次灸之多則佳

脚疼三陰交三百壯神良一云灸絕骨最要論曰有人得之不以為事不覺忽然入腹腹腫心熱其氣大上遂至絕命當知微覺有異即須大灸之乃得應手即差亦依舊之法存灸之梁丘橫鼻三里上廉下廉解谿大衝陽陵泉絕骨崑崙陰陵泉三陰交足太陽復溜然谷涌泉承山東骨等凡一十八穴舊法多灸百會風府五藏六府俞募項來灸者悉覺引氣

向上慎不得灸以上大忌之

又灸足十指奇端去奇一分兩足凡八穴名曰八衝極下氣足十指端名曰氣端日灸三壯其八衝可日灸七壯氣下即止文莊須小作之

諸風第七法六十九首

肺中風者其人偃卧而背滿短氣冒悶汗出者肺風之證也視眼以下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治速灸肺俞百壯小兒戒之若色黃者此為肺已傷化為血矣不可復治其人當妄言撮空指地或自拈衣尋縫如此數日死者為急風所中便迷妄恍惚狂言妄語或少氣懶懶或不能言若不速治宿昔而死亦覺便灸肺俞膈俞肝俞數十壯急服續命湯可救也若延遲不止者既灸當與湯也

肝中風者但踞坐不得低頭遠兩眼連額微有青者肝風之證也若唇色青面黃尚可治急灸肝俞百壯急服續命湯若色大青黑者此為肝已傷不可復治數日而死

心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂冒絕汗出心風之證也若唇正赤尚可治灸心俞百壯急服續命湯若或青或白或黃或黑此為心已壞為水不可復治旬日死六云五

脾中風者其人但踞坐而腹滿視身通黃口吐鹹汁尚可治灸脾俞百壯急服續命湯若目下青手足青不可復治

腎中風者其人踞坐腰痛視脊左右未有黃色如餅染大尚可治灸腎俞百壯急服續命湯若齒黃赤髮髮直面上色不可復治

大腸中風者卧而腸鳴不止灸大腸俞百壯服續命湯論曰凡風病內外沈浮者內是五藏外是皮膚沈是骨髓浮是血脉若在腠理湯藥所及若在五藏酒醪所至若在血脉

針灸所中深在骨髓病謁自云不能如何

風痺者卒不能言口噤手不隨而強直灸法度病者手小指

內歧間至指端為度以置臍一直望心下丹注度上端畢又

作兩度續在注上合其下開上取其本度續置其開上合二

合其狀如倒作人字形也男度右手女度左手嫌不分明故

以丹注二處起火各百壯夫眼瞤動口偏喎舌不轉者灸口

吻邊橫又赤白際逐左右隨年壯三報之不差更報

肝風占候口不能言灸臍下人中次大椎次肝俞各五十壯

心風灸心俞各五十壯

脾風灸脾俞各五十壯

脾風占候言聲不出或手上下灸手十指頭次人中次大椎

兩耳前脉去耳門上下行一寸次兩大指節上下六穴各

七壯

卒中風口喎以筆筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麝香

塞勿令洩氣一頭內大豆一顆并艾燒之令然灸七壯差患

右灸左患左灸右千金不傳 ○ 又灸手交脉三壯左灸

右右灸左其炷如鼠矢橫安之兩頭放火燒之

凡卒中風口噤不得開灸頰車二穴穴在耳下八分小近前

灸五壯即得語又隨年壯口僻左右灸之

凡戶厥如死脉動如故針百會入二分補之灸鬢兩脅又針

足中指頭去甲如韭葉又針足大指甲下肉側去甲二分

先灸天窓五十壯訖息火乃移灸百會五十壯畢還灸天窓

五十壯若初發先灸百會則風氣不得洩內攻五藏當閉伏

更失音也所以先灸天窓次灸百會乃佳一灸五十壯息火

洩氣復灸之視病輕重者處各三百壯輕者以意云云

得二百壯即灸二里三壯若五壯以下氣

凡一切中風服藥益劇者但是風穴皆灸之三壯神良

欲除根本必須火艾專恃湯藥則不可差

灸用弓反張

臂青眼戴用弓反張始覺發動即灸神庭七壯穴在當鼻直

上髮際

次灸曲差二穴各七壯穴在神庭兩傍各一寸半

次灸上關二穴各七壯穴在耳前廉起骨陷中一名客主人

次灸下關二穴各七壯穴在耳前動脉下空下廉陷中

次灸頰車二穴各七壯穴在耳下曲頰端陷中

次灸廉泉二穴各七壯穴在當頤直下骨後陷中

次灸顙會一穴七壯穴在神庭上一寸

次灸百會一穴七壯穴在當頂上正中中央

次灸本神二穴各七壯穴在耳直上入髮際二分

次灸天柱二穴各七壯穴在項後大筋外入髮際陷中

次灸陶道一穴七壯穴在大椎節下間

次灸風門二穴各七壯穴在第二椎下兩傍各一寸半

次灸心俞二穴各七壯穴在第五椎下兩傍各一寸半

次灸肝俞二穴各七壯穴在第九椎下兩傍各一寸半

次灸腎俞二穴各七壯穴在第十四椎下兩傍各一寸半

次灸膀胱俞二穴各七壯穴在第十九椎下兩傍各一寸半

次灸曲池二穴各七壯穴在肘外曲頭陷中屈肘取之

次灸肩髃二穴各七壯穴在兩肩頭止中兩骨間陷中

次灸支溝二穴各七壯穴在手腕後二寸兩骨間陷中

次灸合谷二穴各七壯穴在手大指虎口兩骨間陷中

次灸間使二穴各七壯在掌後三寸兩筋間

次灸陽陵泉二穴各七壯在膝下骨前陷中

次灸陽輔二穴各七壯在外踝上絕骨陷中

次灸崑崙二穴各七壯在外踝後跟骨上陷中

右以前主灸風卒風緩急諸風發動不自覺知或心腹脹滿或半身不遂或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或舉身冷直或煩悶恍惚喜怒無常凡有風皆灸之神驗單交頰中一穴

針入六分得氣即寫留三呼寫五吸不補亦宜灸然不如針此主癰風角弓反張羊鳴大風青風面風如蟲行卒風多睡

健忘心中憤憤口噤閉而不言人黃疸急黃八種大風此之一穴皆主之莫不神驗酒後生大醋滑猪魚肝養麥藥水

凡風灸上星二百壯又前頂二百壯百會一百壯腦戶二百壯

凡大風灸百會七百壯

凡百諸風灸大椎平處兩相二寸三分以病人指寸量之各一百壯

治風耳後入分半有穴灸一切風若狂者亦灸上防風百壯

治卒病惡風欲死不言及肉痺不知人灸第五椎名曰臑會

各一百五十壯

扁鵲曰凡心風灸心俞各五十壯第五節對心是也

肝俞主肝風腹脹食不消化吐血酸削四肢羸露不欲食鼻

衄目眴眴眴眉頭脅下痛少腹急灸百壯

大腸俞主風腹中雷鳴大腸瀉涕腸澼痢食不消化少腹

絞痛腰脊痠強大小便難不能飲食灸百壯三報之

治卒中惡悶熱毒欲死灸足大指橫文隨年壯若筋急不能

行者若內筋急灸內踝上三十壯外筋急灸外踝上三十壯

愈若戴睛上掉者灸兩目後皆二十七壯

若不識人灸季肋頭七壯

若不識人灸季肋頭七壯

若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一橫理十四壯

腋門二穴主風灸五十壯亦可九壯

治風身重心煩足腰疼灸絕骨百壯在外踝上三寸

凡卒中風口噤不開灸機關二穴在耳下八分近筋灸五壯

即愈二云隨年壯僻者逐左右灸之

治頭風搖動灸腦後王枕中間七壯

治瘰癧風偏風半身不隨法

肩髃主偏風半身不隨熱風頭風刺風手不上頭扳物不得

挽弓不開臂冷酸疼無力針入八分留三呼寫五吸在膊骨

頭陷中平手取之偏風不隨可至二百壯過多則臂強慎酒

肉五辛熱食漿水

又針曲池入七分得氣即寫然後補之太宜灸日十壯至一

百壯止十日更報下少至二百壯

又針列缺入三分留三呼寫五吸亦可灸之日七壯至一百

總至三百壯

陽池上一夫兩筋間陷中主刺風熱風耳聾鳴手不仁冷風

手戰偏風半身不隨陽池支溝下一夫覆腕當文宛宛中亦

灸法退風半身不隨法

先灸天窓次大門腦後尖骨上一寸次承漿次風池次曲池
次手顙孔腕後尖骨頭宛宛中次手陽明大指奇後次脚五
指屈兩脚膝腕次脚顙孔足外踝後一寸次足陽明足拇
指奇三寸各灸百壯若有手足患不隨灸百會次本神次肩
髃次心俞次手少陽次足外踝下各灸八外並依左右五百壯
面上游風如蟲行習習然起則頭旋眼暗頭中溝壑起灸天
窓次兩肩上一寸當腫人次曲眉在兩眉間次手陽明次足
陽明各灸二百壯

時行法第八法四首

初得一日二日但灸心下三處第一去心下一寸名巨關第
二去心下二寸名上管第三去心下三寸名胃管各灸五十
壯狀或人形小大不同恐寸數有異可以繩度之隨其長短
寸數最佳取繩從心骨鳩尾頭少度至臍孔中屈之取半當
繩頭名胃管又中屈更為二分從胃管向上度是上管上度
取一分是巨關大人可五十壯小兒可一七二七壯隨其年
灸以意量之

若病者三四日以上宜先灸心下二十壯以繩度鼻正上盡
髮際中屈繩斷去半便從髮際度入髮中灸繩頭名天窓又
灸兩顙顙又灸風池又灸肝俞百壯餘處各二十壯

又灸太衝二十壯神驗無比

腕肉瘡灸兩手腕研子骨尖上三壯男左女右

黃疸第九法一十一首

脣裏上當承漿邊通齒斷針三鈹治馬黃黃疸
顙顙在胃眼尾中間上下有來去絡脈是針灸之治治氣溫病
夾人中火針治馬黃疸通身並黃語音已不轉者

灸錢孔百壯度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治黃疸
夾承漿兩邊各一寸治馬黃急瘕

灸太衝七壯灸臍中

又灸風府熱府肺俞心俞肝俞脾俞腎俞男陰經拔陰反向
上灸治馬黃黃疸若女人玉門頭是穴針灸無在

脚跟在白肉後際針灸隨便治馬黃黃疸

臂石子頭還取病人手自捉臂從腕中大淵文向上一夫接
白肉際灸七壯治馬黃黃疸

黃疸灸第七推七壯黃汁出

瘧病第十法一十三首

瘧灸上星及大椎至發時令瀉百壯艾炷如黍米粒俗人不
解務大炷

又覺小異灸百會七壯若更發更七壯極難差不過三灸
又灸風池二穴三壯

又灸腎俞百壯

又灸三間在虎口第一指節下一寸三年瘧欲發即下火
治一切瘧無問處所仰卧以繩量兩乳間中屈從乳向下灸

度頭隨年壯男左女右

治瘧刺足少陰出血愈

治諸瘧而脉不見者刺十指間見血去必已先視身赤如
小豆者皆取之

瘧日西發者臨泣主之

瘧實則腰背痛虛則鼻衄飛揚主之

瘧多汗腰痛不能仰卧目如脫項如拔崑崙主之

灸一切瘧尺澤主之

凡瘧有不可差者從未發前灸大椎至發時瀉百壯無不差
千金翼方卷第二十六

千金翼方卷第二十七

針灸中

肝病第一 五十一法

治眼目法

攢竹主目視不明眈眈目中熱痛及瞶。針入一分留二呼寫三吸徐徐出之。忌灸。宜出血塗鹽。

膚腎白膜覆瞳人目闇及眇。雀目冷淚目視不明。灸肉出背針睛明。入一分半。留三呼寫五吸。冷者先就後寫。後寫之雀目者可久留十吸然後速出。

視眼喝不正口喝目瞶面動。棄棄然眼赤痛目眈眈冷熱淚目瞶赤。皆針承泣在目下七分。匡骨中當瞳子直下陷中入二分半得氣即寫。忌灸。

目闇不明。鍼中渚入二分留三呼寫五吸。灸七壯。注如雀失大在手小指次指本節後。開目偏風。眼喝通睛耳聾。鍼客主人一名上關。入一分久留之。得氣即寫。亦宜灸。目三七壯至二百壯。注如細竹筋大側目張口取之。眼暗灸大椎下第十節正當脊中。二百壯。唯多佳。可以明目。神效。灸

滿十壯不假湯藥。

肝勞和氣。眼赤。灸當容一百壯。兩邊各爾。在眼後耳前三陰二陽之會。處以手按之。有上下橫脈是。與耳門相對也。

肝俞主目不明。灸一百壯。小兒寸數對酌。灸可一二七壯。

治目急痛不可遠視。灸當瞳子上入髮際一寸。隨年壯。

灸之。

治風障赤。灸人中。量壯二壯。仰卧灸之。

治目生翳。灸大指節。灸三壯。左右灸之。

治眼暗若一眼暗。灸膝後節前陷中。兩眼暗。兩手俱灸。隨年壯。

治溫病後食五辛。即不見物。遂成雀目。灸第九椎名肝俞。二百壯。求差。

治脚轉筋。鍼內崑崙穴。在內踝後陷中。入六分。氣至寫之。又灸承山。隨年壯。神驗。

第三十一推主腰背不便。筋轉痺。灸隨年壯。

治失精。筋變陰縮。入腹相引。痛灸中封五十壯。又下廉灸五十壯。兩脚一百壯。此二穴亦主喉腫。喉逆五藏所苦。鼓脹。悉主之。老人加之五十以下。及小兒並隨年壯。

治轉筋。脛骨痛不可忍。灸屈膝下廉橫筋上三壯。

少腹堅大如盤。主胃腹中脹滿。飲食不消。婦人癥聚。癰瘕。灸三焦俞百壯三報之。

灸內踝後宛宛中。隨年壯。灸氣海百壯。

久冷及婦人癥瘕。腸鳴泄痢。繞臍絞痛。灸天樞百壯三報之。勿鍼臍旁各二寸。

積聚堅。痛癢。灸脾募百壯。章門是也。

治瘕瘕。患左灸左。患右灸右。第一屈肋頭近第二肋下。即是

灸。第二肋頭近第三肋下。向肉翅前。亦是。灸。初日灸二次。日五後。七周而後。始至十止。唯忌大氣餘不忌。

先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動也從甲骨上角莫索至甲骨下頭其間當有四肋三間灸中間依甲骨之裏去甲骨各刺指許摩脂去表助間空處按之自覺牽引有中灸兩甲內各一處至六百壯多至千壯數百壯當氣下重痛發流火當有所下若停痰宿疾亦必下也此灸無所不治主諸風癱瘓虛勞夢中失精上氣數逆及狂惑妄言皆有大驗若病人已困不能正坐當令側卧按上臂令前索孔穴灸之求穴大較以右手從左肩上一指指頭表所不及者是也左手亦然及以前法灸若不能久正坐伸兩臂者亦可伏衣樓上伸兩臂令人挽兩甲骨使相遠不爾甲骨覆穴不可得也所伏衣樓當令大小有常不爾則前却失其穴也此穴灸後令人筋氣當消息自養令得平復其穴近第五椎相準望求索

風勞灸腦戶

頭重風勞灸腦戶五壯鍼入三分補之
 頭重不能勝灸腦戶下一寸半
 身體重四肢不能自持灸脾俞隨年壯鍼入五分補之
 身體嗜眠不自覺灸天府五十壯鍼入三分補之
 身重灸水分百壯鍼入一寸補之
 體重四肢不舉灸天樞五十壯忌鍼
 身重腫坐不欲起風勞脚疼灸三里五十壯鍼入五分補之
 又灸足太陽五十壯鍼入三分補之
 臂重不舉灸肩井隨年壯可至百壯鍼入五分補之
 又灸足澤三十壯鍼入三分補之
 第一椎名大杼無所不主使左右一寸半或一寸二分主頭項痛不得顧背中煩急灸隨年壯

諸煩熱時氣溫病灸大椎百壯鍼入三分寫之橫三間寸灸之

心煩上氣灸肺俞鍼入五分

心煩短氣灸小腸俞

又灸巨闕期門各一百壯鍼入五分

又灸心俞百壯鍼入五分

頭身熱灸胃管百壯勿鍼

煩悶憂思灸大倉百壯

煩熱頭痛鍼虎口入三分

煩躁恍惚灸間使三十壯鍼入三分

骨熱煩骨痛氣悶鍼三里入五分

身體煩熱鍼中府 又灸絕骨五十壯

左手關上陽絕者無膈脉也苦口中無味眩暈苦恐畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大指間或刺三毛中

左手關上陽實者膈實也苦腹中不安身軀習習刺足少陽

治陽在足第二指本節後一寸

俠膈俞傍行相去五寸名濁治主胃中膈病隨年壯

膈虛灸足內踝上一夫名三陰交二十壯

治吐血

虛勞吐血灸胃管三百壯亦主嘔逆吐血少食多飽及多睡

百病

凡口鼻出血者名曰腦衄灸上星五十壯

吐血唾血灸胃管百壯忌鍼

吐血腹痛雷鳴灸天樞百壯

吐血唾血上氣欬逆灸肺俞隨年壯

吐血酸削交肝俞百壯

吐血嘔逆交手心主五十壯大陵是

吐血交頸項上二十七壯

心病第三一十八法

心俞各灸二十七壯主心病老小減之不能食胃中滿膈上逆氣悶熱皆灸之

卒心疝暴痛汗出刺大敦左取右右取左男左女右刺之出血立已

俠巨關兩邊相去各半寸名曰上門主胃中痛引腰背心下嘔逆而無滋潤各灸隨年壯

凡顏色焦枯勞氣失精有皆痛手不得上頭灸肩髃百壯穴在肩外頭近後以手按之有解宛宛中

當心下一寸名巨關主心悶痛上氣引少腹灸二七壯脉不出鍼不容兩穴在幽門兩傍各一寸五分

健忘忽忽鍼間使入五分後三寸

心裏懷懷微背痛遠灸心俞百壯

心痛如錐刀刺氣結灸肝俞七壯

心痛冷氣上鳩尾上二寸半名龍領灸百壯不鍼

心痛惡氣上脅痛急灸通谷五十壯在乳下二寸

心痛暴惡氣又心灸巨關百壯

心痛背脊痛灸期門隨年壯

心痛堅煩氣結灸太倉百壯

心痛暴絞急欲絕灸神府百壯附鳩尾正當心有忌

背痺心痛灸膏中百壯忌鍼兩乳間

心痛灸臂腕橫文三七壯

心痛灸兩虎口白肉際七壯

小腸病第四一十一法

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦膺痺少腹中有疝瘕主月即冷上搶心刺手心主治陰在掌後橫文中入一分

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急熱痺小腸內熱小便赤黃刺手太陽治陽在手第二指本節後一寸動脉

俠中管兩邊相去一寸名魂舍灸一百壯主小腸熱病

俠臍兩邊相去一寸名魂舍灸一百壯主小腸洩利膿血小兒減之

又灸小腸俞七壯

以繩橫度口至兩邊既得度口之寸數便以繩一頭更度鼻盡其兩邊兩孔間得鼻度之寸數中屈之取半合於口之全

度中屈之先寬頭上廻髮當廻髮中灸之以度度四邊左右前後當繩端而灸前以面為正並依年壯多少一年凡三灸

皆須瘡差又更灸之壯數如前若速灸火氣引上其數處廻髮若則灸其近當鼻也若廻髮近額者亦宜灸若指面為癢則關其面處然病重者亦不得計此也

灸陰莖上宛宛中三壯得小便通即差當尿孔上是宛

又灸陰莖頭三壯

又灸乳頭三壯

又灸足大指上聚毛中七壯

又灸督脉三十壯在直鼻人中上入髮際三報之

又灸天窓百會各漸灸三百壯炷惟小作

又灸耳上髮際各五壯

鼻下人中及兩手足大指爪甲令艾炷半在爪上半在肉上

七炷不止十四壯炷如雀天大作之。

狂鬼語賊其足大姆指爪甲下入少許即止

治大人癲小兒驚風法

灸背第二椎及下窮骨兩處以繩度中折繩端一處是脊骨

上也凡三處畢復斷此繩作三折令各等而參合如人字

以一角注中央灸下二角俠脊兩邊便灸之凡五處也以

丹注所灸五處各百壯削竹為度勝繩也

狂風罵詈掘研人名為熱陽風灸口兩吻邊燕口處赤白際

各一壯

又灸陰囊縫三十壯令人立以筆正注當下已卧却核卵令

上乃灸之勿令近前中邪核恐害於陽氣也

治狂言鬼語法

以懸帶急合縛兩手大指便灸左右骨當對出肘頭兩處火

俱下各七壯須更鬼語自道姓名亡去徐徐語問乃解其

手

狂癩不識人癩病眩亂灸百會九壯。

狂走癡癡灸玉枕上三寸一法頂後一寸百壯。

狂和鬼語灸天窓九壯。

又灸口吻十五壯。

狂癩哭泣灸手逆注三十壯在手腕後六寸。

狂走驚癡灸河口五十壯在手腕後陷中動脈此與陽明同

也。

狂癩風癩吐舌灸胃管百壯不銕

又灸大幽一百壯

又灸季肋端三十壯千金云云

狂言恍惚灸天樞百壯

又灸間使三十壯千金云云

狂走喜怒悲泣灸巨髕隨年壯在臂上俠內側反手所不及

者骨上尤上六分捻之痛是也解命云

狂和驚癡灸承命三十壯在內踝後上行三寸動脈上

又灸巨陽五十壯千金云云

又灸足太陽五十壯千金云云

又灸足少陽隨年壯千金云云

又灸足陽明三十壯千金云云

狂走癡癡如死人灸足大敦九壯千金云云

狂走罵詈灸八會隨年壯在陽明下五分

狂癩驚走風恍惚瞋喜罵詈哭鬼語吐舌灸上星腦戶

風池手太陽陽明太陰足太陽陽明陽蹻少陽太陰陰蹻

足跟悉隨年壯

驚怖心忪少力灸大橫五十壯

和鬼妄語灸懸命一十四壯在口脣裏中央絃絃者是一名

鬼祿一法以鋼刀決斷絃乃佳

狂和鬼語灸伏兔百壯

又灸惡門五十壯千金云云

悲泣鬼語灸天府五十壯

狂和發無常披頭大喚欲殺人不避水火者灸間使男左女

右隨年壯

狂走刺人或欲自死罵詈不息稱鬼神語灸口吻頭赤白際

一壯

又灸兩肘內屈中五壯

又灸背脾中間三壯報之

驚狂走灸內踝上三寸近後動脈上七壯

和病四肢重痛諸雜候尺澤主之一名鬼堂

和病語不止及諸雜候人中主之一名鬼市千金云一名鬼市中

先拍掌

和病臥冥冥不自知風府主之一名鬼宛

和病大喚罵是十指端去爪一分主之一名鬼城

和病鬼癲臂上主之一名鬼門并主四肢重

和病大喚罵走三里主之一名鬼邪

勞宮一名鬼路

陽澤一名鬼臣

耳前髮際死中名鬼床

尺中動脈名鬼受

足太陽名鬼路

癲狂二三十年者灸天窻穴有并次風門次肝俞次腎俞次

手心七次曲池次足五冊次涌泉各五百壯日七壯

鍼印

凡百邪之病源起多矣其有種種形相示表類如之端而見

其病或有默然而不識其或復多言而謔語或歌或哭或笑或

吟或眠坐溝渠噉食糞穢或露形體或晝夜奔走或嘔罵

無度或是飛蠱精靈手亂目急如斯種種癲狂之人今鍼灸

與方藥並主治之

扁鵲曰百邪所病者鍼有十三穴用鍼之體先從鬼宮起次

鍼鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併鍼止五六穴即可知

矣若是邪蠱之精便自言論其由來往驗有實立得精靈

未必須盡其命求去與之男從左起鍼女從右起鍼若數更

不言便遍鍼也依訣而行鍼灸等處並備主之

第一切下鍼從人中名鬼宮在鼻下人中左邊下鍼出右邊

第二次下鍼手大指爪甲下三分名鬼信入肉三分

第三次下鍼足大指爪甲下入肉二分名鬼壘五指皆鍼

第四次下鍼在掌後橫文入半解名鬼心

第五次下鍼在外踝下白肉際火鍼七銍銍三下名鬼路

第六次下鍼入髮際一寸大椎以上火鍼七銍銍三下名鬼

枕

第七次下鍼去耳垂下五分火鍼七銍銍三下名鬼床

第八次下鍼承漿從左刺出右名鬼市

第九次下鍼從手橫文三寸兩筋間鍼度之名鬼路此名間

使

第十次下鍼入髮際直鼻上一寸火鍼七銍銍三下名鬼堂

第十一次下鍼陰下縫灸三壯女人玉門頭三壯名鬼藏

第十二次下鍼尺澤橫文中內外兩文頭接白肉際七銍銍

三下名鬼臣此名曲池

第十三次下鍼去舌頭一寸當舌中下縫刺貫出舌上仍以

一板橫口吻安鍼頭令舌不得動名鬼封

右以前若是手足皆相對鍼兩穴若是孤穴即單針之

灸風

灸間使隨年壯

又灸承漿七壯三報之

又灸心俞七壯

又灸三里七壯

又灸入髮際一寸百壯 灸間使手心各五十壯

又灸手大指急縛大指灸合間二七壯當狐鳴而愈

脾俞主四肢寒熱腰疼不得俛仰身黃腹滿食嘔舌根直并

灸推上三穴各七壯

治小大便失禁

灸助脚大指去甲一寸三壯。又灸大指奇間各三壯。

又灸下三壯。又灸橫文百壯。

治大便難

灸第七椎兩傍各一寸七壯。

灸俠下泉相去二寸半名腸遺隨年壯一云。

又灸承筋二穴三壯。又灸大都隨年壯。又灸大敦四壯。

腹中熱閉時大小便難腰痛連脊灸團岡百壯在小腸俞下。

二寸橫三間寸灸之。

大便閉塞氣結心堅滿灸右門百壯。

大小便不利欲作腰痛灸榮衛四穴各百壯在背脊四回各。

一寸。

大小便不利灸八節百壯在腰目下三寸俠脊相去四寸兩。

邊各四穴。

小兒大小便不通灸口兩吻各一壯。

小便不利大便數洩注灸崑崙端五十壯。

又灸天樞百壯在俠臍相去各二寸魂魄之舍不可下鍼云。

治大便下血

灸第二十椎隨年壯。

赤白下痢灸窮骨頭百壯多多益佳。

食不消化洩痢不作肌羸灸脾俞隨年壯洩注五痢便膿血。

重下腹痛灸小腸俞百壯洩痢久下失氣勞冷灸下腰百。

壯三報之在八魁正中脊骨上灸多益佳三宗骨是忌鍼。

少腹絞痛洩痢不止灸丹田百壯三報之在臍下二寸鍼。

入五分。

下痢不嗜食食不消灸長谷五十壯三報之在俠臍相去五寸一名循際。

下痢赤白灸足太陰五十壯三報之。

又冷五痔便血灸脊中百壯。

五痔便血失屎灸迴氣百壯在脊窮骨上赤白下灸窮骨椎。

多為佳。

久痢百治不差灸足陽明下一寸高骨之上中去大指奇間。

三寸灸隨年壯。

又灸關元三百壯十日灸并治冷痢腹痛。

又先屈竹量正當兩膀脊上點記下量一寸點兩傍各一寸。

復下量一寸當脊上合三處灸三十壯灸百壯以上。

切痢皆差亦主疳瀉脊上當膈點處不多。

又灸膈中稍稍至二三寸壯。

胃病第六十三壯法。

治胃補胃灸胃俞百壯主胃中寒不能食食多身羸腹脹鳴。

腹滿胃脹。

灸三焦俞主五藏六腑積聚心腹滿腰脊痛飲食不消吐逆。

寒熱往來小便不利羸瘦少氣隨年壯。

又灸心下一寸名胃管百壯至千壯佳。

小腸俞主三焦寒熱灸隨年壯。

治胃中熱病膝下三寸名三里灸三十壯。

反胃食即吐上氣灸兩乳下各一寸以差為度。

又灸臍上一寸二十壯。

又灸內踝下三指稍斜回則有穴三壯。

臌脹脅腹滿灸臍俞百壯三報之。

脹滿水腫灸脾俞隨年壯三報之

脹滿管鳴灸大腸俞百壯三報之

脹滿氣聚寒灸胃管在心鳩尾下三寸百壯三報之

脹滿繞臍結痛堅不能食灸中脘百壯在臍上一寸一名水穴

脹滿腹聚滯下疼灸氣海百壯在臍下一寸忌鍼

脹滿氣如水腫狀少腹堅如石灸膀胱募百壯在中極臍下

四寸

脹滿腎冷瘕聚洩利灸天樞百壯

胃滿心腹積聚痞瘕瘕瘕肝俞百壯

灸法

乾嘔不止所食即吐不停灸間使三十壯若四厥脉沈絕不

至者灸之便通此法起死人

又灸心主尺澤亦佳

又灸乳下一寸三十壯

凡噦令人惋恨灸承漿柱如麥大七壯

又灸臍下四指七壯

治卒噦灸中府胃管各數十壯灸尺澤巨關各七壯

灸法

吐逆不得食灸心俞百壯

吐逆不得下食今日食明日吐灸膈俞百壯

卒吐逆灸乳下一寸七壯

吐變不下食灸胃管百壯

又灸巨關五十壯

又灸胃管百壯三報之

又灸脾募百壯一名章門在大橫外直臍旁肋端三報之

嘔吐宿汁吞酸灸神光一名臍募百壯三報之

期門下

嘔吐效逆霍亂吐血灸手心主五十壯

噎噦膈中氣閉塞灸腋下一聚毛下附肋旁中五十壯神良

噎噦嘔逆灸石關百壯

肺病第七 四十五法

肺脹氣搶脅下熱痛灸使胃管兩邊相去一寸名陰都隨年

壯

又刺手太陰出血主肺熱氣上數噦寸口是也

肺脹脅滿嘔吐上氣等灸大椎并兩乳上第三肋間各三壯

凡肺風氣痿絕四肢脹滿喘逆胃積灸肺俞各兩壯肺俞對

乳引繩度之

肺俞主喉痺氣逆欬嗽口中涎唾灸七壯亦隨年壯可至百

壯

嘔吐上氣灸尺澤在肘中不三則七

腹中雷鳴相逐食不化逆氣灸上管下一寸名太倉七壯

灸法

章門一名長平二穴在大橫外直臍旁肋端主奔豚腹腫灸

百壯

又灸氣海百壯在臍下一寸半

又灸關元五十壯亦可百壯在臍下二寸

中極一名玉泉在臍下四寸主奔豚搶心不得息灸五十壯

心中煩熱奔豚胃氣脹滿不能食鍼上管入八分得氣即寫

若心痛不能食為冷氣宜先補後寫神驗灸之亦佳日二

七至一百止不差倍之大忌房室

奔豚冷氣心間伏梁狀如覆杯冷結諸氣鍼中管入八分留

七時在上管下一寸寫五吸疾出鍼須臾日二七壯至四

百止慎忌房室

壯并主上氣

呼吸炎兩出時裏大橫文下頭隨年壯

上氣欬逆短氣氣滿食不下灸肺募五十壯

上氣欬逆短氣風勞百病灸肩井二百壯

上氣短氣欬逆背微痛灸風門熱府百壯

上氣欬逆短氣背滿多唾唾血冷疼灸肺俞隨年壯千金云

上氣氣悶欬逆咽塞聲啞喉中猜猜灸天瞿五十壯一名天突

上氣背滿短氣灸雲門五十壯

上氣欬逆背痺微背痛灸背堂百壯忌刺

上氣欬逆灸中五十壯

上氣欬逆背滿五氣牽背微痛灸巨闕期門各五十壯

灸灸手屈臂中有橫文外骨撿頭得痛處二十七壯

又內踝上三寸絕骨宛宛中灸五十壯主欬逆虛勞寒損憂

志筋骨疼痛又主心中欬逆或注腹痛喉痺或頸滿腸痔

逆氣痔血陰急羣細骨瘡大小便澀羣中乾燥煩滿狂易

走氣凡二十二種病皆當灸之也

論曰凡上氣有服吐藥得瘥亦有鍼灸得除者宜深體悟之

諸結積留飲癖囊

諸結積留飲癖囊胃滿飲食不消灸通谷五十壯

又灸胃管二百壯三報之

心下堅積聚冷熱腹脹灸上管百壯三報之

腎病第九一十四法

對臍當脊兩邊相去各一寸五分名腎俞主腎間風虛各灸

百壯

治小便赤痛法

灸第七椎兩傍三十壯

又灸第十椎兩傍三十壯

又灸陽陵泉陰陵泉各隨年壯

灸第十九椎兩傍各三十壯

夢泄精炎中封五十壯

男女夢與人交洩精三陰灸灸五壯喜夢泄神良

丈夫夢失精小便濁難灸腎俞百壯

男子陰中疼痛尿血精出灸列缺五十壯失精五藏虛竭灸

屈骨端五十壯陰上橫骨中央宛曲如却月中央是也一

名橫骨

男子失精陰上縮莖中痛灸大赫三十壯在俠屈骨端三寸

男子腰脊冷疼小便白濁灸脾募百壯

男子失精陰縮灸中封五十壯

第二十一椎主腰背不便筋攣痺縮虛熱閉塞灸隨年壯兩

傍各一寸五分

小腸俞主小便不利少腹脹滿虛之灸隨年壯

骨體冷疼灸上廉七十壯三里下三寸

治腰卒痛

腰卒痛去窮脊上一寸灸七壯

腎俞主五藏虛勞少腹弦急脹熱灸五十壯若小損之若虛

冷可至百壯橫三間寸灸之腰痛不得動者令病人正立

以竹杖拄地度至臍取杖度背脊灸杖頭處隨年壯良灸

訖藏竹杖勿令人得之丈夫痔下血脫肛不食長淺瘰癧婦

人崩中去血帶下淋露去赤白雜汁皆灸之此俠兩傍各

一寸橫三間寸灸之腰痛灸足跟上斜文中白肉際十壯

又灸巨陽十壯巨陽在外踝下

又灸腰目宛在尻上約左右是
又灸八節及外踝上骨約中

膀胱病第十三法

灸轉胞法

玉泉主腰痛小便不利若胞轉灸七壯

第十七椎灸五十壯

又灸臍下一寸

又灸臍下四寸各隨年壯

第四椎名厥陰俞主背脊中氣積聚好吐隨年壯灸之

使屈骨相去五寸名水道主三焦膀胱腎中熱氣隨年壯屈

骨在臍下五寸屈骨端水道使兩傍各二寸半

使臍傍相去兩邊各二寸半各大橫主四肢不可舉動多汗

洞痢灸之隨年壯

第十五椎名下極俞主腹中疾腰痛膀胱寒痺飲注下隨年

壯灸之

小腸俞主膀胱三焦津液下大小腸寒熱赤白洩洞痢腰脊

痛又主小便不利婦人帶下灸之各五十壯

小腸俞主三焦寒熱一如灸腎法

灸霍亂法

凡霍亂灸之或雖未即差終無死憂不可逆灸或但先腹痛

或先下後吐當隨病狀灸之內臍臍中灸二七壯并主脹

滿

治霍亂轉筋令病人正合面卧伸兩手著身以繩橫兩肘尖

頭依繩下俠脊骨兩傍相去一寸半灸二百壯無不差者

神效云此

若先心痛先吐灸巨關二七壯不差更二七壯

若先腹痛灸太倉二七壯不差更二七壯

若先下痢灸穀門在臍傍二寸男左女右一名大腸募灸二

七壯不止更灸二七壯

吐痢不禁三陰三陽但數者灸心蔽骨下三寸

又灸臍下三寸各六七十壯

霍亂上下吐瀉灸臍下十四壯

又灸關元三七壯

手足逆冷灸三陰交各七壯不差更七壯

轉筋多涌泉三七壯不止灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈

又灸慈宮二七壯

走哺轉筋灸踵踝白肉際左右各二十一壯

又灸少腹下橫骨中央隨年壯

轉筋四厥灸兩乳根黑白際各一壯

轉筋在兩臂及背脊中灸手掌白肉際七壯

又灸臍中中府巨關胃管又澤

又灸承筋五十壯

又灸承山一百壯

下若不止灸大都在足大拇指本節內側白肉際各七壯

若轉筋入腹欲死四人持其手足灸臍上一寸十四壯四五

壯自不動勿持之

又中管建里二穴皆主霍亂腸鳴腹痛脹滿弦急上氣鍼入

八分留七呼寫五吸疾出鍼可灸百壯日二七壯

千金翼方卷第二十七

千金翼方卷第二十八

灸法

消渴第一論十二法

消渴咽乾乾多胃下俞二穴各百壯在背第八椎下橫三間寸灸之

消渴口乾不可忍小腸俞百壯橫三間寸灸之

消渴口乾乾多胃下俞二穴各百壯在背第八椎下橫三間寸灸之

消渴口乾乾多胃下俞二穴各百壯在背第八椎下橫三間寸灸之

又灸足太陽五十壯

消渴口乾乾多胃下俞二穴各百壯在背第八椎下橫三間寸灸之

又灸陽池五十壯

建氏灸消渴法

初灸兩手足小指頭及項椎隨年壯

又灸膀胱前橫三間寸灸之各三十壯五日一報之

又灸背脾前下四寸俠脊梁一寸半一穴隨年壯

論曰灸上消穴當黃白狗肉作羹汁飲食不用鹽豉可用葱

通隨意食肉骨汁作羹羹可食肉當漸漸減食肉法須二

百日乃善

又灸腎俞二穴并腰日在野俞下三寸俠脊兩傍各一寸半以指

按陷中

又關元使兩傍各二寸一處

又陰市一穴在膝上當伏菟上三寸臨膝取之

曲泉陰合陰陵泉復溜凡此諸穴皆小便利大佳不損傷氣亦云

止遺尿也太谿中封然谷太白大都跗陽行間大敦隱白涌泉凡

此諸穴各一百壯腹背兩脚凡二十七穴其腎俞腰目關元水道

可灸三十壯五日一報之各得一百五十壯住涌泉可灸十壯犬

數隱白行間可灸三壯餘者悉七壯皆五日一報之滿二灸可山

也若多諸陰不若可灸諸陽諸陽在脚表宜審用之無有不驗造

次則并灸肺俞募按流注孔穴壯數如灸陰家法

灸小便數而少且難用力輒失精此方萬驗也令其人舒兩手合

掌併兩大指令齊急逼之令兩爪甲相近以一炷灸兩爪甲本肉

際際方後自然有角令炷當兩角中小侵入爪上此兩指共當一

炷也亦灸脚大指與手同法各三炷經三日又灸之此法甚驗

著臍臍中灸二壯

五淋不得尿灸懸泉二七壯在內踝前一寸斜行小脉間是中封

之別名

五淋灸太敦三十壯

氣淋灸關元五十壯

又使玉泉相去一寸半灸三十壯

勞淋足太陰百壯在內踝上三寸三報之

石淋臍下三十六種疾不得小便灸關元二十壯

血淋灸丹田隨年壯

血淋灸腹瀉五十壯

卒淋灸外踝尖七壯

失禁尿不自覺知鍼陰陵泉入五分灸隨年壯

華中瀕灸行間二十壯

屈骨端主腹中滿小便數灸二七壯小兒以意量之

不得尿灸太衝五十壯

失尿不禁法

灸大敦七壯 又灸行間七壯

小兒遺尿灸臍下一寸半隨年壯 又大敦一壯

灸法

重灸手解一盡指頭上瘰癧灸七壯 又臍下橫文七壯

遺尿鍼道入二寸補之在俠玉泉五寸灸隨年壯 又灸陰陵

泉隨年壯 又足陽明隨年壯鍼入三分

尿血第三十法

第七椎兩邊各五寸主尿血

又灸大敦各隨年壯

虛勞尿血白濁灸脾俞自壯

又灸三焦俞自壯

又灸腎俞自壯

又灸章門自壯

尿黃灸石門五十壯

水病第四十一法

灸足第二指上一寸隨年壯

又兩手大指縫頭各灸七壯

虛勞身腫灸太衝自壯

灸腎俞自壯主自病水腫

灸胃倉隨年壯

水腫灸陰交隨年壯

水腫氣上下灸陰交自壯

水腫脹灸曲骨自壯

大腹灸陰中隨年壯

人中滿發腫及水腫大水灸臍中右門各自壯

風水灸上廉隨年壯

水腫不得臥灸陰陵泉自壯

石水灸然谷氣衝四酒堂門

水分主水腫脹病不能食堅硬灸日七壯至三寸止忌鹹水

出盡即死水病灸至差止在下管下一寸

鼓脹灸中封二百壯

癰疽第五十七法論一首

卒現者五指急不得屈伸灸踝尖上數壯亦可至百壯

凡卒患腰腫附骨腫癰疽即腫風游毒熱腫比等諸疾但初覺有

異即急灸之立愈過之腫成不須灸從手掌後第一橫文後兩筋

間當度頭灸五壯立愈患左灸右患右灸左當心胃中者灸兩手

俱下天

丁腫在左灸左臂曲肘灸前取病人三指外於臂上處中灸之兩

筋間從不痛至痛腫在右從右灸不過三四日差

又灸掌後橫文從五指男左女右七壯即驗已用得効

論曰丁腫灸法稍多然此一法亦甚効驗出於意表也

癰癧灸曲池二穴隨年壯神良

頭痛癰癧灸天憲七壯

白癰白駁浸淫癰癧著頭及臂則灸兩乳間隨年壯差

痔漏第六十八法

鍼漏法

少海在臂曲則肘內橫文頭屈手向頭取之主腋下癰癧漏臂疼

屈伸不得風痺癰漏鍼入三分留七呼寫五呼

鍼癰癧先挂鍼皮上三十八息推鍼入內之追核大小勿出核三

上三下乃拔出鍼

灸漏法

頸漏灸天池自壯穴在乳後一寸腋下著脅直腋屈肋間

又灸兩耳後髮際直脉七壯

又灸背後兩邊腋下後文頭隨年壯

三三

端方角上七壯。

陰腫欲潰因灸足大拇指本節橫文中五壯。

又灸足太陽五十壯報之。

又灸足太陰五十壯在內踝上一夫。

又灸大敦在足大指三毛中隨年壯。

又灸足大指內側去端一寸白肉際隨年壯甚驗。若雙癰灸兩處。

又橫骨兩邊一七壯使灸之。

又足大指下理中十壯隨腫邊灸之神驗。

小兒癰先時將兒至碓頭呪之曰坐汝令兒某甲陰囊癰故灸汝。

三七二十一灸使牽兒令碓頭向下。若囊癰當陰頭灸縫上七壯即消已用有驗。又炷如燭管頭大。

凡男癰當碓軸以草中置軸上齊陰囊頭前多軸木上隨年壯。

即愈。

如腫如瓜入腹欲死灸足大指下橫文中隨年壯。

灸汁法。

多汗寒熱灸玉枕五十壯鍼入二分。

多汗瘧病灸譙譙五十壯。

盜汗寒熱惡寒灸肺俞隨年壯鍼入五分。

又灸陰都各一百壯鍼入八分補之。穴在俠胃管相去三寸。

多汗四肢不舉少力灸橫文五十壯在俠臍相去七寸。

又灸長平五十壯在俠臍相去五寸不鍼。

卒死第八十三法。

鍼間使百息。又灸人中。

灸覺不覺法。

灸兩足大指聚毛中二十一壯。

治卒忤法。

灸人中三十壯。又灸肩井百壯。

又灸間使七壯。又灸巨闕百壯。

又灸十指爪甲下各三壯。

治鬼擊法。

夫鬼擊之為病卒著人如刀刺狀背脊及心腹絞切急痛不可按。

抑或即吐血或即鼻中出血或下血一名鬼挑灸人中一壯立愈。

若不止更加灸臍上一寸七壯又灸臍下一寸三壯七壯。

中惡灸胃管五十壯。

治蛇毒灸毒上三七壯無文以火頭稱瘡孔大小灸之。

治熱厥灸兩乳頭七壯。

治狂犬咬人令人吮去惡血盡灸百壯已後日日灸一百日乃止。

差血不出慎酒猪肉一生慎之。

用鍼法 雜法第九

凡用鍼者虛則實之滿則泄之宛陳則除之邪勝則虛之大要徐。

而疾則實疾而徐則虛言實與虛若有若無察其後先若存若亡。

為虛為實若得若失虛實之要九鍼最妙補寫之時以鍼為之重。

則為補輕則為寫雖有分寸得氣即止明堂偃側鍼訖皆無不灸。

凡病皆由血氣擁滯不得宣通鍼以開道之灸以溫煖之灸已好。

須將護生冷醋滑等若不謹慎之反增疾矣。

黃帝曰五藏五行五時病何以故岐伯曰假令春月和暢條芳水。

漾心寧意盈神亂於內而形病於外卒有西方飄風凜然毛聾因。

腠理開不復得散便是孫脉孫脉滿流入絡脉絡脉入大經大經。

注府府歸藏四時同然故風病多歸於心也手心主灸刺血出多。

令人心驚三里刺入四分令人氣上涌泉刺深殺人陰交灸多絕。

身。

凡諸孔穴名不徒設皆有深意故穴名近於木者屬肝穴名近於
神者屬心穴名近於金者屬肺穴名近於水者屬腎是以神之
所藏亦各有所屬穴名府者神之所集穴名門戶者神之所出入
穴名舍宅者神之所安穴名臺者神所遊觀穴名所主皆有所況
以推百方庶事皆然元名五臟
凡孔穴若是經絡所行往來處引氣遠入抽病也故經云灸三壯
若即為足數也

凡灸頭與四肢皆不欲少須熱宜令灸壯滿三百足以愈病頭
手足肉薄若併灸則血氣絕於下宜時歇火氣少時令血氣流通
使火氣流行積數大足自然邪除疾差也乃止火耳本經多云刺
入三分灸二壯茲乃舉其大綱未盡聖心且手足皮薄壯小數少
腹背肉厚壯大壯多斯皆以意商量也背欲熱即為佳也凡灸生
熱候人盛衰老少肥盛灸之

凡微數之脉及新得汗後並忌灸
凡孔穴皆逐人形大小取手中指第一節為寸男左女右一云三
寸者盡一中指也人年二十以上若灸頭不灸三里穴令人氣上
眼闇所以三里穴下氣也

一切病皆灸三里三壯每日常灸下氣氣止停也
凡灸法先發於上後發於下先發於陽後發於陰凡鍼刺大法在
午時後不欲午時前

治冷痺腰膝疼脚攣急足冷氣上不能久立有時腰重脚攣手
脚沈重目覺羸瘦此名復連病令人極無情地常愁不樂健忘嘆
喜有如此候即宜灸之當灸懸鐘穴在足外踝上三指當骨上各
灸隨年壯一灸即愈不得再灸也取法以草從手指中文橫三指
令至兩畔齊將度外踝從下骨頭與度齊向上當骨點之兩脚令

三姓人灸之候天晴日午後在門外四達道上灸之神良若年月
久更發依法更灸若意便欲多者七日外更灸七壯

巨關可百壯 上管可二百壯 中管可千壯 下至五百壯
下管可百壯 中守可一百壯 陰交可三百壯 中極可五百壯
大椎可三百壯 風門可二百壯 魂門可五壯 陽綱可五壯
意舍可百壯 盲門胞門可各一百壯 懸樞可五壯

命門可七壯 白環俞可二壯又云 心俞 肝俞 肺俞
脾俞 腎俞 小腸俞 膽俞 大腸俞 胃俞 膀胱俞

二焦俞 肺俞
右五臟六腑俞皆得滿一百壯
肺募中府 心募巨闕 肝募期門 膽募日月
脾募章門 腎募京門 小腸募關元 三焦募石門

大腸募天樞 膀胱募中極 胃募中脘
右五臟六腑募亦得滿百壯
鳩尾二十壯三報之 巨關五十壯 上管實建里下管水分
臍中各五十壯三報之 陰交 氣海 石門 關元五十壯

中極五十壯
右從鳩尾下第一行皆得百壯以此為大率自外諸穴或中病
乃止或取隨年壯以意商量也

頭維 腦戶 風府 絲竹空 下關 耳中 癰脉 人迎
瘡門 承泣 經渠 脊中 氣衝 鳩尾 地五會 陰市
陽關 乳中 泉腋 伏菟 承光 天府 白環俞 石門

右二十四氣穴不可灸太忌
上關 左角 乳中 鳩尾 五里 承筋 復溜 顓息
缺盆 臍中 神庭 雲門 伏菟 三陽絡 然谷

右十五穴禁不可刺大山

王槐 維角 睛明 舌根 結喉 胡脉 天窓 神符

巨髎 血海 足太陰 立墟

右十二穴無病不可灸刺

鍼灸宜忌第十

論曰凡欲灸鍼必先診脉知醫瀕看病者行年本命過害絕命生氣所在又須看破除開日人神取天醫若事急卒暴不得已者則不拘此也既得吉辰當知忌穴乃以繩量依圖朱點并疏患穴及壯數然後用心乃療之則無不愈矣其分寸法取病人男左女右手中指第一節為寸宜忌等列之如左

治病服藥宜忌法訣

凡鍼灸服藥皆須審知病人生年月日推其行年壽宮生氣絕命

諸乃處斷之

舊法男避除女避破又男忌戊戌女忌己

假令未命人行年又在未則不宜鍼及服青色藥

火命人行年又在火則不宜發汗及服赤色藥

土命人行年又在土則不宜吐及服黃色藥

金命人行年又在金則不宜灸及服白色藥

水命人行年又在水則不宜下及服黑色藥

矣

凡八月六日十五日十八日二十二日二十四日小盡日治病令

人長病

戊午甲午此二日大忌鍼刺出血服藥及灸不出月凶

甲辰庚寅乙卯丙辰辛巳此日灸刺大凶

壬辰此一日大忌鍼灸

甲辰巳巳丙午丁巳此日男子特忌鍼灸

甲寅乙卯乙酉乙巳此日女人特忌鍼灸

丙子壬子甲子丙辰丁巳辛卯癸卯乙亥以上日切忌鍼灸

立春春分解 立夏夏至肺 立秋秋分肝 立冬冬至心

四季十一日後腎 右以前日並不得治瘰癧

凡五藏王時不得治及鍼灸其經絡內

凡春左脅 秋右脅 夏臍 冬腰 以上人神皆不宜鍼灸

凡五辰五酉五未等日及八節先一日後一日皆不得鍼灸

建日申時頭 除日酉時膝 滿日戌時腹 平日亥時腰背

定日子時心 執日丑時手 破日寅時口 危日卯時鼻

成日辰時膺 收日巳時足 開日午時耳 閉日未時目

右件其時並不得犯其處殺人

一日足大指 二日外踝 三日股內及腳端 四日膝及髀

五日口齒舌根咽喉及足指 六日手小指少陽及膝下

日內踝 八日足腕 九日死生手陽明 十日腰眼及足

拇指 十一日鼻柱及眉 十二日面鬚際 十三日牙齒十

四日胃管咽喉足陽明 十五日遍身 十六日背乳 十七日

氣衝及臂 十八日股內及脇脇 十九日足跗足下及項

十日膝以下 二十一日臂舌足小指 二十二日伏兔

外踝 二十三曰肝俞足跗兩腋 二十四日足陽明兩

脅及小腸 二十五日足陽明心腹 二十六日手足背

二十七曰膝內踝 二十八日內踝 二十九日關元下至足

右人神並須依之吉

肝神丁卯 心神庚辰 肺神癸酉 腎神庚子 脾神戊己

此五神之日特須避之餘日不假避諱也余以此論為得之近

矣必須依而行之餘者狼狽徒費辭難領固非君子之言諸君

之法以施俗士通人達道且拘此說

月忌 丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子

月厭 戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥

月殺 戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌

月刑 丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰

月害 巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午

天醫 卯寅丑子亥戌酉申未午巳辰

右呼師且天醫上來療病吉若刑害上來及鍼灸大凶

又行年天醫法

人年至子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

天醫卯戌子未酉亥辰寅巳午丑申

推歲天醫法

常以傳送加大歲太一下為天醫

推月天醫法

陽月以太陰月以小吉加月建助曹下為鬼道傳送下為天醫

避病法

以小吉加月建登明下為天醫

療病法

以月將加時天醫加病人年上療之差

日天醫法

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 天醫卯亥丑未巳

行年人神所在法

年一歲 十三 二十五 三十七 四十九 六十一

七十三 八十五 神在心辰

年二歲 十四 二十六 三十八 五十 六十二

七十四 八十六 神在喉卯

年三歲 十五 二十七 三十九 五十一 六十三

七十五 八十七 神在頭寅

年四歲 十六 二十八 四十 五十二 六十四

七十六 八十八 神在肩丑

年五歲 十七 二十九 四十一 五十三 六十五

七十七 八十九 神在背子

年六歲 十八 三十 四十二 五十四 六十六

七十八 九十 神在腰亥

年七歲 十九 三十一 四十三 五十五 六十七

七十九 九十一 神在腹戌

年八歲 二十 三十二 四十四 五十六 六十八

八十 九十二 神在頭酉

年九歲 二十一 三十三 四十五 五十七 六十九

八十一 九十三 神在足申

年十歲 二十二 三十四 四十六 五十八 七十

八十二 九十四 神在膝未

年十一歲 二十三 三十五 四十七 五十九 七十一

八十三 九十五 神在陰午

年十二歲 二十四 三十六 四十八 六十 七十二

八十四 九十六 神在股巳

十日人神所在

甲日 乙日 丙日 丁日 戊日 己日 庚日 辛日 壬日 癸日

神在 神在 神在 神在 神在 神在 神在 神在 神在 神在

十二日人神所在

子在目

丑日在耳

寅日在背云云

卯日在鼻云云

辰日在腰

巳日在手云云

午日在心腹

未日在足云云

申日在頭云云

酉日在背云云

戌日在頸云云

亥日在項云云

十二時人神所在

子時在蹠

丑時在頭

寅時在耳云云

卯時在面云云

辰時在項云云

巳時在乳云云

午時在背云云

未時在腹

申時在心

酉時在膝云云

戌時在腰云云

亥時在股

右件人神所在血不可鍼灸損傷慎之慎之

禁書

論曰夫清濁未分無間昏曉玄黃肇判乃見溫涼四時攸分降生
寒暑三光照耀日景舒盈人稟五常腰理通塞故老子曰吾所以
有大患者為吾有身及吾無身吾有何患由此觀之形質既著則
病癢與焉靜言思之惟無形者可得遠於憂患矣夫天地聖人尚
不能無患況如風燭者乎古有調針切脉之君嘗鑲鍊石之帝憂
勞庶類不違寧處者亦以眾矣自時厥後窮神極智之士扣心盡
思之賢相與贊成其業者不可勝紀是以醫方千卷未盡其性故
有湯藥焉有鍼灸焉有禁呪焉有符印焉有導引焉斯之五法皆
救急之術也何者病起無端醫藥萬品間闕之內猶有失柱之哀
朝野之中尚致膏肓之疾誠可悲夫方今醫者學不稽古藏悟非
深各承家技便為洞達自負其長競稱彼短由斯對執卒不得把
其源流也余早慕方技長崇醫道偶逢一法書錄千金遂便名方
異術莫能隱秘且此書也人間皆有而其又寥寥不成卷軸縱令
有者不過二章兩章既不專精探其至蹟終為難備斯之一法體
是神秘詳其辭余不近人情故不可得推而曉也但按法施行功
效出於意表不有所緝將恐零落今編為兩卷凡二十二篇名曰
禁經其於條例後科詳集博雅君子無或隱焉

持禁書戒法第一

神仙經曰凡欲學禁先持五戒十善八忌四歸皆能脩治此者萬
神扶助禁法乃行

五戒者

- 一曰不殺 二曰不盜 三曰不淫 四曰不妄語

五曰不飲酒燒茹

十善者

一濟扶苦難 二行道見死人及鳥獸死者皆埋之

三敬重鬼神 四不行殺害起慈憫心 五不憚富貴貧

六心行平等 七不重貴輕賤 八不食酒肉五辛

九不淫聲色 十調和心性不乍喜乍喜

八忌者

一忌見死屍 二忌見斬血 三忌見產乳 四忌見畜產

五忌見喪孝哭泣 六忌抱小兒 七忌共女人同牀

八忌與雜人論法

四歸者

一不得著穢污不淨潔衣服即神通不行

二不得惡口咒詛罵詈 三不得共人語詐道稱聖

四不得飲酒食肉殺害無道

又云不得穢處誦禁文 又云不得與不信人行禁

又不得向人說禁法 又不得穢汚手執禁文

又不得與雜人誦戲 又不得與神神明

又不得嘔打六畜及人不得乘車馬

有犯此滿三事則禁道不行能不犯者其禁大驗

經曰若獲城邑污穢者當用此方

竹葉 柏兩 桃白皮 歸兩 柳白皮 歸兩

右三味以水壹石貳斗煮之一沸去滓浴身百穢消除又辟溫

瘴瘡瘻此法天仙子下游既返之日未嘗不用此方解穢也至於

符水呪漱及外舍之近術皆不及此方若能常用此湯漂浴者

益佳惟不可洗目也

紫微王夫人勅水洗目得清淨法
呪曰濁不穢形死不妨生摩掌難目三遍令我長生青龍王吾左
白虎在吾右朱雀在吾前玄武在吾後神禁勅水除塵垢急志如

三、國庫券

律令（一）解穢禁水曰東流之水滑如膏中有主君與三台某
甲活穢蕩除急急如律令

受集法華

神仙經曰陽道強堅而易歇陰道微軟而久長聖人閉口萬物可藏迴轉清白改易陰陽應言不言神明相傳應語不誦神明相與故萬法閉口藏身之禁法流行五藏神明衆人游藝而我獨住衆人浩浩而我獨靜衆人言說而我獨嘿此行禁之道畢矣

仙經曰凡受禁之法當先齊戒百日精心不行淫慾惟得清淨沐浴著鮮淨衣口常不出惡言罵詈精思靜念勿生異想一如前章

仍更七日之中閉口不共人語乃可受之

仙經曰凡受禁之法當先齋戒百日。精心不行。淫慾。惟得清淨。沐浴。鮮淨衣。口常不出惡言。罵詈。精忠靜念。勿生異想。一如前章。仍更七日之中。閉口不共人語。乃可受之。

正月一日 三月二日 五月五日 七月七日 九月九日

三年之中三遍於此月日受之并一心持齋戒不犯則行禁其

驗如神

正月 日受法

正月一日平旦寅時清淨澡漱在無人清淨之處著鮮淨衣不得
令人輒見燒衆名香正面向東禹步三匝勿迴轉長跪讀度文
曰上啓三師神童玉女天醫靈醫一切諸師太上老君諸仙神主
日月五星二十八宿北斗三台諸神仙官屬諸大神王咸知弟子
某甲受持符禁之法願濟拔衆生苦難除毒消邪却好惡萬事
如効急急如太上老君律令

都受禁文曰

想東方木禁在吾肝中

想南方火禁在吾心中

想西方金鉢在吾胸中

想北方永禁在五畝中

想中央土禁在吾脾中

想左青龍右白虎則朱雀後玄武天師禁駕無事不苦東王公西王母道吾甚有隨常急急如太上老君律令詔還調所得禁文

各滿禮十二拜仍更七日勿共人作一言及惡罵尋誦七日勿洗手。

二月三日受法

三月三日甲寅時至東流水上正面向東立端心正意讀前啓
度文如正月法并啓江河四瀆一切水官四海大龍正願知弟子
其申受符禁法願大神王立契諒誦所得禁文各六遍禮九拜
五月五日受法

五月五日正中

得禁又各三遍禮十二拜。

七月七日受法

七月七日雞鳴丑時在靜處燒香正面向西立讀啓度又誦所
得禁文各三遍禮七拜。

九月九日受法

九月九日人定多時在靜處正面向北立盆盛水口銜刀讀經度文投香火長跪誦所得禁文各三遍禮九拜此五日處法用一如

正月去權所向

太白仙人受法
四月一日齋戒至八日立道場四向懸幡蓋燒香然燈啓醮五方
五帝五方禁師五方天精咬毒表文神王願弟子某甲受持禁
法呪詭誦所得禁文各三遍七日齋戒

同力受禁法

候初雷時舉目看雷右手把刀以左手摩之呪曰助我行禁振聲如雷吼萬毒伏聞氣待雷聲盡詭七日齋戒不出言一本云候初雷時眼所見物隨便把取唱言聲如雷萬物皆怖畏待雷聲盡乃棄之一云口角川手摸大斧摩之言

神仙王受禁法

候驚初來時仰頭看之以手按地云口如毒以驚去不見乃止此
等潔淨齋戒一如正月不別乃至七日不洗手

天帝太一受禁法

初受禁時在寂靜無人之處敷坐設香正面向北閉口立足
正立左手持刀依式思存青龍在左白虎在右朱雀在前玄武在
後北斗七星覆頭上柄指前次思東治太極圖持符為五神候
經騎大將軍蘇平南公八部將軍七十二宿師帥師帥皆持小
吏直日童子護首今日不得以左為右以則為後若有倒錯即依
使有法律科罪之急急知律令如此陰令三遍然後禹步三匝至
香案前叩齒三遍呪曰東方青龍衛水來南方赤龍衛水來西方
白龍衛水來北方黑龍衛水來中央黃龍衛水來悉投杯中三台
三台此水非常水洗除天穢地穢三十六穢其甲身穢淨除之悉
急知律令三遍呪訖以水洗目并藥四方上下餘水自飲之洗腹
內令淨想又讀前啓度文然後長跪誦所得禁文各三遍訖禮四
方各再拜即成神驗刀子水盆不得用曾經酒肉五辛者

又一法

正月一日東方明星出時流浴在清淨無人之處白茅為藉置坐
設案燒香火并花水洗面自正面向東立先舉左手持青龍
次舉右手持白虎前行時朱雀後行時玄武訖依前左手持刀次
第思神師日符禁同法更無別法也若欲受符印者以帛若紫
盛持著左手指句之而擊水盆閉氣禹步依法次第呪誦有效也
七星受呪法

正月一日 三月三日 五月五日 七月七日 九月九日

先以香湯洗浴取更流水未經用瓦器盛之以誦所得禁文呪一
遍受人自洗於曠野無人之處以淨草為坐以瓦器盛水七盞
作七星形北向云謹啓七聖真君弟子某乙願持禁法禁斷邪惡

鬼毒之氣救理人民伏願降真氣流布臣身令臣所行符禁應聲
除差應手除愈次第飲前件水各少許餘洗手不得手捻不淨之
物即有大驗云此禁法今並不取

黃帝越禁受法

黃帝曰凡受禁者皆清淨齋潔百日不得近死生產乳房室三
年之中三度 正月一日 三月三日 五月五日 七月七日
九月九日 以夜最星之下置神座設案燒香並盛水臨刀此
面叩齒三師目次筆思神訖禹步三匝長跪讀啓度文又誦所
得禁文各三遍神驗水盆不得用曾盛酒肉五辛者臨欲越時朱
書帛素上左手持之檢目陰誦呪之欲行禁時閉氣朱書帛素上
右手持之檢目陰誦呪之

雜受禁法第三

正月一日日未出寅時 三月二日寅時

五月五日午時 七月七日丑時 九月九日寅時一時云

正月受一年用 三月受一春用 五月受一夏用

七月受一秋用 九月受一冬用

右年年常依此日受之法不得飲酒食肉五辛并薑乳酪酥蜜
心如藥主藥上願救護一切眾生不作艱難不求財物但作此
心下口即差萬不失一受法用前月日先以清淨井花水沐浴
上下衣服一切鮮淨清齋七日至其日先以井花水澡浴漱口
燒香禮五方五帝各五拜訖正面向東燒香端立單膝盛井花
水置傍誦所得禁文各二十七遍訖口含水仰嚥五方承取洗手
面訖向東方吸青氣想入口中七吸次向南吸赤氣次向西
方吸白氣次向北方吸黑氣次吸中央黃氣此作七吸入腹想
訖更禮五方各五拜訖後作兩月持禁戒外得禁想不得作一
切諸惡行受訖即成禁法禁物不得用曾盛酒肉五辛者

受禁腫法

古家北桑樹陰內有艾者。五月五日平日未出時。從家北向南步取五十四步。至艾作鳥步。北斗七星。該還開氣。將取艾葉。拭手使汁入手中。七日勿洗手。持齋過七日。以外即成禁。五十四步之中。標記使分明。一步七尺。登取艾時。面向西方。祝願我此手一切癰腫。一切諸毒。乃至一切病。手著即差。作法訖。還勿反顧。受時以五月四日。作齋標記步數。亦四日。使記。先從艾東置。因北向。為屋向。北五十四步。作標記。五日。且從北向南步之。作法了。齋至十一日。上桑樹。在塚北。從地三尺。於塚上生者。佳。亦於四日。在塚東。宿五日。旦即作法。萬步法。閉氣。握固。若治病時。你想此手。作熱鐵。又想前人病。如雪。手著病即散。又治病時。常在病人。生氣上。若病人頭面。上有浮腫。不得頭治。使盡。即傷人。必當留少許。明日更治。此法大業六年。琅邪郡高縣令。漢關法。擅持山善。寂道。陽靈法師。所行神驗。不傳。

受禁瘡法

低驚初來時。以紙一張。濃點筆於紙上。寫驚與點驚。乃止。後若瘡病人來。向云。我患瘡。即語我。與你治。你但去陰。押取一點。塞壓孔中。即愈。又法。正月元日。呼牛馬。時。火下。將筆。閉氣。多書紙上。作鬼字。氣盡。乃止。瘡病欲發時。押取一鬼字。與吞之。即差。

受禁腫都禁法

正月元日。東方動時。以淨席一領。於寂靜無人之地。以并花水沐浴。漱口三遍。手持香。炷禮五方。五帝君。祝願曰。弟子某甲。今日受天神呪。願救一切眾生。苦四方各禮三拜。訖。願取東方青氣入口。滿七咽。南方赤氣。西方白氣。北方黑氣。中央黃氣。等各七咽。訖。向南東方。閉氣。誦呪各七遍。七日持齋。戒呪曰。天之所圖地之所方。受天神符。可以長生。二十八宿。其色。青。赤。黃。白。黑。五色。變化。與符合。并。急。

急如律令。次呪曰。無根肉。本生無留得。大腫如山。小腫如粟。登高山。臨海水。旦起生。向暮死。急急如律令。

須緊。攪把刀子。以刀把按腫上。其腫疼。痛用前禁文。若不疼。痛。用此禁禁之。然此二禁。皆是正禁。腫文。凡是惡腫。皆用此二文。其大腫。日別四五度。禁五日。差。小者。當日差。

大總禁法

呪曰。朝日不良。為物所傷。上告天公。下告地皇。地皇夫人。教我禁瘡。仙人持水。王女持漿。一唾止毒。二唾止癰。三唾已後。平復如常。天雷鳴。瘡亦不驚。天雷地動。瘡亦不恐。皮相連肉。相連不脫。不痛。不腫。不膿。急急如律令。用法。以刀子一枚。先吸一口水。捻腫著口中。和水。瘡病上。若小兒驚。當藥地上。二三過。藥瘡病上。以口附近。病上。誦禁。每一遍。三唾。每七遍。一遍。鹽水。嗽口。三七遍。成一禁也。若不差。多加遍數。取差為限。若百遍不差者。此病太重。不可救也。慎勿與治。

禁時氣病法

頭痛。以刀隱痛處。唾禁。如前緣。但有患疼痛處。皆用刀背。隱而禁之。若金瘡。從高墮下。金屑。狼虎毒蛇所傷。手足。卒變。瘡。皮。百一切痛。苦。不如意。處。並用此法。禁呪之。悉得除愈。不可具載。男女。並得受持。

論曰。此之雜法。由禁師。不能具美。大法。所以須受輕法。易者。約者。若受大法。此亦不須。

禁法大例第四

論曰。用禁大例。誦禁文。必不得出聲。令自耳聞聲。若聞之。呪即禁。法不行。行之無益。慎之慎之。受禁之時。不得令人。畜等。一切見之。見之。即不成。受法時。刀及水盆。皆不得曾經酒肉。五辛。用者。神仙經曰。對治禁。驚。病。擊。同類。

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

逢金難土王擊之

逢木難金王擊之

逢火難水王擊之

逢土難火王擊之

逢水難土王擊之

逢火難木王擊之

按即外邪不入五臟神明自通仍皆須審之萬不失一又欲向

病人家當須存想作白虎吐火燒病人家屋舍皆令蕩盡又作龍

祗病人身肉令盡還作赤滿於懷然後用氣急治之欲擊物一一

皆如是此令行禁神明萬物皆神效驗須精審之若咄嗽病以冷

氣吹之三七然後禁之若唾冷病以熱氣呵之三七然後禁之三

唾後行禁禁後三唾乃效之

仙經曰受符禁同法先當修身潔已安魂定魄口勿妄言最齋百

日致神仙避惡氣除滅災祥可以長生

掌訣法第五

天師曰若欲修之先持齋戒一如正月法斷口味絕房室先取龍

骨頭附子犀角各一兩以水三斗煮取一斗遍身凜冷有餘者

明日更洗手面訖以盆盛水燒香禹步三匝口銜刀北面長跪讀

前度文訖誦所得禁文各三遍一依正月戒忌即成神驗

天師曰得吾法者上士昇仙下士遷官庶人得之益壽延年父子

兄弟不得相傳傳必賢人非賢勿傳殃及子孫

又受禁法

呪曰女口會文一日誦七遍七日止

凡禁病大例禁一切病先須口嚼楊枝去口中穢氣訖又嚼鹽乃

呪唾之若犯一切口味者即燒牛糞灰淋取汁飲服之此除腹

中諸穢并作解穢符水法還得清淨此是掌訣解穢法也

凡游行人間有所犯穢者皆亦如之

凡欲行禁者皆須先按鬼目若與男禁按左手目若與女禁即按

右手目

王相正面向月建正心定意閉氣三按目左營目順天道即成禁

法用之連左營目者開左目閉右目右營目者開右目閉左目

凡禁者須解禁法

凡禁者須解禁法

凡禁者須解禁法

凡禁者須解禁法

凡禁者須解禁法

凡禁者須解禁法

假令禁虎須存作師子捻虎目。若欲解之還存作虎。

一云男番捻右手虎目女番捻左手虎目。若欲禁狗存作虎捻狗目。若欲解之還存作狗。以此為例。觸類長之。皆須依此。

大指第一節是生人蛇虎頭。若有惡人侵犯。已身罵詈不止者。緩即捻之。急即閉氣押之。左營目惡人即怒止也。若不止則押喉。

向官府問亦如之一百步外預作之。乃入官。官見不順。欲禁虎蛇亦依此法。即虎蛇避人。入章畏見人也。

大指第二節是生人蛇虎喉。若惡人罵詈不止。與人爭者。閉氣捻之。急即押之。左營目令彼吃訥不能言也。

第一指第一節是蛇虎目。治蛇虎瘡。閉氣捻之。己身及他人同。若見蛇虎便捻之。急即噴怒而押之。

第一指第二節是鬼目。欲見鬼去鬼。擊鬼皆捻之。急則閉氣押之。左營目九氣則鬼神立至矣。呼即去。吸即來。治病捻之。

第一指第三節是生人目。欲藏身。醫已與人闘爭。及在深山曠野。皆須捻之。以伏衆人之言。急則閉氣押之。左營目。人不見己也。

第三指頭甲下是蜂蠍。及百鳥飛蟲之目。若人被蜂蠍螫。捻之七左營目。五氣則解之。若不差押。蠍目及人大道并捻掌心。即差。

第三指第一節是地獄治鬼目。若欲禁諸神。不令來上。閉目向王。閉氣五十息。捻之。急即左營目押之。

第三指第二節下是大獄目。欲禁鬼攝鬼。却鬼殺鬼。皆向王閉氣。捻之。急則押之。左營目。若為鬼魅所著。或惡夢驚押之。

第三指第三節是鼠目。一名天地獄治鬼目。若住鬼定鬼。住神皆向王閉氣五十息。捻之。左營目。

第四指次甲下是蚊子蠅蟲之目。欲除之。閉氣捻之。

第四指第一節是都監目。一名神都目。都監者。監領一切諸神。都管一切諸鬼。欲召鬼神。問其意。向王閉氣五十息。捻之。左營目。

鬼神立至矣。

第四指第二節是禁鬼目。一名蛇胎。欲行考鬼。令鬼住。鬼問鬼。捻之。閉氣。若入山澤。畏逢蛇。蟻。當押蛇胎。令不來見人。及已逢亦押之。蛇口禁不得開。

第五指頭是天心。欲求天神。向王閉氣押之。神自來奉賽大佳。

第五指第一節是游師目。

第五指第二節是天師目。

第三節是三師目。此皆是初學符禁法時。向王閉氣捻之。九十息。左營目。應請即有神驗。

掌中一理是鬼道。欲誅符破壤。斷鬼。驅惡氣。伐神樹。皆向月建。閉氣五十息。押之。左營目。神驗。

凡欲呪勅符。皆須捻斷鬼道。使鬼常敬之。掌中一理一名鬼舍。亦名地軸。亦名左都監。鬼道目。欲誅符破廟。除社。公社地。或召諸鬼神。須有請問。及治病并欲解鬼。皆押左都監。鬼道目。鬼神立至。若田野中。浪宿押地軸。令鬼賊及神。皆不敢近人。若入神屋。止宿。恐怕不安。押鬼舍。即不驚。

掌中一理斜文。名食地。食地上一文。名天文。下一文。名人道。若入山澤。畏逢虎狼。向王閉氣押手虎口中。即不來。若已逢。亦押之。令虎狼閉口不開。

第四指第一節名左金堂。若遠行求財。押之。萬倍。

第三指第一節名玉堂。欲求官職。押之。必遂意。

第二指第一節亦名玉堂。欲求官押之。

論曰。此掌訣。宜用閉氣。左營目。捻之。無呪文也。禁病。則皆須禹步。誦此文。捻而用之。急則瞑而押之。緩則捻之。禁男用左手。禁女用右手。禁手之用。勿失左右也。

凡禹步法。後步左右脚前後不同。

禁鬼客忤氣第六

走垂危自殺急急如律令

禁溫疫時行第七

禁時氣法今禁水溫疫惡鬼

立病家門禁法從左轉而出

吾上知天文下知地理天地

三十四

厥神師呪汝汝自厄科斗七枚在吾目前口是天門不得枉開若
唾東方甲乙木木折若唾南方丙丁火火滅若唾西方庚辛金金缺
若唾北方壬癸水水竭若唾中央戊己土土裂六甲六乙疫鬼自
出六丙六丁知鬼姓名六戊六己疫鬼自死六庚六辛知鬼東西
六壬六癸疫鬼自死六亥六戌百鬼速出急急如律令

禁時氣溫疫法

東方青溫吾肝中之氣南方赤溫吾心中之氣西方白溫吾肺中
之氣北方黑溫吾腎中之氣中央黃溫吾脾中之氣五方五溫悉
在吾身中不得動作即歸在實急急如律令

度惡世禁法

東方青帝甲乙君南方赤帝丙丁君西方白帝庚辛君北方黑帝
壬癸君中央黃帝戊己君千乘萬騎護衛吾身前有萬石桃湯後
有萬隊將軍主斬黃奴之鬼欲行我者吾祭酒父長甲母奇仲語
我吾萬厄之中不近我急急如律令

禁時氣却疫法

吾是天師祭酒當為天師驅使頭戴日月北斗五星吾有乾靈之
兵十萬人從吾左右前後吾有太上老君天地父母在吾身中左
手持節右手持幢何鬼不役何神不走何邪不去何鬼敢住急急
如律令

禁時氣溫疫法

吾頭戴朱雀足履玄武左挾青龍右挾白虎前有萬石鑊湯後有
虎黃猛士天驕甲卒在吾前後黃奴之鬼去我萬里急急如律令

又禁溫疫法
咄汝黃奴老古知吾否吾初學道出於東方十城萬仞上先出
銅百鍊之劍利如鋒芒斬殺凶咎鬼不存此咒黃奴老古先出
有禮後出斬竹叱叱急急如律令

唾時行頭痛法

南越太公還故鄉土申之唾自自方神師所唾上白太一皇天使
若督察不待威若山海唾若雲霧若若者先值吾者工鬼精隨
自受其殃急急如律令

勑水逐鬼法

習習詳詳使生水光宜符使者任立水傍其上補虛和氣消去吾
左手捉鬼右手持鉞斬鬼死急急如律令

禁唾惡鬼法

吾從狼毒山中來創創食其肉飲其血我監一把冷水一盃口含
五毒常與唾居但老君之唾唾我其毒則則唾唾木則折唾左
撒石唾表徹裏銅牙鐵齒嚼鬼兩耳速去千里不得留止急急如
律令

禁病粉粉大法

粉在紙中為神粉舉手以摩體百鬼走出精魅魘魅應聲散走出
天皇老教我唾粉腹中跳跟左藏安穩錄保三氣道保精神急急
如律令

禁溫鬼法

天門亭長外都使欲得九卿縛鬼士赤子法住左手持刀右手持
斧斬黃奴溫病之鬼何不走去前出封侯後出斬頭急急如律令

禁瘧病等八

登高山望海水水中有一龍三頭九尾不食諸物惟食瘧鬼朝食
三千暮食八百食之不足差使來索符藥入五藏瘧鬼頭并跡不
伏去身縛送與河伯急急如律令

禁瘧病法連年不差治之即愈
食三千暮食八百一食未足推服來索急急如律令

若治之須在淨剏平地以手小指畫地作鬼字口中陰道病人生時年月日姓名以填覆之勿令知之至三七日不開未差如三七日內開其病還復發若治必須知發時逆前預治勿使患人知之大良若丈夫左手畫女人右手畫之陰為之勿使人知靜作大驗

禁瘧瘧法
瘧瘧鬼翁字園一作母字欲大兒嘉長吳小兒如石大女顯龍炊小女曾子因玉道將軍取瘧鬼不得留傳速出速去不得停住急急如律令

禁瘧瘧法
南山一神字銅柱出門入戶口有語捉得瘧鬼大鑊煮南山一神字長丘早起至門邊家遊捉得瘧鬼斬却頭

禁瘧瘧法
南山一神字辟邪銅作獨轆鐵鎖重各繫我齒金剛作牙生吞瘧鬼三萬軍北斗七星知汝姓字不得住家急急如律令

禁瘧瘧法
登高山望海水使螳螂捕瘧鬼朝時來暮時死暮時來朝時死捕之不得與同罪急急如律令

禁瘧瘧法
將狗上山下使入海中有一蟲不食五穀只食瘧鬼朝食三千暮食八百一食不足下符更索速出速去可得無殃急急如律令

禁瘧瘧法
日正中時正南立取西北桃枝結項兩手腳交連二匝中心立刀曰頭上戴九天兩手把九弓兩脚復九江腹安四神皆出自然吾生食天育養四神上得精禁能轉人身蜈蚣蟒蛇止殺汝身并鬼子孫急急如律令

禁瘧瘧法
先取一平壇金病人在無人處不得見人大從月建向月破以傳

磨地令平以手按壇四角使不動還以手發壇立在前可壇下書北斗傍置三台外盡孤虛直取旬孤虛其北斗中畫作小鬼患人姓名年幾置下在十柄中呪曰

小鬼字某甲年若干你足台入斗瘧鬼斷後若患人時頭上先下若非患人時頭下先下若無逆順平下壇訖若患人日一發以手二七下打壇若隔日發三七下打壇二日一發以上四七下打壇訖取壇傍土擁壇即復左手取一把土散壇上而去慎勿反顧大驗

又以故筆畫六尺方中畫作北斗形皆以北斗相應其魁嚮必令開門以身左行向斗點閉氣並足俱前而立呪曰

小鬼吾今出天門入地戶不得從我去住遂出建上之門急去不得反顧即差三七日不發與人治患還得此患必用此治欲令患人憂發二七日內發之法

還取患人發以足踏壇呪曰
小鬼爾從斗入台瘧瘧還迴即發

禁瘧瘧法
枝一尺欲發即用喫病人口呪文二七遍繫著頭底天姓張姓皇星月字長日字紫中有一有地地中有蟲赤頭黃尾不食五穀只食瘧鬼朝食三千暮食八百一食不足下符請索速出速去可得無殃汝若不去縛之急急如律令

禁瘧瘧法
呪曰先吞瘧上閉右目左目管三匝然後唾之三乘車四獄吏載瘧神乘都市登高山臨海水呂河伯捕瘧鬼大腫如斗小腫如栗吾唾一腫自腫解脚唾二七毒自出急急如律令

禁瘧瘧法
禁唾一遍一度刀割五六七背陰向陽吾朝長行女媧相逢數

我唾癰從甲至乙癰疽速出從乙至丁癰疽不生從丁至癸癰疽皆死青癰赤癰白癰黑癰黃癰血疽肉疽兄弟八人吾皆知汝姓名徒忍割汝汝湏急去急急如律令

禁癰腫法正面向東以手把刀按其勢令極以墨點頭重重圍繞然後急摩之即愈

日出東方下赤牛黃牽牛織女教其唾方。若是癰應鉗空。若是瘰應鉗碎。若是癰應鉗破。若是腫應鉗蠶。不疼不痛速去。速去急急如律令。**又法**取東壁土三九向并東置一九三呪曰赫赫洞洞

日出東方。上有臺。臺之山下有清冷之泉。其田甚廣。不登。其土入井中。天公當爛石。癰當散七星。北斗光纖。教我方唾。汝急出。不得留。藏急。急如律令。又九三禁三壺之也。

禁五毒法禁亦得

吸東方青毒南方赤毒西方白毒北方黑毒中央黃毒大海地毒水毒火毒露毒塵毒死生毒百毒之精知汝姓名天毒上界地毒下藏百毒止息五毒滅亡惡毒浪出毒腦破毒腹出毒腸止不止不已拘汝牙折汝齒吸吸叱叱急急如律令

禁腫法通

骨肉皮膚血氣空虛遠入分海氣無男子胎女上胎

腫千腫萬急急如往令作死

七指周於五指右手持勢如法

敷我神方。白刃封鼓。大腫如山。小腫如米。封一腫。萬腫死。急急如律令。先以手按之。父令痛。次以金刀按之。四邊令散。以氣七呵。令熱。然後急氣七吹。令冷。陰陽氣定。然後却唾之。

禁天下大腫法於室中以禁一打令沒以三

東方青帝攝青精之毒氣南方赤帝攝赤精之毒氣西方白帝攝白精之毒氣北方黑帝攝黑精之毒氣中央黃帝攝黃精之毒氣

五方毒蟲并及五精內吾腹中天下最尊者莫大於五帝夫下最神者莫及於五精天下大惡者莫過於五毒吾舍五帝五精五毒與禁共居其聲如雷禁如風霜經口即死淫禁即亡吾禁東方木木折禁南方火火滅禁西方金金缺禁北方水水竭吾上禁朱鳥落下禁升泉枯竭吾禁一腫百腫滅吾禁盤石開深澗却天架摧地柱折曉停光夜呈滅冬變雨夏積雲冷腫熱腫速消滅急急如律令禁水腫方

明曰天陽

後三噤之禁曰日出東方雷起西南墮暴白兔食月中心管月帶日無所不通大腫如山小腫如珠吾唾一腫百腫自除急急如律令

日出東方如懸鼓似白虎吾能唾腫散唾毒爛急急如律令

毒。北方黑帝禁駕黑毒。中央黃帝禁駕黃毒。五有苦口。唾下瘡力。

急急如律令

呪曰：吾口如天雷，唾山崩，唾木折，唾金鈇，唾水竭，唾火滅，唾鬼殺。垂腫滅，池中大魚化爲鼈。雷起西南，不聞其音。大腫如山，小腫如

氣浮遊如米

又法 呪曰：生在水間，那得來人間？石鹽，撮清水一斗，故來。

翼掠腫右翼裂腫不疼不痛不壞不膿急急如律令。

先印齒三

東盛蟾蜍白兔食月中心榮衛不通結成癰大腫如小腫如粟

唾呪一腫百腫散死急急如律令

又法日出東方赫赫煌煌威威容容天門亭長來捕癰腫山多石海多龍天門亭長來捕摩得便斬殺吳開羅一唾當心再唾都愈急急如律令

禁丁瘡法一云初得之時以禁即除愈當三七日愈之

呪曰日出東方赤下黃天上織女教我唾方丁公丁母元出南方子公死丁母亡北斗真氣能治丁瘡吾口如天門不可枉張唾山崩唾石裂唾金缺唾火滅唾水竭急急如律令

禁丁瘡法

用水一椀置囊樹南令揮樹以刀子一枚安椀上刀向樹三指漫撒臨著刀刃上胡跪呪曰上塔伏奴將軍伏奴將軍能治丁瘡今是某年月日姓字某甲年若干患某處生丁瘡或是浮瘡或是癰疽或是三十六丁或是顯發或是水洗瘡或是刀鍊瘡三頭著體於人不量清淨七十葉樹下之水洗之伏藏急急如律令

禁丁瘡法通開禁法一云七遍即差

東海大神三女郎療丁有神方以藥塗此瘡必使丁公死丁母亡丁男丁女自受純星戒即愈大吉良過時不去按送地方急急如律令去東海大神三女郎丁瘡云云

禁喉痺第十

吸唾彈父喉彈母喉彈婦喉彈孫天生汝時緣上自早露誰使汝若人喉裏拘汝牙折汝齒破汝頭破汝脊神不得動不得留俾此斗知汝名吸吸急急如律令

又法

吸日出陽陽吸為喉痺腫毒所傷莫離其痛吸吸急急如律令
禁牙齒法

用桃板長一尺二寸正宮南向閉氣書曰某州某縣鄉里女某甲年若干患口中左右若干齒痛三讀呪埋三路頭以石子蓋之勿反顧南山有一蟲名赤松子不食五穀但食口中齒埋汝三路頭塞汝用石子埋汝著樹東千年萬歲不得起急急如律令

用一枚杖長三擇復取兩指團艾三炷灸杖頭上柱牙上呪曰登高山望海水中有一蟲黃頭赤尾不食五穀專食牙齒吾欲治之握兩指神灸三壯蟲死矣急急如律令

南山大虎北山狐狸江中大獼海中鱸鱖某甲得唾兵來吞除急急如律令

四母湯湯治如右五虎四額三鸛鸛共來食噉速消除積者即入順者即出急急如律令

禁目痛法通開禁法一云七遍即差

日出東方赤如紫陽兒子目痛父母心傷吾口一唾明見四方百藥千治不如吾湯苦唾唾汝汝眼毒消去急急如律令

禁目痛法

神師所唾自有方日出東方右陰左陽腫子生肉瞻視無光吾能誅罰不避饒湯唾目二遍還復故常大吉神師西岳靈方急急如律令

呪禁產運第十一

取蒜七瓣正月一日正面向東令婦人念之一遍夫亦誦一遍次第丈夫吞蒜一瓣吞麻子七枚便止丈夫正面向東行誦滿七遍不得見穢惡受持之法不用見尸喪見即無驗吾歸天剛遊九州聞汝產難故來求斬殺不祥眾喜投母子長生相見面不得久停

留急如律令

唾運鬼法丈夫從婦人口中受取

天無梁地無柱五騎三龍使九虎押運鬼汝身長少許或在人心肝或在人心肺或在人心腎受東海王禁故來追捉汝急急如律令

禁運鬼法

先禹步三匝左手持刀右手持水努目急氣然後禁之噴之曰唾東方青運鬼字青姬年七十南方赤運鬼字赤姬年六十西方白運鬼字白姬年五十北方黑運鬼字黑姬年四十中央黃運鬼字黃姬年三十唾天皇地皇六律九章是公運子之鬼未嫁之女頭亂如蓬腹脹如莒刺害忠良唾汝急出不得留職汝若不去吾遣張丞相捉汝縛送鑊湯急急如律令一云運子之鬼未嫁之女頭不見運女之鬼因緣生速出更不見汝張丞相王問驪鐵運鬼來相過三寸刀先治友支治運鬼唾大山東時見把草摩高十丈治運鬼初來如辟邪不著餘處當骨聚一杯水唾自死急如律令

禁產難方

先禁水一杯與服之乃禁曰天有陰陽地有五行星辰列布日月精明四時變化不失其常骨肉已成四體已強毛髮已就今是生時主運何望河伯在門司命在庭日月已滿何不早生若男若女司命須汝促出無遲并持胞衣急急如律令

禁金瘡第十二

禁金瘡法
呪曰吾拔自前瘡無一瘡一人挽弓萬人驚張一箭破於千陣此禁亦是難當急急如律令

正月一日日出時取四壁下土和酒并並水回東三拜云言是神林願大神如是四方各禮訖口含清水四方悉嚥至日中還復如此七日之中鮮紫瘡戒不得惡言出口禁金瘡即定法元

日出東方惠惠星上告天公下告地皇地皇夫人教我禁瘡吾行步不及與刀相逢斷皮續皮斷肉續肉斷筋續筋斷骨續骨皮皮相若肉肉相若筋筋相連骨骨相承今會百藥不如神師一唾止痛再唾愈瘡北斗七星教我禁瘡南斗六星使瘡不疼不痛不風不膿北斗二台轉星證來急急如律令

唾瘡法
日出東方育育陽陽上白天公下白地王地王有八寶我唾瘡皮皮相連肉肉相連骨骨相連不疼不痛不風不膿連筋續骨北斗七星急急如律令用上氣唾瘡良便有驗神吉

禁血不上法
日出東方下下黃南斗主瘡北斗主血一唾斷血再唾愈瘡青衣怒土却血千里急急如律令

禁瘡斷血法
某甲不良某甲不俱為刀箭木石所傷上告天公下告地皇地皇夫人教我禁瘡一唾止血再唾愈瘡皮相連肉骨相連新瘡舊痛破瘡急如律令

禁金瘡法

吾是天師之子為師之所使執天有經執地有紀一百二十禁呪吾以受之吾禁此瘡金血頂止吾與天地同體令瘡合急如律令

神師所唾口為雷聞唾為霹靂雷公主陰霹靂主陽霹靂賊結氣唾下消亡急急如律令

禁瘡惡瘡法
先閉氣三通神師受告大道最良呪曰

百藥之長不如吾之膏唾吾仰天唾殺飛鳥唾南山之木木為之折唾北山之石石為之裂唾北方之水水為之竭唾百蟲之毒毒自消滅唾百瘡之毒生肌斷血連筋續骨肌生肉實骨斷續醫教我禁方二唾何瘡不愈何毒不去天音神師今在汝處急急如律令

禁水泄瘡法
先左營目二周開目視瘡中閉氣一息欲止然後禁之無弱無強

為其所傷清血無流濁血無往一青一黃一柔一剛皮皮相連筋脉相連南方止血北方止瘡東流海水寒熱如湯朝令瘡愈復故醫王右軍藥術有神還我車起死人不膿不痛知瘡為良水為神急急如律令

禁瘡若人法
添翼丹益添翼丹益丹為兄添為弟法不添杯以玉乃添人肌膚刀來割汝汝來伐汝汝不疾去鹹鹽苦醋唾殺汝急急如律令

禁瘡若人法
一云燒故器器當急速急唾之赤非非添翼丈夫若車移丙丁使者收攝之不得若人體不得若人皮急急如律令

浮陽浮陽火燒東壁東壁窮爛上付河伯還付士癸火精毒滅入地千里急急如律令

禁蠱毒第十二

咒蠱毒母文

毒父龍盤推毒母龍盤脂毒孫無度毒子龍盤牙若是蛆蛛蜈蚣還汝木蜘蛛蜈蚣蛇還汝槽櫃今日甲乙蠱毒須出今日甲寅蠱毒不神今日丙午蠱毒不行今日丙午還著本主雖然不死腰脊痠拒急急如律令

禁蠱毒法

取一赤雄雞薄色者左手持雞右手持刀來至病人力前去屋閣三步便三聲門射力承其申病蠱當令速出急急如律令以雞頭柱病人口中三遍畢以苦酒二合刺雞冠上血內苦酒中便與病人服之愈

咒蠱毒及解法

天無梁地無柱蠱我者還著本主一更蠱毒不能行一午蠱毒不能語太山昂昂逐殺賊先魁弱死魁母亡蠱毒大小驅將入鐵湯急急如律令

又呪曰食鬼將軍摩牙利齒不食餘味止食魅鬼魅鬼九千九萬戶少一不足下符來取魅鬼還著本主不歸本主反縛送與急急如律令

又有將軍字屈丘牙承帶劍持斧出門入戶遠地遊捉得魅鬼便砍頭又有一神字窮奇頭如破筐髮強相口如羅拔惡神祇不食五穀食魅皮朝食一千暮食九百一口不足便來便索急急如律令

禁五蠱用此

九真斗光道氣并行大寒小熱當從內出最巨夷憂除烈水火之

光宅中凶殃大神丈人入其身形恍惚無常大道正教直道常行和氣急滅千下急急如律令

咒蠱毒

東方青帝覺人鬼南方赤帝覺人鬼西方白帝覺人鬼北方黑帝覺人鬼中央黃帝覺人鬼覺公字阿強覺母字阿防有人覺我者還令著本鄉誦覺二七鬼走出誦覺三九覺鬼還向本主走若當不交吾語北斗急急如律令

禁諸注第十四

禁諸注

吾從天南來至北食鹽三斛飲水萬千經江量海手捉丘山口含百毒心懷蚰蛭唾天頂轉唾地陷穿唾石碎裂唾火滅煙唾鬼即死唾水竭淵東方之注自名醫入人體中注心根神師呪注注滅門南方之注自名青入人體中注自脉神師呪注注即易西方之注自名搖入人體中注脊腰神師呪注注即消北方之注自名雖入人體中注心脾神師呪注注即移中央之注自名雉入人體中注十指神師呪注注即死四方之注盡已亡惟我五藏永安強急急急如律令

禁諸注

東方之注自名羊入人體中主腹腸神師呪注注即亡南方之注自名狗入人體中主心口神師呪注注即走西方之注自名雞入人體中主心臍神師呪注注即迷北方之注自名魚入人體中主六府神師呪注注即無中央之注自名雉入人體中主心裏神師呪注注自死

謹告病人身中諸注殃若在心腹及胃腸或在四肢并中央謹告四方諸關節急送血殃三焦關元下部膀胱若有若無不出者上速去百年毒神符欲居汝處急急如律令

綰帛以白紙作金以梔子染之若是遠來之鬼須給過所者亦即給之即日早發遣或待後發遣亦得送鬼之時須挑符一板長七寸闊三指綜縱一條長七寸以朱書板上著年號月朔日子鬼之鄉里姓名年幾從人頭數告五道大神河伯將軍上件鬼某甲等在我家中作如此罪過捉獲正身所索之物並已具給發遣速出去不得久停不得久住急如律令

初粉火治邪法

初粉火治邪亦可以按摩病人若欲斷邪鬼以粉粉火以一炬火著戶外令病人住外又師捉一炬火作禹步燒粉令病人越火入戶還牀以向者一炬送大門外道上去門自步藥之勿反顧師取一盆水著病人戶限內以大刀橫上亦可然燈置病人室內令晝夜不滅至病差師捉火拒燈病人身上隨多少治病呪曰

粉良天火赫赫

天火突突于邪萬惡見火者避急急如律令

呪水噴病人法

先取淨水一器呪二吸氣閉目存鬼神怒五氣擊之呪曰持清持濁持正持水所為物無不消化怒石石裂怒木木折邪不干正危不入身大道流行攝錄邪精神根所怒玉石皆化何病不愈何災不斷速出速出急急如律令

呪水治百病法

先取淨水以器盛之十呪曰

太一之水祖且良舉水向口續神光大腸通膀胱滿五臟入胞囊脾腎太倉耳目皆明百病除差邪精消亡急急如律令

禁惡獸虎狼第十六

夫草野山林行見惡蟲但閉右目以左目營之三匝鬼神見

之伏而頭垂著地也

禁虎入山法

吾登行五嶺前置辟和六較後從麒麟師子揚聲孝吼野獸猛虎聞吾來聲伏地不語若不避吾搬蟲殺汝急急如律令

禁虎走法

天一太一李耳伯陽教我行符獸伏虎狼垂頭塞耳伏匿道傍藏身縮氣疾走千里舅氏之子不得中傷急急如律令

禁蛇毒第十七

三月三日夜向北燒香閉氣誦滿三七遍呪曰日出東方赫赫煌煌報你蛇蟲速逃深藏你若不藏鸛鵲步剛食你蛇頭吞汝入腸大蛇死小蛇亡急急如律令

押蛇頭呪

曰寅加卯寅加卯三遍即愈若欲發蛇毒押蛇尾到誦之卯加寅卯加寅蛇毒即發劇一注驚石相押左手自餘皆同

庚寅卯庚寅卯三遍即愈若欲發云卯寅庚卯寅庚即發辰生巳辰生巳蛇毒即止三遍即愈欲發者云巳生辰巳生辰即發

一名蛇二名蟻

一名蟻三名蟻居近野澤南山腹蛇公青蛇母黑蛇公字麒麟蛇母字接助犀牛角麝香牙鸛鵲野猪牙蛇腹腹熱啄蛇頭頭爛蜈蚣頭鴿鳥羽飛走鳴喚何不急攝汝毒速汝本鄉江南畔急急如律令

禁蛇斂毒法

暉暉堂堂日沒事光安羅之節唾蛇萬方蛇公字蛇蟻蛇母字彌勒汝從江南來江北言汝何失準則汝當速斂毒若不

收毒吾有鴉鳥舌野猪牙蜈蚣頭何啻沙。吾集要藥破汝速出速出飲毒還家急急如律令。

一法

器朱書此符左手把之閉氣唾禁。按目向王為之。吾一唾開天門。再唾諸黃泉。天下有惡毒皆來歸吾前。吾今捉你一唾得千子急急如律令。

山鵲蛇 山蚌 山青蛇 澤青蛇 馬蛇 蛟黑似蜥蜴

右六種蟄人不死令人發病呪曰。

吾有一切之禁。山海傾崩。九種惡毒。元山南廂。令渡江北。專欲相傷。吾受百神之禁。惡毒元山南廂。來江北截路傷人。

吾一禁在後。你速攝毒受命千年。急急如律令。

白朝蛇 蒿脊蛇 赤蛇 黃蛇 水蛇 青蛇

右六種蟄人不傷。宜禁即差。

子蛇 尺八蛇 土蟻蛇 沙蟲 毒到蛇 白蟻蛇

因蛇 蜈蚣

右八種蛇人著者。宜樂治呪曰。

道邊一木百尺無枝。鳳凰常如絲連。去去吾不知。急急如律令。

禁蠍蜂第十八

禁蠍法。向王為之。

蟻蟻神祇。八節九枝。兄字王。弟字蠍兒。公字腐屋章。母字爛蒿枝。但自攝飲汝毒。不失去何為。急急如律令。

蹠蹠移移。八節九枝。公字腐草。母字蒿枝。緣他離落。蟄他婦兒。何不收毒。欲往何為。山雞戴勝。食汝四肢。頭破尾折。伏地莫移。急急如律令。

爾後。不得動尾。云云。

又曰。蠍蟲毒止。速收你尾。河伯將軍。鐵鉗銅指。押你腰斷。不得動尾。急急如律令。

禁毒蠍蟄人法

先二日齋戒。正朝一日。日未出時。淨澡浴洗手。北堂東頭下。

誦之三。七遍。呪曰。

天有八節地有九枝。一非草木。二非蒿枝。上他牀上。傷他婦兒。速去速去。戴勝來追。不痛不疼。不腫不膿。急急如律令。

禁此毒。開氣向王為之。

東方青毒還東方 南方赤毒還南方 西方白毒還西方

北方黑毒還北方 中央黃毒還中央

黃蜂。蟻。黑蜂。赤蜂。王有。小女。嫁與河伯。吾有銅掌鐵指。押汝便死。汝是小蟲。何不速去。毒陰。吾曰。大鳥數翅。三千八萬里。不得張口。汝應是死。急急如律令。

禁毒法。向王為之。

兄弟二人走出野。犬兄名蝦。南山上下。中兄名蛇。走田野。小

弟名蜂。看屋梁。堅如瓦。熱如火。二七唾。毒當墮。急急如律令。

蛆似蜂。著山。蟻似蛇。著山。腹老。蛇咬。緣木。枝。兄弟五人。吾

都知攝汝五毒。莫令移汝。不攝毒。滅汝族。急急如律令。

日出東方。赤黃瓜。熟離蔓。根熟離。桑東家。蟄人。狗西家。

好婦娘。呪此小蟲。雄狐。毒死。雌狐。毒亡。急急如律令。

禁狗鼠第十九

呪曰。日出東方。何堂堂。狗不名。狗名大黃。皇帝遣汝時。令

啣候。鼠不令。汝。齒人。傷若。齒人。傷白虎。吞入汝腸。急急如律令。

爾後。不得自不去。虎。急急如律令。

禁狗毒法

天牙狗齒大父李子教我唾汝毒出乃止

皇帝之神食汝腦髓白虎之精食汝之形唾汝二七狗毒便

出急急如律令

禁狗令不咬人法

吾口如天門不可枉張古如拔劍唾如秋霜北斗照耀列宿

天蒼集聲氣止其發陽牽牛持形織女侍傍此之小咒

之滅亡天狗地狗何反不走欲傷我者牙折口啞急急如律

令

取西廂屋簷下土構木銷羅之和犬苦酒漬作團如雞子於

瘡上摩之呪曰

東方木為折 南方火為滅 西方金為缺 北方水為竭

中央土為絕 吾太上府逢西王母教我禁毒誦我神方東

句枝西句枝庶民狂狗咬我天公兒急出急出汝若不出莫

使我怒吾能唾山崩唾石裂唾火滅唾海竭速出速出急急

如律令如此三呪壁泥中見隨狗毛色有驗

又取竈中黃土與水和作泥丸如雞子大摩瘡上隨犬毛色

毒隨而出壁破泥丸明視之瘡痛則又以一盆水寫屋上以

器盛取以洗瘡餘水破落地則和為泥封瘡上壁中必見犬

毛色瘡不疾痛也

禁狗咬人法

呪曰汝是小犬惡獸之餘為物有幸得與人居汝命如泥土

精空虛吾以西方白虎咬汝頭汝毒急收急急如律令

凡向人家先以脚踏踏右呪曰

主人某甲家門丞戶尉離落諸神主人有狗黃白不分師來

莫驚師去莫瞋急急如律令

禁狗不吠人法

黃狗子養你遣防賊捕鼠你何以嚙他東家童男西家童女

吾請黃帝電君靈宮社土付與南山黃斑北山黑虎左脚踏

汝頭右脚踏汝肚向著必來咬殺食汝狼在汝前虎在汝後

三家井底黃土塞汝口吾養你四脚跪不得走右腳不得左

擲擲草吾來上牀汝亦莫驚吾出十里汝亦莫起急急如律令

禁狗咬人法

挑枝一枚穿草索一條呪曰

天皇地皇如雷相雷天皇教我壓鼠羣侶聚集一處地皇教

我壓鼠羣侶聚集一處此法時於室中淨掃地尤前遍掃之挑枝以

壓鼠失魂精群陽相將南一作自失明呼喚盡集在於中庭

急急如律令作此法時於室中淨掃地尤前遍掃之挑枝以

草索結於中腹以三箇咒立呼之矣

禁狗咬人法

切越時以有湯浴盆置室中及庭前地訖用三盆三家聚粉

以刀子橫置盆上以安咒之以筆一管去盆三尺著地所有

尤前安天庚一尺上作十字一云尤上紫字乃呪曰

北斗三台招搖所錄天李自形必歸所屬寄食附人穿尤我

屋胡為楊時飲食欲熟熟鼠王召集羣屬大鼠小鼠并須

來食側立單行洗盥心垢伏罪勿走汝父小奚汝母幽方汝

兄阿持汝弟阿當汝妹僕姜室家相將歸化坐傍固告勸汝

莫以復言急急如律令

禁狗咬人法

鼠必受養牛必栗癩蟻必栗癩犯犯必栗癩母名必栗癩

三癩神來赴

欲辟之法悉在華上勿得東西

解放鼠法

日東向曠二里西向曠二里方八里此廣闊耐停止雞零星牽至廳雞零牽至衙汝等此中行勿得與人相牽觸當斷汝手足急急如律令

禁鼠耗并食蠶法

呪曰天生萬蟲最不良食人五穀咬人蠶桑腹白背黑毛短尾長跳高三尺自稱土公之王今差黃頭奴子三百箇貓兒五千頭舍上亢中之鼠此之妖精呪之立死隨禁破滅伏地不起急急如律令

乾坤定位陰陽化成門

丞戶尉侍從交并二十八宿黑白赤青子殃萬怪急急如汝形吾知汝姓吾知汝名急須屏跡不得久停違即斬殺萬不得生急急如律令

又呪曰日出東方赤如紫陽百怪妄起損害忠良吾口呪之辟除凶殃怪聞我呪速去他方禍去福來萬惡皆藏急急如律令

護身禁法第二十一

呪曰諸聖聖王帝三星三星三星天翻地覆九道皆塞使汝失心從此迷惑以東為西以南為北人追我者終不可得明星北斗却閉一里六甲反張不避禍殃車追我折其轂軸車馬追我折其兩目汝行追我腫其兩足揚兵追我刀反自伏明星北斗却敵萬里追我者亡貢我者死牽牛織女化為江海急急如律令

太一神人曰凡欲遠行難若為惡人迫逐危厄之中出門

為步二呪乃去可以消災追我者迷惑五道旋轉到還惡人欲來侵己者逆而却之呪曰

東方青毒南方赤毒西方白毒北方黑毒中央黃毒五毒之氣今有某甲無道欲來侵吾被太一神符歷行四海要風駕雲便有限會某甲懷惡逆之心殘賊忠良不肯休止五毒之氣并力收攝付與地官莫令某甲復懷惡心賊害之意應時了命言切千二百等急急如律令

惡人法

先却三步捻生人喉又以左足大指躡地呪曰此斗神君來滅惡人斬截冤家某甲頭送上天門急急如太上老君咒剛律令

惡人法

惡人欲來侵害者先閉氣三噓竊呪勿令人聞呪曰頭戴朱雀足履玄武左佩青龍右佩白虎吾來到處百惡悉走吾有天下力士推殺惡鬼遠送千里急急如律令

驅邪法

某甲左青龍蓋草甲寅右白虎蓋兵甲申頭上朱雀陵光甲午足下玄武執明甲子牌為貴子中央甲辰甲戌急急如律令

右此一法凡是學人常以旦夕間誦令熟莫使聲出若有縣官口舌軍陣危險厄難之處四方興功起土殃禍之氣或入他邦未習水土及時行疫癘但以晨夜數數存念誦之勿忘若吊喪問病臨尸凶禍之家入門一步誦一遍出門三步誦二遍皆先叩齒三通并捻鬼目

凡行山澤晨夜恐怖之處使人鬼惡終不相忤呪曰

人皆演我獨清人皆去我獨停人皆極我獨丁人皆枯我獨榮人皆破我獨成天長地久我與并依文昌遊心星登太玄星葉庭飲甘露食陽精佩日月體安寧乘三鳳駕羽英堅藏擇九天仙公以越刑急急如律令

人皆禁咒之法

先捻生人喉呪曰

煌煌煌煌天有九柱地有九梁北斗七星為我除殃青龍在前白虎在後青龍飲汝血白虎咬汝喉頭破腦裂汝死不擇日急急如律令

人皆禁咒之法

噴之行頭及天公亦是吾師坐頭及天公亦是吾師眠卧及天公亦是吾師却看天師欲作禁吾解千禁萬惡若有禁吾反自著急急如律令

人皆禁咒之法

南無伽帝伽帝伽帝伽帝收攝避南無阿乾陀羅阿彌陀羅灌陀沙婆呵

右此法能令家內有不孝子不順婦女皆孝順用法取一把土呪三七遍置家大門下又呪一把置中門下又呪一把置堂門下又呪一把撒在井中又呪一把置竈額上如是七日內外自然和順但使行禁人精心呪之

又凡人行處不安穩疑有恐怖之事即以氣嘆之便以拒禁呪之曰急令辟惡鬼除制不祥眾邪消盡魘魘逃亡神符宣流以知天惡當我者死值我者亡急急如律令

人皆禁咒之法

唾三十六鬼大鬼打頭破作七分如阿梨樹枝沙呵

人皆禁咒之法

凡行經神廟及斷虎狼呪

吾為大地祭酒當為天地頭戴日月身佩北斗急急如律令

人皆禁咒之法

呪曰吾是元皇之孫太上之子口含聖真神氣付與東西百鬼隨吾驅使吾東向一唾九木折南向一唾八火滅西向一唾金剛缺北向一唾流水絕道氣流布隨吾所說急急如律令

禁賊盜第二十一

夫欲出行先畫地為壇房中六尺庭中六尺野外六十步置十二辰位身居甲地自呼名某乙今欲出往某處

征討時神保佑於我吉昌三言乾大呼青龍下呪曰六甲九

章天圓地方四時五行青赤白黃太一為師日月為光馬前

開道蚩尤辟兵青龍使舉白虎承德發威先引辟除不祥北

斗誅罰除凶去殃五神導我周遊八方當我者死向我者亡

欲惡者先受其殃吾受北斗之孫今日出行東青龍出天

門入地戶進陰中履毒去惡賊手摧刀戟戟我身我摧伏

莫敢當禦急急如律令

人皆禁咒之法

唾此惡賊欲來狂圖某甲者或從東方青帝來或從南方赤帝來或從西方白帝來或從北方黑帝來或從中央黃帝來

欲來傷善人者令其作事莫成拔刀自刺按箭自射吾於四

道關通盜賊伏匿五兵摧折蜂蛇莫動大星併側自步莫令

相傷吾禁五方惡賊伏吾手下不得浪行急急如律令

呪童子令說鬼姓字第二十二

太上老君禁神三呼三吸以取其真

東方青帝木中精 南方赤帝朱雀形

西方白帝白虎神 北方黑帝乘軺行

中央黃帝黃龍聲

中央黃帝黃龍聲

愚
仇天

九九

使靈符

三
法

王
國

魁
如
木

1

27

度符啓誦神言曰

先上香叩筆三以筆指口噀六鼓

謹請東方青帝老君來下纏吾筆

謹請南方大帝老君來下纏吾筆

謹請西方白帝老君來下纏吾筆

謹請北方黑帝老君來下纏吾筆

謹請中央黃帝老君來下經吾筆指天天傾指地地寧指鬼

鬼死指人人生急急一如太上老君律令

請五方水度符言曰

謹請東方青龍真氣入五尸水中

謹請南方赤龍真氣入吾水中

謹請西方七龍真氣入吾水中

謹請此方黑龍真氣入吾水中

蓮請中央黃龍真氣入吾水中

符隨符言之
神符度呪曰

卷之四

日出東方光曜表裏行符動水出於老子老子行符從五所
使東九夷從符行南八蠻從符起西六戎捉鬼軍北五狄破
鬼營中三秦從符所攝急急收錄一鬼不去斬付比獄天有
三皇地有九黑某所行符自有法則非當吾其當符者死值

符者亡一鬼不去斬付鬼剛急急如律令

又曰符主東方木折 南方火焚 西方金缺 北方水竭

中央土裂 符主天清地裂人生鬼滅急急如律令

嚙水三口 度神符主符啓請

謹請虛無直事三十六人從吾符行

謹請太清直符直事。今歲直符直事。今月今日。今時直符直

事各二十六人從五符行保某家弟子二災度脫急如律令

水二口又曰天圓地方六律六章神符燒香災危消亡符

到奉行急急如律令

禁經上下兩卷一十篇其門辭語鄙野蓋出俗傳思

文政十一卷

影元大慶寺本

千金翼方卷第三十

文政十二卷

校正千金翼方後序
夫疾病之至急者有二。一曰傷寒。二曰中風。三曰瘧疾。是二種者。療之不早。或治不對病。皆死。不旋踵。孫氏撰千金方。其中風瘧疾。可謂精至。而傷寒一門。皆以湯散膏丸。類聚成篇。疑未得其詳矣。又著千金翼三十卷。辨論方法。見於千金者。十五。六。惟傷寒。謂大醫湯藥。雖行百無一效。乃專取仲景之論。以太陽方證。比類相附。三陰三陽。宜忌。霍亂。發汗。吐下。後陰。易勞。復病。為十六篇。分上下兩卷。亦一時之新意。此於千金為輔翼之深者也。從而著之。論曰。傷寒熱病。自古有之。名賢濟世。多所防禦。至於仲景。特有神功。尋思旨趣。莫測其致。有以見孫氏尊神而神之心也。是一書表裏相明。至纖至悉。無不該備。世又傳千金體者。觀其立意。殊非孫氏所作。乃好事者為之耳。王道集外臺秘要方。各載所出。亦未之見。似出於唐之末。佚博雅者。勿謂其一家書也。至於合藥生熟之宜。炮炙之制。分兩升斗之齊。並載千金凡例中。此不著云爾。

大德丁未良月
梅溪書院刻梓


國立中央圖書館珍藏善本書秘笈
宋溫大明真人撰 清經鉏堂鈔本

溫隱居海上仙方

自由出版社印行

本書承 國立中央圖書館
惠借原書 謹此致謝

海上仙方序



余家世南京高祖因宦遊寄跡四明所謂醫書奧旨
初得醫士王承宣心傳之妙更歷三世至先君制幹
隨侍丞相入都城遂以儒醫名於時余讀父書密受
奧旨自淳熙改元始續先業遍遊京邑纔七八年因
已出入士大夫之門而朝野以是艸木知己迄今四
十餘載備見前輩後輩初學未學興廢不一蓋由用
藥治病僥倖於目前故福善禍淫報應於身後吁可

憫也予日迫桑榆之景心棄名利隱居求志恨無以
惠人輒取五世家傳名方併生平行醫應効丸散與
夫古今聖賢諸方歷學請問四方名士海上良法集
為一冊詩計七十七首的有起死回生之効活人以
代耕設或私藏則所濟者狹矣謹錄施以傳非惟世
人有疾者一展卷而識之得此者亦可以自助豈曰
小補之哉

保義郎差充殿前司提點諸班醫藥飯食兼和劑局

監收買藥材官溫大明謹序

溫隱居海上仙方目錄

中風

瘡毒

中寒

半身不遂

口眼喎斜

赤鼻

脚氣

痿

肩背肢痛

喘滿

痰飲

頭痛

氣聚

不眠

胸滿

白濁

消渴

脾寒

足疾

膝痛

脾黃

食傷

腹痛

胸腹痛

瀉利

久利

喘嗽

久嗽

暴感

傷風

感寒

月候不調

崩

過期

帶

虛勞

食復

寒熱

脾寒

熱渴

兩感

感風

氣奔

腹疼洩瀉

脾胃虛寒

暑中

血崩

愆期

室女經閉

胎動

痘疹

兒吐

面黃

泄利

口瘡

咽喉

目疾

盜汗

腹脹

腰痛

不伏水土

鼻衄

又

久衄

崩中

驚

搐

疳

齋浮

又

目昏

目赤

護目法

熱瘡

痔

金瘡

脚裂

目終

溫隱居海上仙方

中風

中風氣逆有痰涎

蘇合姜調灌下咽

次用省風兼續命

多增木射二香煎

往往中風之症多因喜怒不常或飲食停滯或怒氣傷神惡慮過度損于心藏用局方蘇合香丸三粒生姜自然汁化開灌下咽喉次用局方省風湯小續命

湯各加射香木香依法煎服

瘡毒

瘡毒年深變癩風

眼圓鼻陷遍身紅

楓油惡使烏沉和

兩月調停有大功

切詳大風或年深瘡疾或鼻梁崩倒頭面生瘡不能
已者局方烏沉湯用大楓子油一兩五錢微火熬和
烏沉湯麪糊為丸如桐子大每服三十丸食後茶清
送下久服必有神効

中寒中氣

中寒中氣厥而殭

朮附加煎蘇合香

惟有老人多氣弱

須吞養正助元陽

中寒中氣之候四肢厥冷口噤牙關緊急痰涎壅盛
如中風狀者用局方朮附湯一劑生姜二十片水二
錢煎八分去渣後調蘇合香丸二丸併進二服或氣
短頭暈手足厥逆未遠者可服養正丹五十粒至百
粒

半身不遂

不遂須將氣飲詳

姜調蘇合橘皮湯

省風續命徐徐進

二藥仍須入木香

不遂之症緣因心腎虧損喜怒不常或服食停飲怒
氣傷肝過憲損心之所致用局方蘇合香丸姜汁調
化數丸分為三服陳皮湯點服次服省風湯小續命
湯加木香依法煎服

口眼歪邪

口眼喎邪是中風

筋痛煩熱遍身中

急煎五七加芍藥

蘇合香丸速有功

風寒濕氣留滯經絡手足頑麻口眼歪邪項強筋疼
遍身煩熱未可使用風藥宜煎局方五七散加芍藥
三錢用水三錢姜十片煎殘半去渣勻三服調化蘇
合香丸三丸

赤鼻

肺風赤鼻最難醫

我有良方付與之

但用硫礬為細末

調塗茄汁甚為奇

肺風赤鼻乃酒渣之病也其病調治為難用硫黃白礬等分為末水茄子汁調塗鼻上如無水茄子將乾汁調敷患處

脚氣

老病之人脚無力

補虛滋養能何益

不如附朮木瓜香

送下震靈有功績

老少久病行步乏力筋寒骨痛用朮附湯加木瓜木

香剉一塊水三盞姜二十片煎取棧半去渣化震靈丹五丸作二服如重而疼加白芍二寸同煎

痿弱

心腎不足如老學

下部痿衰陽氣促

黑錫丹與定志丸

却將附益煎湯服

老少心腎虧虛膀光虛寒下部痿弱用局方黑錫丹三百粒定志丸二百粒和研入糯米漿為丸如桐子大陰乾每用附子半只炮去皮臍益智仁二十粒入

鹽少許煎取八分去渣送下前丸三十丸

肩背手足痛

肩背手足痛如掣

濕在脾經故若斯

四物湯加烏沈木

更兼蓬朮最為奇

脾經受濕令人肩背四肢走注作痛用局方四物湯加蓬朮二塊如錢大木香烏藥沈香各一錢水三錢姜十片煎一錢二分去滓分二服滓再煎之作二服如味苦瀘加甘州二寸同煎

喘滿

喘滿生痰治療難

諸醫用藥未能全

須將滑石同半夏

皂子生姜立便安

喘滿皆因肺氣不利上逆脘膈生痰用半夏滑石各
一兩為末每服三錢水二錢加皂子三挺剉六段姜
十五片煎八分去滓少入蜜再煎頓服

痰飲

積年痰飲漸成風

口眼喎斜語不通

蘇合香涎調半錢

青州丸子有神功

年久痰飲停滯胸膈忽然痰涎壅盛四肢頭面口眼
歪邪言語不清用蘇合香丸三立姜汁化服或服青
州白丸子五十粒

腦寒頭痛

頭痛有寒兼風痰

晝夜呻吟不得安

白芷太陽同研末

水調貼上勝靈丹

腦寒之病皆因風邪上攻令人頭痛晝夜不安用局

方太陽丹加白芷末五錢調傅患處

痰飲氣聚

痰飲氣聚及結胸

頑痰停滯不能通

銀硃礬石鎔作劑

姜汁調咽有大功

飲結氣聚結胃皆因頑痰停積胸滿氣噎用銀硃白礬等分鎔化作丸如彈大每服一丸姜汁化下

勞心膽冷不眠

勞心膽冷夜無眠

棗柏仁加定志丸

研和丹丸梧子大

更加硃乳甚相安

勞心胆冷夜卧不能合眼者用局方定志丸一劑加
棗仁柏子仁等分炒香為末搜和為丸如桐子大硃
砂乳香為衣每服五十丸棗湯送下

胸滿

胸滿生痰要早治

先教咳嗽肺傷殘

白礬半夏加栗殼

姜汁為糊可作丸

風痰互阻胸膈痞滿噎塞不通用半夏白礬嬰栗壳

等分為末生薑汁糊丸桐子大每服三十丸姜湯送下日三

白濁

白濁遺精最損人

茯苓益智與烏沈

生薑一片水一錢

煎服何憂歲月深

白濁之病由心氣不足所致用局方烏沈湯一劑加茯苓一錢益智仁二十粒生薑五片水二錢煎八分去滓日二服

消渴

心腎虛成消渴患

水漿晝夜渾無味

連膠八味和為丸

數服須教減一半

消渴之病由心腎虛弱或少年服乳石過度其病大渴引飲用黃連阿膠丸一料八味丸二料合和為丸如桐子大每服三十丸另用蓮肉北棗栗肉木瓜各二錢水一碗煎七分去滓送前丸若病久胃虛飲食減少加陳皮二片砂仁十二粒搥碎煎服

脾寒

腹脹脾寒怎抵當

枳姜之外有丁香

三般等分為淨末

次入些鹽點白湯

脾疼之病由寒氣停滯積于胸膈時吐酸水不思飲食用胡椒良姜丁香各等分為末每服一錢入鹽少許白湯點服

三疾

濕氣周遊腿脚痛

香蘇飲煮路路藤

木香芍藥仍增入

功效如神不可言

濕氣下行以致腿脚痠疼足面赤腫步履難行用局
方香蘇飲加路絲藤木香赤芍各二錢姜十片以水
四錢煎至二盞去滓分四食前後服

膝痛

多年脚氣不曾安
膝痛筋寒步履難

木附宣瓜同南木
煎湯送下石南丸

久年脚氣或年老膝疼不能行步者用局方木附湯

信用附子加木香木瓜二姜五片以水三錢煎取一
錢二分去滓送下局方石南丸五十粒或元氣虛弱
前飲送震靈丹十粒

脾黃

脾黃腹脹服連喬

酒食紅丸始可消

並煮香蘇來送下

更加草果自和調

如患酒積食積胸滿刺痛用局方香蘇飲加草果二
個煨姜十片以水三錢煎取錢半分三送紅丸數服

或連翹九尤妙

食傷

脾疼腹脹惱心腸

痞悶多因食氣傷

快取縮砂三和散

煎湯調服理中湯

久患腹脹脾疼中滿痞閉二便秘塞用三和散二劑
砂仁二十立搥碎姜十片燈心十莖以水三錢煎取
一錢分三調理中湯服

腹痛

腹痛多因脾積干

元來大小便艱難

治中加縮吞神保

諸症無憂立見安

腹痛之病由寒氣停積二便秘塞急痛用治中湯加
砂仁二十立搗碎生姜十片以水二錢煎取八分去
滓分二送神保九十粒

胸腹痛

脾腎俱虛寒氣堅

胸中腹下痛相連

多因食飽傷飢得

須用烏沉送正丸

脾腎氣虛臍腹下痛或胸膈滿悶用烏沉湯送正元
丹一服

瀉痢

多時瀉利腹中寒 晝夜應瀉數十番

但把砂仁並粟米 煎湯送下駐車丸

腹痛瀉利頻頻晝夜不能安卧或病後腹痛洩利不
止用駐車丸一劑分二另加砂仁二十粒米二百粒
陳皮二片姜十片北棗二斤以水三錢煎取棗半日

二服

久利

久利腸虛腹痛時

局方有葯可修治

砂仁陳皮與米煮

一錢湯調赤石脂

久利腸胃虛弱或時腹痛用赤石脂湯二料分三服
加砂仁二十粒陳皮一大片陳米百立姜十片棗二
斤以水三錢煎至錢半去滓勻三次服

喘嗽

喘嗽何憂遠近年

橘皮半夏紫蘇煎

更加鴛粟殼七斤

氣急痰涎日下痊

肺感寒邪氣道不利上迫喘嗽或時喘急用橘皮半
夏湯加粟殼七斤烏糝一斤姜十片以水二錢煎取
八分去滓臨卧服

久嗽

老人病喘治尤難

半夏湯吞養正丹

更用紫蘇并粟殼

服時須把重輕言

老人宿病喘滿氣道不利痰涎壅盛用局方橘皮半
夏湯加赤苓一錢烏朮一錢紫蘊葉二張姜十片以
水二椀煎至八分去滓勻二次每次送養正丹五十
粒甚者加栗殼煎服

暴感

感受風寒神昏沉

寒熱痠疼力不禁

半夏姜茶煎五積

渾身清健值千金

風寒傷于形體令人頭目不清寒熱並發百節痠疼

用五積散一劑加半夏糊如錢大一塊生姜一片江
茶少許以水琰半煎至八分去滓溫服小便赤者可
加烏梅肉二個燈心十莖同煎

傷風

微嗽聲還傷風重

發熱頭疼身又痛

白芷姜汁調消風

或塗或服双行用

傷風之病令人頭疼身重發熱微嗽用消風散一劑
分二服加香白芷二塊姜汁一蛤殼白湯八分一琰

調散服並調散膏敷太陽

感寒

身疼體倦感寒邪

口渴頭昏熱更加

面赤煩煎和解散

仍添赤芍病煩瘥

感寒發熱頭疼體痛局方和解散加赤芍二錢生姜
五片烏梅兩分江茶少許以水三錢煎取錢半太滓
勻兩次服

月候不調

月候不調緣恚怒

食少腹中常痛楚

四物乾姜并橘皮

粟砂甘州為同夥

婦人月候不調用四物湯一劑乾煨姜一塊炙甘州

寸半陳皮

粟米

砂仁

以水二大椀煎

取八分去滓溫服

崩

粟艸加煎四物湯

更兼香附與乾姜

月經若要調勻好

減半川芎與地黃

婦人月候頗多狀如崩者四物湯加香附三錢乾姜一塊甘草一寸米百粒以水三錢煎取錢半去滓空心食前服

過期

月信已過不曾通

四物湯中減半芍

蓬朮乾姜仍加入

連煎數服有神功

月信過期不至皆因寒搏于內四物湯加蓬朮剉碎一塊煨乾姜一塊以水二盞煎取八分去滓空心食

前服室女減半

帶

婦人暗病沒人知

面色痿黃力漸微

牡蠣乾姜並芡殼

同和龍骨赤石脂

婦人暗病乃是赤白帶下也用赤石脂二兩煨牡蠣
煨煨乾姜煨龍骨各一兩雞頭殼二兩無殼以實代
並為細末酒和為丸桐子大每服五十丸食前艾醋
湯送下

虛勞

乍寒乍熱漸成勞

噎膈胃滿食不消

樂令建中加艸果

連進數服自和調

虛勞寒熱皆由形體虧虛血熱不足用樂令建中湯
加大艸果二斤麵裹煨搥碎姜十片烏棗北棗各三
斤以水三錢煎取一半去滓勻二次服

食復

病後傷脾胸膈滿

老人強食氣短虛

雖然可食兼惡心

艸果頻加五積飲

病後傷脾胸滿氣短用五積寬中散加艸果二斤煨
生姜十片以水一琖煎取半琖去滓溫服

寒熱

或寒或熱定無准

體倦身疼渴思飲

半夏門冬柴與果

加煎四物能安寢

寒熱似虛用四物湯加柴胡半夏麥冬艸果各二錢
生姜十片烏雞白朮各二斤以水三琖煎半去滓勻

二服

脾寒

脾冷不磨停水谷

腹痛膈滿脹心胸

但將五膈煎三服

可下尋常小理中

脾藏主磨于水穀今脾氣虛弱飲食停滯胸膈痞滿
用五膈寬中散煎送小理中丸

熱渴

口乾心煩小便急

邪熱攻人水頻吃

姜朮白芍與門冬

冷點五苓其病釋

邪熱攻心令人溲赤渴飲用五苓散加白芍三寸切
片麥冬肉五十立姜五片烏朮一斤水三錢煎半去
滓分三服

兩感

身疼體倦感寒邪

口渴頭暈熱更加

面赤藿香和解散

仍添赤芍病即瘥

兩感發熱頭疼體倦用和解止氣各半劑加赤芍二

寸生姜五片烏朮二斤以水三錢煎取一半去滓分
二服

感風

感風頭痛體昏沉 寒熱疲楚力不禁

一山茯苓入五積 茶姜燈州黑梅並

感風傷漸頭目不利寒熱體疲用五積散加赤茯苓
如錢大一塊以水錢半取八分去滓溫服甚者加江
茶少許姜一片灯心十莖烏朮二斤

氣奔

脾腎俱虛冷氣奔

冲心疔痛體不溫

更兼下部多穿注

青木香丸智散吞

脾腎虛寒心腹疔痛用益智散以水二錢入鹽少許煎八分去滓食前送青木香丸四十粒

腹疼洩瀉

肉桂姜來同華撥

良姜四味同為丸

腹疼冷瀉能收効

和劑方名大己寒

大治男婦腹痛冷瀉不已用續已寒丸依法煎服

脾胃虛寒

脾虛胃冷嘔吐不止諸藥不効用胡枌五十立雞舌
香十立如無以丁香代之共為細末白湯調送靈砂
數立

暑中

暑中妙劑孰為宜

官局方中有縮脾

甘州乾姜加州果

烏梅同煎服何疑

暑天酷熱炎邪侵犯用縮脾飲加甘州乾姜州果烏
梅各等分以水二錢煎半去滓服

血崩

血海崩來是幾年

諸般調治不能痊

炒香附子燒連殼

送下震靈一十丸

婦人血崩不止以香附炒赤色蓮房燒灰等分每服

三錢陳米飲調送震靈丹十立

愆期

人參荊芥入麦冬

半夏乾姜亦有功

能療婦人寒熱病

更除痰嗽快心胸

婦人寒熱因經候不調所致用荊芥散加乾姜麦冬
半夏各等分水煎取半勺二服孕婦忌

室女經閉

氣閉能令血不通

那堪寒熱遍身中

柴胡蓬朮兼甘州 四物同煎力有功

室女血閉不通寒熱者用四物湯加蓬朮柴胡甘州
各等分水煎取半去滓食前服

胎動

胞胎忽動是勞傷 或疼或痛用早防

但取局方膠艾服 更加烏藥與乾姜

胎動不安因勞傷胞絡以膠艾湯加乾姜烏藥各一
塊同煎溫服

痘疹

小兒痘疹最難鑒

紅潤分明不用疑

若見數粒黑點子

酒煎紫艸灌孩兒

小兒痘疹見點紅活根盤粗大為妙如間有黑點乃
邪毒內蘊用紫艸茸二三錢陳酒半錢煎至三分去
滓灌服

兒吐

久吐嬰兒不易鑒

多因痰嗽及傷脾

但加十粒丁香子 半夏湯中有橘皮

小兒不宜嘔吐如有此症急用橘皮半夏一服加丁香十粒杵碎姜七片甘草寸半微炙以水二錢煎取八分去滓令乳母食後服之留一小蛤殼令兒勻五次服或調青州白丸子一二丸或調來復丹一二丸量兒大小加減

面黃

面黃童子身常熱

多是乳娘食不節

常宜降氣及烏沈

免得孩兒生病孽

小兒之病多由乳母過食傷乳致兒不能運化宜服
烏沈湯降氣令乳脉調勻

泄利

小兒冷熱成瀉利

乳食不消何曾歇

砂仁粟米送香連

更有橘皮方可急

小兒泄利局方中有小兒香連丸量兒大小或十粒
二十粒加砂仁粟米陳皮生姜北棗等分以水二錢

爛半送丸

口瘡

虛熱攻人口發瘡

舌間腐爛滿涎流

江茶細末同甘艸

摻入瘡瘍清且良

口瘡由伏熱內攻滿口生瘡疼痛不已用江茶甘艸
等分為末敷患處

咽喉

熱毒多因酒醜傷

咽喉腫痛口生瘡

白朮細把江茶和 含化多番便復常

咽喉口瘡急用白朮數斤去核茶末同打為丸每含
一丸

目疾

連夜不眠病宿眼

見燈強視眵弦爛

但將湯浸常洗

血氣調和無此患

目為五藏六府之精華一身之珍寶連旬不睡強視
燈燭目損光明眼眶赤爛多令目昏按道藏經云當

歸活血宜用此泡湯頻洗奇效

盜汗

盜汗多因心體虛

防風牡蠣朮芪麩

同煎姜棗調香散

補助身心樂有餘

盜汗由心腎不足形體有虧用局方妙香散同防風
牡蠣白朮黃芪各二錢麩皮炒生姜五片棗三合以
水二錢煎至一錢半去滓勻二次服

腹脹

藏寒膨脹是脾虛

丁木檳榔等分寒

卜子牽牛同研末

丸如梧子病能康

腹脹之病由脾胃虛寒症見面目虛浮時時腹脹用
楊氏家藏消脹方內木香檳榔黑丑卜子加丁香各
等分滴水為丸每服十五丸紫蘇湯送下

老人腰痛

腿痛骨疼屬老人

骨寒髓冷苦難禁

鹿茸炮附山查子

為飲為丸病自輕

老人腰痛由陽氣衰弱腎藏虛寒用鹿茸五錢酥炙
附子一升炮去皮臍山查五升生薑十片以水三
錢煎取八分去滓溫服如丸姜汁為丸桐子大每服
三十丸溫酒或鹽湯下

不伏水土

不伏水土忽寒熱 似瘧不似真難決

姜調蘇合少黃丹 連進數錢精神悅

不伏水土由脾胃虛弱觸悞寒邪致令寒熱如瘧用

姜汁一蛤壳調黃丹五分更用射香蘇合丸三粒白湯調服

鼻衄

鼻衄從來最損人

皆因熱毒蘊心經

蒲黃青代勻平秤

水和為膏貼耳後

鼻衄由熱毒蘊積心經用蒲黃青代各五錢水調成膏貼耳後

又

鼻衄無時整桶流

祈求問卜苦哀求

但用南康真蛤粉

半塗半服便無憂

鼻衄如泉用真蛤粉二兩為末冷白湯調服用少許
搽鼻中

久衄

多年鼻衄不曾休

涼藥無功熱藥投

養心丹與黑錫丹

更兼三里艾丸灸

用局方養心丹異錫丹依法服更灸三里穴二十一

壯

崩中

婦人室女血山崩

冷熱未分何治決

荆芥蓮房燒作灰

湯調一劑偏奇絕

崩中下血不分冷熱用荆芥蓮房二味燒灰存性每服二錢米飲調服

驚

急慢驚風有差別

蛇頭蝎射及辰砂

防風滴乳吳公灸

更入星鳥可能瘥

驚風多有等殊或急或慢虛實吐瀉用花蛇頭一斤
燒灰全蝎二錢射香一匙辰砂一錢防風乳藥各五
分蜈蚣一條炙南星一錢炮川烏五分生並為細末
水煮棗肉為丸芡實大陰乾每服一九薄荷湯下

搐

暑月炎蒸不可當

孩童發搐意慌忙

抱龍丸子三五丸

銀花薄荷煎作湯

小兒發搐在于夏月由暑邪入心用抱龍丸以銀花薄荷湯送下

疳

疳病疳羸是小兒

保童丸內入蕪荑

更兼苦練并君子

等得孩童日漸肥

小兒疳病令漸羸瘦用五疳保童丸加蕪荑練根史君子各三錢重糊為丸梧子大每服三十九米仁湯

送下

齒浮

老人腎弱齒浮疼

涼藥頻施不斷根

肥皂裝鹽燒煨黑

揩牙常用白如銀

老人齒痛由腎氣虛弱用皂莢一挺去核入鹽鉄線
扎鹽泥固爐內煨黑研末每日用少許揩擦

又

牙齦浮疼腎氣虛

每為發作不能除

采君黑錫與排風

固齒牙疇痛却祛

用排風湯煎送黑錫丹

目昏

風熱攻冲眼目昏

神方火煨石爐甘

細末川連同合和

熱湯浸洗更為良

用真爐甘石煨一晝夜研極細黃連二兩為末調和
白湯浸洗

目赤

目赤頭風疼且痒

藿香晉氏各一兩

朴硝香射及螺青

搐入鼻中痛必減

風邪注于腦戶致令眼目昏疼羞明怕日或腫或痒
用藿香晉朮各一兩螺青朴硝各三錢射香共為細
末調和每用少許搐鼻

護目法

冷淚瞬昏多腦寒

先因涼藥損于肝

每朝洗面湯揩擦

豁眼勝將沙藥食

以每日洗面之水豁眼自然明亮此法最妙

熱瘡

口瘡發熱腫連喉

百法鑿之病不瘳

爛細自然羅卜汁

吐涎頻漱病難留

咽喉口瘡因熱邪薰于上焦腫痛不止用萊菔搗自然汁頻漱吐涎

痔

五痔皆因腸澼生

忽然疼痛不能行

全蝎三个燒香餅

烟薰患處必去根

凡有痔疾用全蝎三个香饼一斤桶内先盛灰一半
将蝎饼烧烟薰之

金瘡

金瘡出血涌如泉

龍骨黃連功未全

一味熟蘇為細末

用時封扎自然痊

金瘡血出如泉用陳年紫蘇為末傅扎患處

脚裂

風寒冷凍損皮間

脚裂開皸步履難

五倍為末加牛髓

萬人傳了萬人安

風寒吹裂皮膚用五倍子五錢為末牛骨髓調和成膏傳患處立愈

溫隱居海上仙方終

道藏精華第十三集之七

千 金 翼 方

總主編者 文山遜叟蕭天石

(全一冊) 定價新台幣 精裝三〇〇元
平裝二五〇元

著作者 唐 • 孫思邈真人

作序者 文山遜叟蕭天石

版權所有
翻印必究

出版者

自由出版社

台北郵政信箱八六五號
郵政劃撥〇〇〇三三八九一四號

電話：九一—二〇三六九一四

發行人

曹哲士

本社登記
證字號

行政院新聞局
出版台業字第〇五七五號

中華民國七十八年七月

